


الفصل

مجلة فصلية تهتم بنشر الثقافة العلمية

العدد الأول . العدد الثالث . شوال - ذو الحجة ١٤٢٤هـ / نوفمبر ٢٠٠٣ - يناير ٢٠٠٤م



● النمر العربي من أندر الكائنات الشطرية في الجزيرة العربية

● الفروق البيولوجية بين الرجل والمرأة

● الصيام في عالم الحيوان

الفيصل

مجلة فصلية تعتم بشرة الثقافة العلمية
المجلد الأول - العدد الثالث - يوليو ١٤٣٢ هـ - نوفمبر ٢٠١٠ م - ج١ - ص ١٠٠

الناشر

دار الفيصل الثقافية

ص.ب. : ٢٨١٩٨٠ الرياض : ١١٣٢٣

هاتف : ٤٦٥٢٢٥٥ - ٤٦١١٢٠٨

فاكس : ٤٦٥٩٩٩٣

قيمة الاشتراك السنوي

٧٥ ريالاً سعودياً للأفراد . ١٠٠ ريال سعودي

للمؤسسات أو مايعادلها بالدولار الأمريكي

خارج المملكة العربية السعودية

سعر النسخة الواحدة

١٥ ريالاً سعودياً أو مايعادلها خارج المملكة

العربية السعودية

إدارة التسويق

تلفون : ٤٦٥٠٨٥٧ - ٤٦٥٢٢٥٥/١١١٣

فاكس : ٤٦٥٩٩٩٣

بريد إلكتروني : sjameel@kff.com

الصف والإخراج الفني

مطبوعة مركز الملك فيصل

للبحوث والدراسات الإسلامية

الطباعة

الدار العربية للطباعة والنشر

تلفون : ٤٨٧٣٤٤٠

رقم الإيداع

١٤٢٤/٢٣١٥

ردود

١٦٥٨-١٢٨٨



بعد المشروع السعودي الياباني القائم بين الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها والوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جاياكا» لدراسة بيئة أشجار العرعر ودراسة ظاهرة الموت القمي، بها لغابات العرعر، واحداً من الجوانب المهمة التي تساعد العلماء إلخ



حلّو غير أنه مهم؛ إن جميع الوجبات الجاهزة المنخفضة الدسم لن تنقذك من مرض القلب، يشرح غيل فاينس Gail Vines لماذا يُعدّ السكر مادة دسمة جديدة؟ تحاول الاعتناء بنفسك. لقد انقضت ما تتناوله من مادة دسمة مشبعة منذ سنوات إلخ



أثبتت الدراسات الحديثة أن الاختلافات بين الجنسين ليست مقتصره على الصفات الجسدية والتناسلية فقط وإنما تمتد لتشمل كثيراً من الخصائص الفكرية والسلوكية أيضاً، لاحظ مثلاً الأولاد (الذكور) والبنات وهم يلعبون، الأولاد دائماً يميلون إلى إلخ



ونبصر النباتات قضيّاً نائمة يحضنها الماء، يهفو إليها النور ليداعبها فيتساقق الشجر بهيّا نحو السحاب. وحين تكتظ الأشجار يشع الضوء والغذاء فتتناقص ناعسة، لتفقد بالليل في سباتها. هذا ما نرى، ونحن نرى ما نريد. إنما يكون أن نتبصر مشاهد أخرى إلخ



لم يكن المريخ والأرض باقترابهما بعضهما من بعض بالصورة الحالية منذ ستين ألف سنة. وفي شهر يونيو ٢٠٠٣، بفارق أسابيع أطلق الأوروبيون مركبتهم الفضائية (قطار المريخ Mars Express) على ظهر صاروخ روسي من قاعدة باكينوز في كازاخستان إلخ



في ظل التقدم التقني الكبير الذي شهده القرن العشرون، تمكن علماء المياه من الكشف عن الكثير من المظاهر الطبيعية في أعماق المحيطات وقيعانها، فلقد تعرفوا جيداً على مكونات القشرة الأرضية المحيطية البازلتية الخصائص، وكشفوا أسرار حداثتها إلخ



٧٦

عادة تستخدم الأدوية البيطرية لعلاج الحيوانات من كثير من الأمراض التي تهدد حياتها أو تضعف إنتاجها، ومن ناحية أخرى يمكن أن تضاف إلى علائق الحيوانات لتزيد من إنتاجها أو لتحفظ هذه العلائق من التلف والتحلل..... إلخ



٨٢

كل سنة يصاب ملايين الرجال والنساء بنوبات قلبية، وكثيرون يتجون من النوبة دون أن تترك وراءها آثاراً تذكر. وآخرون لا يتجون، وآخرون أيضاً يتضرر قلبهم بحيث يصير «العودة إلى النشاطات المفيدة أمراً غير محتمل»، كما يقول طبيب القلب بيتر كون،..... إلخ



٩٢

لقد فرض الصوم على الإنسان المسلم في السنة الثانية الهجرية، والغاية من الصوم عند الإنسان بصورة عامة هي الاستجابة لأوامر الله، ومن رحمته تعالى بعباده أنه جعل أداء هذا الفرض تنقية للجسم من المواد السامة والفضلات المتراكمة بسبب سوء التغذية..... إلخ



١١٢

تم بنجاح في ليلة ٢٨، ٢٩ أغسطس ٢٠٠٢ إطلاق الصاروخ الأوروبي الملاق آريان-٥ من مركز كورو الفضائي في غيانا الفرنسية. وحمل هذا الصاروخ قمرين صناعيين تم إصالحهما إلى المدار العابر إلى المدار المتزامن، أول هذين القمرين وأكبرهما حجماً هو قمر..... إلخ



١٢٠

الجبال.. هذه (الكائنات) الصخرية الشامخة التي تملأ علينا بهيبتها هتمننا الشبات والمتعة، ليست سماء مصمتة قاسية كما يعتقد الكثيرون. الجبال.. أمكنة ورموز ومهابط للوحي ومسارح لحضارات كثيرة.. وهي أيضاً متنفسات يهرع إليها الإنسان هرباً من..... إلخ




١٢٦

أواجه وقد وصلت إلى نهاية حياتي بوصفي عالماً، معضلين كبيرتين لهما جذور في تاريخ العلم، وقد حاولت التعامل معهما كما يفعل أي عالم، علماً بأنني اعتقد أن كلا المشكلتين لا تشابهان مطلقاً، وهذا ليس غريباً؛ لأن الأولى تتعلق بعلم الكون والأخرى بالوحي..... إلخ

النمر العربي من أندر الكائنات الفطرية في الجزيرة العربية

عبد العزيز بن حامد أبو زنادة



أخرى كثير أدت إلى ندرته وقلة أعداده في الآونة الأخيرة.

ويعد النمر العربي واحداً من أكثر الحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض في مناطق وجوده بشبه الجزيرة العربية خاصة المملكة العربية السعودية. ويعود السبب في ذلك إلى إزالة وتدمير كثير من المواطن الطبيعية وأن النادر من قبل الأنشطة البشرية المتزايدة لتلبية حاجة الإنسان من الطبيعة

يعد المشروع السعودي الياباني القائم بين الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها والوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» لدراسة بيئة أشجار العرعر ودراسة ظاهرة الموت القميء بها لغابات العرعر، واحداً من الجوانب المهمة التي تساعد العلماء على فهم الأسباب التي أدت إلى تدهور هذه البيئات والتي تعدّ من المواطن المهمة لانتشار النمر العربي. ومع ذلك : فإن هناك أسباباً



معروفًا فيها اللهم إلا من بعض المواقع القليلة جداً في المناطق الوعرة النائية.

ينتشر النمر العربي في المناطق الجبلية بغرب وجنوب المملكة والإمارات العربية المتحدة وعمان واليمن، وبدأ الاهتمام بهذا الحيوان المهدد بالانقراض منذ إنشاء الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها في عام ١٤٠٦ هـ. مثله في ذلك مثل كثير من الأنواع المهددة والنادرة كأنواع الغزال العربي

ومواردها، ولذلك أدركت الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها أن هناك حاجة ملحة للإسراع في تطبيق تدابير فورية وبرمجة الالتزامات والإجراءات الأنسية والمستقبلية للمحافظة على النمر العربي.

وكانت المعلومات المتوافرة قبل عقدين من الزمان قد أشارت إلى أن النمر العربي مهدد بالانقراض، وكان الاعتقاد السائد آنذاك أنه انقرض بالفعل من كثير من البيئات التي كان

دول الانتشار الجغرافي للنمر العربي، وهي الإمارات العربية المتحدة وعمان واليمن إعداد مذكرات تفاهم تستهدف وضع خطة عمل إقليمية للمحافظة على النمر العربي والتعاون فيما بينها لإنقاذه من خلال حصر أعداده الموجودة في الأسر، وإكثارها باستخدام أحدث التقنيات، ومن ثم إعادته إلى الطبيعة في مناطق محمية خاصة. وسوف يتم تنفيذ ذلك



النمر العربي مهدد بالانقراض



عداوة بين الأهالي والنمر لافتراسه مواشيهم

والمها والقطط البرية وغيرها. وبدأت الهيئة سلسلة من المسوحات الميدانية في مناطق وجوده أوضحت أهمها وجود بقايا نمر عربي تم تسميمه في جبال الفقرة في عام ١٤١٢هـ، واصطياد نمر آخر من قبل بعض الأهالي في منطقة الباحة في عام ١٤١٨هـ. بالإضافة إلى عدد من المشاهدات والآثار المسجلة التي تفيد بوجوده في عدد من المناطق، واتضح أن هناك عداوة شديدة بين الأهالي والنمر نتيجة افتراسه لمواشيهم والاعتداء عليهم في بعض الحالات.

ولما كانت الأعداد المتوقعة وجودها في الطبيعة قليلة جداً، فقد رأت الهيئة مع باقي



جهود متعددة ومحميات لحماية النمر من خطر الانقراض

في الموطن الطبيعي كعلاج وحيد كافٍ للمحافظ على النوع.

وفي المملكة العربية السعودية أعدت الهيئة لحماية الحياة الفطرية وإنمائها استراتيجية خاصة للمحافظة على النمر العربي تستهدف تنفيذ عدد من الأهداف في خطوط متوازية:

- مواصلة المسح البيئي لمناطق انتشاره الجغرافية.
- مواصلة محاولات إكثاره تحت الأسر في المركز الوطني لأبحاث الحياة الفطرية بالطائف.
- تنظيم ندوة علمية تستضيفها المملكة

عبر اتفاقات خاصة لإعارة أو تبادل النمر العربي أو المني أو الأجنة المحفوظة بين الأطراف حسب الحاجة إلى أغراض التكاثر تحت الأسر. وتتضمن الاتفاقات مع الدول الأخرى كذلك تدابير التعامل مع ناتج التكاثر بما في ذلك حقوق الأطراف في إعادة التوطين في المناطق المحمية.

وكان هناك مبدأ واضح كأساس للعمل المشترك، وهو ما لاحظته العاملون في حقل الحياة الفطرية مما يهدد المفترسات الكبيرة خاصة النمر العربي في شبه الجزيرة من خطر الانقراض لانحسار أعداده في البيئات الطبيعية إلى الحد الذي لا تجدي معه الحماية

وقد أسفر المسح البيئي عن تحديد جبل شدا الأعلى كمنطقة مهمة لوجود هذا النوع من القطط البرية، وتم إعلانها كأول منطقة محمية للنمر العربي، وليس المقصود هنا حماية نوع النمر فقط بل لكونه عنصراً أحيائياً يكمل سلسلة التنوع في هذه البقعة المهمة المحيطة بالحيوية للإنسان.

وفيما يتعلق ببرنامج الإكثار تحت الأسر فقد تم حصر أعداد النمر العربي الموجودة في دول انتشاره، ووجد أن هناك نحو ٣٥ نمراً موزعة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعمان واليمن، وتم تثبيت أجهزة استشعار لاسلكية على ١٧ منها في ظفار بسلطنة عمان للمراقبة عن بعد «باستخدام الراديو».

وفي المركز الوطني لأبحاث الحياة الفطرية بالطائف اكتملت الإنشاءات المبدئية لبرنامج


لاستعراض النتائج التي توصلت إليها كل دولة من دول انتشار النمر العربي للتوصل إلى منظومة إقليمية لمحميات النمر العربي في شبه الجزيرة العربية.

- تنفيذ برنامج توعية لعامة المواطنين وخاصتهم من المزارعين في مناطق وجود النمر العربي، وتبيان أهمية المحافظة عليه على المدى الطويل وشراكة الأهالي في المناطق التي تعلن حمايتها.

وقد استخدمت الهيئة خلال المسح البيئي للنمر العربي عدة وسائل للتعرف على وجوده في الطبيعة أهمها المعلومات المسجلة ومنها النقوش الأثرية الموجودة على الصخور، والتأكد من وجود الحيوان من خلال المشاهدة والإمساك وتحليل براز الحيوان، والتعرف على بقايا الحيوانات النافقة ومقابلة أهالي المناطق التي يعيش فيها.

جبل شدا الأعلى من أهم مناطق وجود النمر العربي





الحميات .. هل تكون الوسيلة الناجعة لإنقاذ النمر العربي؟

للمحافظة على النمر العربي في مناطق وجوده، حيث تم إعلان محمية ثانية للنمر العربي في ظفار بعمان تضاف إلى المحميات الأخرى القائمة في دول الانتشار الأخرى .. ويذكر هنا على وجه الخصوص محمية جبل شدا الأعلى بالباحة بالملكة العربية السعودية. وسوف يعقد اجتماع سنوي بين الهيئة والجهات المماثلة في الإمارات العربية المتحدة وعمان واليمن يتم فيه مراجعة وتقويم وتطوير وتنسيق سياسات المحافظة على تلك الأنواع المهددة بالانقراض في شبه الجزيرة العربية .. حيث إنه لن يتمكن كل جانب بمفرده من تحقيق تطلعاته في ضوء المعطيات الراهنة لحالة النمر العربي في البيئة الطبيعية وتحت الأسر.

طموح لإكثار النمر العربي ويوجد لدى المركز أربعة نمور «ثلاثة ذكور وأنثى واحدة» بالإضافة إلى ذكر معار لمركز إكثار الحيوانات النادرة بالشارقة في إطار اتفاقية للإنماء تحت الأسر، يتم بموجبها التعاون العلمي، وتقاسم نتاج الإكثار بهدف المحافظة على هذا الحيوان النادر.

ومن المخطط له أي أيضاً مواصلة البحث العلمي الحقل المتعلق بجوانب حياة وسلوك هذا الحيوان النادر في الطبيعة خلال برنامج الدراسات العليا في الجامعات السعودية بالتعاون مع الهيئة إضافة إلى تطوير تقنيات الإكثار تحت الأسر بما يتلاءم مع حجم الخطر المحتمل على سلالة هذا النوع.

من المؤمل أن يستمر برنامج التعاون

لا تأكل بعد الآن قبل أن تقرأ المتلازمة السينية (SYNDROME-X)

صلاح يحيى



من المؤسف أن نخيب ظنك، ذلك أن هناك شيئاً قد فاتك الانتباه إليه: إنه المتلازمة x، أو المتلازمة السينية، أو المتلازمة المجهولة.

صاغ هذا الاسم جيرى ريفن Gerry Reaven من جامعة ستانفورد Stanford في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، تبدو المتلازمة السينية مُهَدِّدَةً، ولسبب وجيه. إنها إفساد خفي لاستقلاب أو أيض Metabolism جسدي، إفساد مهدد للحياة، إذ من المرجح أن يسرع بنهاية كل

حلٍّ غير أنه مهم: إن جميع الوجبات الجاهزة المنخفضة الدسم لن تنقذك من مرض القلب، يشرح غيل شاينس Gail Vines لماذا يُعَدُّ السكر مادة دسمة جديدة؟

تحاول الاعتناء بنفسك. لقد أنقصت ما تتناوله من مادة دسمة مشبعة منذ سنوات. إنك لست من ذوي الوزن الزائد على المطلوب، وإنك لا تدخن، وأنت على نحو أساسي لا تُعَدُّ نفسك معرضاً لخطر تنامي مرض القلب.



يعرف أغلب هؤلاء بوجود مشكلة بعد، إذ تحدث المراحل المبكرة دونما إنذار. ومع ذلك؛ فإن جميع الأعراض هي: ارتفاع في ضغط الدم، ومستويات عالية من مواد دسمة منذرة بالخطر هي ضروب ثلاثي الغليسريد Taiglycerides التي وجدت في الدم، ومقاومة الإنسولين، أي المقاومة المكتسبة لهرمون الجسد الحيائي الذي يقوم بمعالجة الجلوكوز «سكر العنب».

يتربص الداء السكري ومرض القلب بأي

من يصاب به، إنه شائع على نحو منذر بالخطر. والأكثر من ذلك هو تنامي الدليل على أننا نجلبه إلى أنفسنا بالأسلوب الذي نأكل وفقه.

يقول ورنر ولد هوسل Werner Waldhaust مدير صحيفة «علم الداء السكري»: «إننا نعاني من تسمم غذائي مزمن».

سبق أن لاقى ثلث السكان الراشدين في مناطق العالم الأجود تغذية حتفهم نتيجة لذلك، وسيكون هناك كثيرون على وشك الموت. لن

لقلبك كرداء الماده الدسمة المشبعة.

يقول فيكتور زاميت Victor Zammit رئيس الكيمياء الحيوية للخلية في معهد هانن Hannah Research Institute في أير Nyr في اسكتلندا: «عرفنا منذ زمن طويل أن الأطعمة الغنية بالمواد الدسمة المشبعة رديئة السمعة. ولكن ليس علينا أن نأكل مواد دسمة مشبعة لنجد أجسادنا مغمورة بهذه الجزيئات الخطرة، وبما أن كبدنا يتعامل مع منتجات الهضم، فإن بإمكانه أن يغمر تيار الدم بمواد دسمة مشبعة مميتة موجودة مسبقاً في الجسد. إن أي شيء يشجع الكبد على القيام بهذا قد يكون من السوء تماماً كتناول مادة دسمة مشبعة».

يعتقد «زاميت» أن الأكل مرات متكررة أكثر مما ينبغي قد يكون أحد المثيرات التي تحيل كبدك إلى آلة إفراز مادة دسمة لا ترحم.

وهذه هي طريقة عملها: في كل مرة نتناول طعاماً يتحرر الإنسولين إلى تيار الدم، فيقوم هذا الهرمون الحياتي الذي تفرزه خلايا خاصة في المعثكلة (البنكرياس) بتشجيع أنسجتنا وعضلاتنا بخاصة على التهام الجلوكوز (سكر العنب) الذي يندفع عبر تيار الدم بعد كل وجبة. هذه هي جميع الأخبار الطبية لأن الجلوكوز المستسكع في الدم هو السقوط الخطر. إن بإمكان هذا الجلوكوز الالتصاق بالبروتينات وتخریب قابليتها للقيام بعملها. وقد تكون النتيجة الإصابة بالعمى، وإلحاق الأذى بالكلية، وضروباً من البتر.

غير أن للإسولين دوراً حيوياً آخر، إنه يوقف الكبد بعد وجبة الطعام عن تحرير أي مادة دسمة - التي هي وقود استقلالي كامن - إلى الدم، ولماذا يعد وجبة الطعام؟ .. لقد ثبت أخيراً أن هذه المواد الدسمة كالجوكوز تماماً، خطيرة إذا ما بقيت متسككة في الدم مدة

كان يعاني جملة من هذه الزمرة من الأعراض المعروفة باسم المتلازمة السينية، يقول ريشن Reaven: «إن هذه المتلازمة هي سبب رئيس في مرض القلب التاجي».

وهكذا ليس هناك بعد من يستطيع أن يكون أكثر دقة من ذلك. وعلى النحو المشار إليه، ما الذي يسبب هذه المتلازمة؟ لقد اقترب الباحثون أخيراً من الإجابة عن ذلك بعد عقود من الجدل والمناقشة الحادة أحياناً.

إن جميع العوامل المعتادة المشتبه بها هنا هي: البهانة، والكسل، وتاريخ الأسرة. غير أن هناك أخباراً جيدة جاءت من آخر الدراسات الكيميائية الحيوية التي أجريت على المتلازمة السينية. إن ما نأكل، وكيف نأكل أمران يمكن أن يؤثرنا سلباً أو إيجاباً. إن أحد مفاتيح التبصر هو أن سر المتلازمة السينية يكمن في الكبد.

إن منابذة Manipulation أو معالجة سلوك هذا العضو قد تصد الأخطار المزدوجة لمرض القلب والداء السكري. والمفتاح الآخر هو أن السكر قد يكون رديئاً





الوجبة السنية بسملة السمنة

قريب كيف يمكن لهذا الإجراء أن يخفق في الجردان على الأقل. إنه يعتقد أن الطريق إلى المتلازمة السنية يبدأ بوجبات خفيفة متكررة عالية الطاقة تعرض الكبد إلى إنسولين خلال أدوار طويلة من دون انقطاع مقبول. وجد الباحثون في دراسات أجريت على جردان المختبر أن الإنسولين عندما يكون حاضراً خلال أدوار طويلة، فإنه يفضي إلى تحول استقلابي في الكبد يمنع من إفراز ثلاثي الغليسريد المثبط، وبدلاً من ذلك، وعلى نحو خاطئ يحث الإنسولين الكبد على تحرير حتى المزيد من ضروب ثلاثي الغليسريد المحمولة ضمن الـ VLDL المعزز لمرض القلب. ويعتقد «زاميت» أنه من المرجح حدوث الإجراء نفسه لدى البشر.

إنها دورة رديئة. تقوم ضروب ثلاثي

طويلة جداً. إنها تتحرر كضروب ثلاثي غليسريد محمولة في موابك جزئية، تعرف باسم ليبوبروتينات منخفضة الكثافة جداً - Very low Density Lipoproteins أو VLDL. غير أنها تتبدل في الدم على نحو كيميائي حيوي لتلتصق بالجدران الشريانية. ومن الطبيعي أن هذه الشرايين ما إن تغدو متضيقة بصفيحات دسمة كهذه، حتى تغدو الهجمة القلبية غير بعيدة. إن هذه المواد الدسمة غير مرغوب فيها على نحو خاص في تيار الدم بعد وجبة الطعام لأن الإنزيمات (الإنظيمات) التي بإمكانها العمل على ترحيلها من الدوران على نحو منطوق على مخاطرة، تكون منشغلة بالتعامل مع مادة دسمة جاءت من الطعام الذي قمت بتناوله مؤخراً.

لقد اكتشف «زاميت» وزملاؤه منذ وقت



حقن يومي بالإنسولين لتعويض النقص

السوري بطعام غني بالفركتوز، علمًا بأن للهامستر استقلابًا للدسم مماثلًا على نحو ملحوظ لاستقلاب البشر.

فتمت هذه الجردان خلال أسابيع المتلازمة السينية، كما نمت مستويات عالية لضروب ثلاثي الغليسريد، ومقاومة للإنسولين.

وقد نُشرت في العام قبل الفائت دراسة فعالة عن تأثيرات الفركتوز في البشر. فقد غذى مدبر التغذية السريري «جون بانتل» John Bantle، وزملاؤه في جامعة مينسوتا في مينيابوليس في الولايات المتحدة ٢٤ متطوعًا من الأصحاء بطعام يحتوي على ١٧٪ من الطاقة الكلية على شكل فركتوز، وذلك مدة ستة

يمكن أن تُلحق الأذى تمامًا كما تفعل المواد الدسمة والكحول. يقول زاميت: «إن الأغذية الغنية بالفركتوز (سكر الفواكه). وهذا يتضمن السكر العادي أي سكر القصب أو السكروز الذي نصنّفه فركتوز. يمكن أن تجلب من السوء تمامًا ما تجلبه المواد الدسمة المشبعة».

يعد كلا النوعين من الغذاء سبيلًا هينًا إلى المتلازمة السينية. لقد أوضحت عدة دراسات خلال العقد المنصرم أو نحو ذلك بأن الجسد يعالج الفركتوز بطريقة مختلفة على نحو واضح عن معالجته للسكر البسيط الجلوكوز. إن ما يقلق هو انتقال الفركتوز على نحو انتقائي في اتجاه الكبد وإلى تشكيل مواد دسمة: ففي البداية يجرى استقلابه في الكبد ليقدّم إحدى كتلات بناء ضروب ثلاثي الغليسريد، غير أن طعامًا غنيًا بالفركتوز ينبه الكبد على نحو مباشر ليعزز ضروب ثلاثي الغليسريد الخطيرة هذه على نحو مماثل تمامًا للعمل الذي تقوم به قنبلة الكبد بالإنسولين، يفسر «زاميت» ذلك بالقول: «في اعتقادي أن بإمكان الفركتوز أن يحاكي ما يقوم به إفراز متكرر الحدوث للإنسولين».

إن بإمكانه على المدى القصير تعزيز مقاومة الإنسولين في العضل. الخطوة الأولى إلى المتلازمة السينية، وبإمكانه على المدى الطويل تعزيز مرض القلب.

لا يوافق كل امرئ على أن الفركتوز محفوف بالمخاطر. يقول بعضهم لا يوجد منه في طعامنا ما يكفي ليكون له أي تأثير ملحوظ. غير أن وفرة الدراسات على الحيوانات تدعم الفكرة. هم يتغذى جرد مختبر بالفركتوز على مستويات قابلة للمقارنة بمستوياته في الأطعمة البشرية، فينمي الجرد مقاومة للإنسولين حتى في حالة بقاء الجرد نحيفًا.

غذى باحثون في جامعة تورنتو Toronto في كندا في العام قبل الماضي ضروب الهامستر (حيوان من القوارض شبيه بالجرذ) الذهبي

واقعيون في إثبات (٩٩٪ خلوة من الدسم) على الرقعة التي تبين محتويات الأغذية المعالجة. إن ما لا يقلونه هو أنها تحتوي على ١٥٪ من السكاكر، التي هي على الأرجح أردا من بعض المواد الدسمة».

إن ما يقلق «زاميت» هو «أن الناس قد ينتقون عن قصد أغذية «معالجة» منخفضة المواد الدسمة، معتقدين بأنهم يقومون بالاختيار الصحي مع أن المنتج قد يكون غنيًا جدًا بالفركتوز».

ولا يقتصر الأمر على وجوب مقاومتنا لولعنا بالحلوى فقط؛ بل علينا أن نقاوم حينا للأشربة الحلوة. ويرتاب «زاميت» في الأشربة غير الكحولية الغنية بالسكر، والمستهلكة في الوقت الحاضر بكميات ضخمة؛ لأنها قد تكون مكوّن الطعام الحديث الأكثر إقلاقًا.

ليست أخطار الفركتوز معروفة على نحو واسع حتى الآن، والمقادير المستهلكة في الطعام المتوسط الغربي قد أدخلت الروح في القلوب منذ السبعينيات من القرن الماضي. يتألف جزيء السكر أو السكر العادي (سكر القصب أو سكر الشوندر) من نصفين أحدهما فركتوز والثاني جلوكوز، السُّقَط، والأردأ من ذلك أن صانعي الأغذية في أواخر الستينيات من القرن الماضي بدأوا باستخدام مُحلّ رخيص هو شراب الذرة الذي هو عمليًا فركتوز صرف، والذي يضاف الآن إلى جميع أنواع الأغذية بما في ذلك أغلب حبوب الفطور (الطعام يُتناول صباحًا) Cereals، وصف واسع من الأغذية المعالجة.

لقد ازداد استهلاك الفركتوز في محليات الذرة في الولايات المتحدة من العام ١٩٧٥م إلى العام ١٩٩٠م بنسبة عشرة أضعاف. وقد جاء في التقارير التي تعود إلى أواخر الثمانينيات من القرن الماضي أن متوسط استهلاك الولايات المتحدة للفركتوز يساوي نحو ٩٪ من مدخول الطاقة الطعامي، والذي

أسابيع؛ ويبدو هذا مقدارًا كبيرًا من الفركتوز؛ هذا ويقدر «بانتل» عدد الأمريكيين الذين يتناولون هذا السكر البسيط كثيرًا في طعامهم بما لا يقل عن ٢٧ مليونًا.

ثم قاموا بعد ذلك بتغذية متطوعين بطعام مُحلّى بجلوكوز خلو تقريبًا من الفركتوز فكانت النتائج مفاجئة خاصة عند الرجال الذين برهنوا على أنهم أكثر إحساسًا بالفركتوز من النساء، ولم يتضح بعد سبب ذلك. يقول «بانتل»: «أنّج الطعام الفركتوزي تراكيز بثلاثي الغليسريد في الدم أعلى على نحو ذي شأن بالمقارنة مع الطعام الجلوكوزي كانت المستويات عند الرجال أعلى بنسبة ٢٢٪. والأهم

من ذلك أن مستويات ثلاثي الغليسريد في الطعام الفركتوزي بلغت الذروة بعد الوجبات، وذلك تمامًا عندما يكون بإمكان هذه المواد الدسمة إلحاق معظم الضرر بشرائينا. كان «بانتل» يرغب في رؤية نقص ملحوظ في مقدار الفركتوز المضاف إلى الأشربة والغذاء في الطعام الغربي. يضيف «زاميت»: «إنها دعوة إلى الصناعة الغذائية للاستيقاظ. إن صانعي الأغذية





من الضروري القيام بإحداث تغييرات تنظيمية سليمة عند التخطيط



عليهم ان يعرفوا انما يأكلون - وهم؟

ومما لا شك فيه أن ذلك يعود جزئياً إلى
 بئيتهم الجسدية الوراثية. ومع ذلك لم يتم بعد
 تثقيب جينات قابلية التأثر الأساسية. يجادل
 «ديفيد باركر» David Barker من جامعة
 ساوثامبتون Southampton في إنجلترا قائلاً : إن
 التغذية الجنينية والطعام في الطفولة المبكرة
 قد يكونان مهمين على حد سواء. يبدو أن
 الرضع النقصوني التغذية في الرحم وبعد
 الولادة بزمان قصير هم عرضة على نحو خاص
 للمتلازمة السينية، وبخاصة إذا ما غُذوا فيما
 بعد تغذية جيدة، وغدوا مفرطين في الوزن.
 حتى لو تكدست البطاقات الوراثية ضدك
 إلا أن هناك دليلاً مثيراً للاهتمام من حيث إن

يعني أن الكثيرين من الناس سيستهلكون أكثر من ذلك بكثير، أما «جوديث هولفرش» Judith Hallfrisch من المعهد الوطني للشيخوخة في بلتي مور Baltimor فتقدر إمكان ألا تظهر التأثيرات الاستقلابية في السكان نتيجة لهذا التغير السريع لبعض الوقت؛ غير أنك بإتاحتك بضعة عقود للفركتوز كي يحدث تدمير الاستقلابي فقد يلتقط الحطام الجيل القادم من مختصّي الوبائيات.

من الطبيعي أن يعرّيك التفكير بأن بإمكانك أن تكون أحد المحظوظين الذين لن يُنمّوا مطلقاً مقاومة للإنسولين. إن الناس يختلفون في قابليتهم للتأثر بالمتلازمة السينية.

غير أن العلميين يُسلمون بأننا بحاجة إلى المساعدة من أجل تغيير أساليبنا علينا فقط أن نقاوم إغراء جميع هذه الأغذية المتوافرة بسهولة على رفوف سوقنا المركزي، ويجادل الناشئ «ولر هوسل» Waldhaust قائلاً: «إذا ما رغبت الصناعة الغذائية عن تبني الوسائل الصحية الجديدة، فيمكن أن تغدو منظمة على نحو قوي لإنتاج طعام طيب غير أنه صحي. إن تغييراً كهذا يمكن حتى أن يكون في مصلحة منتجي الغذاء أنفسهم».

ويقول أيضاً: «قد تجبر الصناعة يوماً ما في المستقبل على دفع تعويضات عن الأضرار التي ألحقها بالمستهلكين الذين غدوا مرضى على نحو مهلك نتيجة لتناول منتجاتها قياساً على نحو مماثل على أولئك الذين يعوّضون اليوم عما لحقهم من صناعة التبغ».

فكاهة كل يوم

تنص الرسالة المستخلصة من آخر بحث تغذوي على مايلي:

«إن تشعر برغبة في شيء حلو الطعام، فعليك بحبة فاكهة. إن الفركتوز موجود في الفاكهة والخضار؛ ولكنه على عكس الأغذية المعالجة موجود بكميات صغيرة متلاشية. وهو مرتبط بليف نباتي معقد وبمغذيات أخرى ذات فوائد صحية عديدة لا يل ذهب باحثون في هارفارد عام ١٩٩٩م، إلى أبعد من ذلك عندما اقترحوا أن كل حبة فاكهة إضافية أو حصة من خضار تتناولها يومياً تنقص خطر السكتة القلبية بنسبة ضخمة تقدر ب ٦٪».

يقول «لن ستورلين» Len Storlien مدير البحث الاستطلاعي في شركة الصيدلانيات أسترا زينكا Astra Zeneca: «لسنا بحاجة إلى مراقبة السكاكر فقط، إن لأنواع المواد الدسمة التي نأكلها تأثيراً أيضاً في صحتنا على المدى الطويل».

وهو يجادل قائلاً: «بدلاً من الكفاح، لإنقاص ما يؤكل من مواد دسمة جملة»، على الناس أن

يتمكنوا من الطعام أن يحدث تغييراً ما، انظر إلى البيما Pima، هؤلاء الأمريكيين الأصليين في جنوب أريزونا الذين ابتلوا جميعاً بلعنة «التمط الجيني القوي النمو» ذلك أن استقلالهم مكيف على نحو خاص لتخزين الدسم استعداداً لأزمة المجاعة. إن جميع هؤلاء تقريباً ما إن يبلغوا سن الشيخوخة حتى يُنموا النمط ٢ من داء السكري. وقد غدوا كلهم تقريباً. حتى في عمر ثماني سنوات. مقاومين للإنسولين، غير أن هذا البلاء لم ينزل في البيما إلا بعد أن أدخلت الأغذية الغربية، لقد وُجد خلال عشر سنوات من الدراسة أن هنود البيما الذين أكلوا طعاماً نمطياً غربياً قد أصيبوا على الأرجح بداء



السكري بنسبة تفوق بمرتين ونصف المرة نسبة الذين تناولوا طعاماً أكثر تقليدية بعض الشيء. إن الجينات ليست بالضرورة قضاء وقدراً.

شجعت الناس على أن يأكلوا، بدلاً من ذلك، مزيداً من الكربوهيدرات المنبهة للإنسولين التي تزود بالوقود وباء مقاومة الإنسولين.

هناك استراتيجية ثالثة لتجنب المتلازمة السينية، وإن كانت مثيرة للجدل: إنها أكل الكربوهيدرات البطيئة التحرر التي لا تمرز. على نحو جدلي، هجمة الإنسولين نفسها. إنها كربوهيدرات معقدة فيها الكثير من الليف النباتي. كالشعير والدخن أو الجاوترس Millet، والأرز البني. وتلك التي يستطيع الجسم هضمها ببطء فقط كالباستا (ذلك النوع من المعكرونة) Pasta والفاصولياء والعدس. قد يرغب سورلين Sorlien في رؤية الصناعة الغذائية تنشئ أغذية تستغرق مدة أطول في الهضم. وقد تعاون في جامعة ولو نونغ Wollon gong في أستراليا مع شركة لتسويق خبز جديد مصنوع من نشاء فيه نسبة عالية من أميلوز متعدد السكايزيد. يهضم هذا الخبز على نحو أبطأ بكثير من الخبز العادي، ونزل الأسواق في بريطانيا في العام الماضي نوعان من مثل هذا الخبز.

كم من الفركتوز يوجد في كل مما يأتي؟

ملء ملعقة شاي من السكر العادي جرامان

ملء ملعقة شاي من العسل جرامان

ملء علبه من الكولا (٣٣٠ مل) ١٥ جراماً

مصبع شوكولا (١٠٠ غ) ٢٥ جراماً

ملء زبدية من حبوب الفطار ٣ جرامات

حصة من الجزر ٢٥، جرام.

❖ قراءة للاستزادة:

Insulin Stimulation of Hepatic Triacyl Glycerol Secretion and Etiology of Insulin Resistance). By Victor A. Zammit and Others, in The Journal of Nutrition, Vol 131, P2074 (2001)

*New Scientist No.2306

❖ من المعلوم أن ديننا الإسلامي الحنيف يحرم شرب الخمر، وهذا من فضل الله.



الفركتوز موجود في الفواكه والخضراوات

ينقصوا استهلاكهم للمواد الدسمة المشبعة بالانتقال إلى زيت الزيتون، والمواد الدسمة المتعددة عدم الإشباع، وبخاصة زيوت السمك البحري. إن بإمكان هذه أن تكبح تحرير الكبد لضروب ثلاثي الغليسريد المؤذي. إن طعاماً غنياً بهذه الحموض الدسمة المتعددة عدم الإشباع يعمل على مكافحة المتلازمة السينية.

لا يستطيع جري ريشن Gerry Reaven من جامعة ستانفورد Stanford، وهو الذي وضع المصطلح «المتلازمة السينية»، إقرار مزيد على ذلك؛ غير أنه مقتنع أيضاً بأن رسالة «الدسم» المنخفض قد

الفروق البيولوجية بين الرجل والمرأة

مسعد شتيوي

طبيب نوتر في الحدائق
وهي الصحة والحياة



وإذا ذهبت يوماً إلى محلات لعب الأطفال لوجدت أن الأولاد يقبلون على الألعاب التركيبية والسيارات والقطارات والمسدسات، بينما تميل الفتيات إلى اقتناء الدمى والعرائس من أمثال الدمية الشهيرة باربي وملابسها المزركشة وأدوات تجميلها ومطبخها وحتى حجرة نومها، والبنات حديثات الولادة، بعكس الصبيان. يحدقن إلى الوجوه أكثر مما يحدقن إلى الأدوات الآلية المتحركة، وعند بلوغ الثالثة من العمر تكون

أثبتت الدراسات الحديثة أن الاختلافات بين الجنسين ليست مقتصرة على الصفات الجسدية والتناسلية فقط وإنما تمتد لتشمل كثيراً من الخصائص الفكرية والسلوكية أيضاً، لاحظ مثلاً الأولاد (الذكور) والبنات وهم يلعبون، الأولاد دائماً يميلون إلى العنف والمبارزة وتسلق الأشجار والجري والسباق وكرة القدم وغيرها من الرياضات العنيفة، بينما تنزع البنات إلى الهدوء والسكينة وممارسة بعض الرياضات الخفيفة.



أمضين وقتنا أطول مع الدمى والأواني ، أما الألعاب الحيداية (كتاب صور وكلب محشو) فقد نالت الاهتمام نفسه من كلتا المجموعتين. وتشير الدراسات إلى أن الصبيان أكثر ميلا إلى العناد من البنات في عمر ١٢ شهرا وأكثر عدوانية وهم في بداية مشيهم وأكثر نزعة للمناقسة في أي عمر تقريبا. وفي الوقت الذي تتخرط فيه البنات في الألعاب التعاونية يؤسس الصبية في عمر لايتجاوز الـ ٦ سنوات نظم

البنات أكثر براعة من الصبيان في فهم المشاعر، وفي سن السابعة تتكون لديهم براعة قراءة القصص وفهمها. وحتى في الحيوانات هناك اختلافات بين الجنسين، فقد أجرت عالمتا النفس جيريان الكسندر G. Alexander، وميليسا هاينز M. Hines تجربة في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، على قرود من نوع فيرفيت Vervet فوجدتا أن الذكور منهم كانوا يفضلون الألعاب الصبيانية مثل الكرة والسيارة، أما الإناث فقد



الأولاد يعبثون على الألعاب التركيبية والسيارات والقطارات
والمنصات



تتجه البنات إلى الهدوء والهدوء

الاختلافات «واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تفضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى» البقرة: ٢٨٢. وهذا ليس معناه التقليل من شأن المرأة وقدراتها الذهنية، وإنما يدل على أن هناك اختلافاً في القدرات والملكات الذهنية بين الرجل والمرأة نتيجة للدور الذي يقوم به كل منهما وما يتطلبه من أعباء فسيولوجية عضوية وذهنية. وهناك آيات وأحاديث أخرى كان للمرأة فيها شأن عظيم «إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء عظيم» النمل: ٢٢. وقد تعددت الدراسات في مختلف العلوم - سلوكية، عصبية، هرمونية - لمعرفة التأثير البيولوجي للجنس على المخ والسلوك، لماذا يكون الذكور أكثر عدوانية من الإناث سواء في الإنسان أو في غيره من الحيوانات؟ لماذا يتفوق الأولاد في

سيطرة ويحافظون عليها خلال ألعابهم العنيفة. هل سالت نفسك عن أسباب هذه الاختلافات بين الأولاد والبنات، هل ترجع إلى الجينات والهرمونات أم إلى التربية والبيئة؟ ولكن هؤلاء الأطفال مازالوا صغاراً ولم يكتمل تركيبهم العضوي والهرموني بالإضافة إلى أنهم يربون تحت الظروف الاجتماعية والبيئية نفسها وقد ينتمون إلى أسرة واحدة وتجمعهم مدرسة واحدة وفصول مشتركة تجمع بين البنين والبنات. عموماً فالاختلافات بين الجنسين على الأقل من الناحية الفيزيائية أو الجسدية والتناسلية معروفة منذ أن خلق الله تعالى آدم وحواء وأسكنهما وذريتهما الأرض، وكذلك فإن الأسئلة المطروحة عن وجود اختلافات بين الجنسين في المخ والتفكير والسلوك ليست جديدة أيضاً! وقد ورد في القرآن الكريم ما يدل على وجود مثل هذه

المرحلة تقع على عاتق الحيوان المنوي حيث يوجد منه نوعان أحدهما يحمل الكروموسوم x والآخر يحمل الكروموسوم y أما البويضة فلا تحمل إلا نوعاً واحداً هو x فإذا كان الحيوان المنوي قام بإخصاب البويضة يحمل الكروموسوم xy يصبح الجنين ذكراً وتركيبه xy وإذا كان يحمل الكروموسوم xx يصبح الجنين أنثى تركيبها xx .

تكوين الغدد الجنسية (الخصية أو المبيض)
Gonadal Sex : الخطوة التالية هي تطور الغدة الجنسية غير المتميزة إما إلى خصية إما إلى مبيض ويتوقف ذلك على وجود الكروموسوم y الذي يؤدي إلى إفراز هرمون «بروتين» يسمى H-Y antigen من الخلايا التي يوجد بها، وهذه هي الخطوة الحرجة الأولى critical step التي تتجه بالجنين ناحية الذكورة، حيث يؤدي إنتاج هذا البروتين إلى تطور الغدة الجنسية إلى خصية testis ليصبح الجنين ذكراً، وعدم إنتاجه يؤدي إلى تطورها إلى مبيض ليصبح الجنين أنثى. وتتمو الخصية تحت تأثير هذا الهرمون أثناء الأسبوع السابع من الحمل في الإنسان بينما نمو المبيض عادة لا يتم قبل الأسبوع ١٧.١٣ من الحمل، ويبدو أنه يلزم عدد اثنين من كروموسومات «لتكوين المبيض الطبيعي، لأنه وجد أن الأفراد الذين يحملون كروموسوم مفرد لا تكون مبايضهم كاملة التكوين.

يتضح من ذلك أن الفكرة الأساسية هي أن الأنثى في الثدييات هي الجنس الأساسي أو المحايد (neutal sex or default mode) في حالة غياب الأندروجين، وأن التطور أو التمايز في الإناث بجميع مظاهره (المبايض والأعضاء الداخلية والخارجية) عملية أوتوماتيكية لا تتطلب هرمونات. أما الذكر، وما يحتويه من مظاهر الجنس الأساسية والثانوية، فكما يقال هو مجرد أنثى تعرضت لتأثير هرمونات الأندروجين المفرزة من غدته الجنسية الذكرية male gonad (الخصية) بسبب وجود الكروموسوم y . وعند حرمان الذكر من الأندروجين مباشرة بعد الولادة (إما بالخصي

المهارات وحل المسائل التي تتطلب ذهنًا تخيليًا، بينما تتفوق البنات في المهارات اللفظية أو اللغوية. وقد وردت تفسيرات واجتهادات كثيرة حول مضمون هذه الاختلافات وأسبابها، من أين يبدأ الاختلاف بين الجنسين ومتى؟ ما مدى تأثير هذا الاختلاف في صحة وسلوك كل منهما، وهل هو في صالح المرأة أم في صالح الرجل أم أنه اختلاف لا بد منه لحكمة إلهية من أجل صلاح الأسرة والمجتمع؟ وكلما تقدم العلم خطوة إلى الأمام برزت هذه الأسئلة إلى السطح مرة أخرى، والاجابات كثيرة ولكن أفضلها هو ماكان مبنياً على أسس علمية سليمة ومن دون أي تحيز لطرف ضد آخر.

وتجدر الإشارة إلى أن معظم معلوماتنا عن التمايز والتطور الجنسي differentiation & development استقيناها من البحوث التي أجريت على الحيوانات. ومن هذه الدراسات اتضح أن أكثر العوامل تأثيراً في هذه الاختلافات الموجودة بين الذكور والإناث هو التعرض للهرمونات الجنسية في مرحلة مبكرة من حياتهم منذ أن كانوا أجنة في بطون أمهاتهم، أما العوامل البيئية فتؤثر في أدمغة في الأصل مختلفة مما يجعل من الصعب تقييم دورها. وقبل أن نستعرض دعنا نبدأ القصة من أولها، من المراحل الأولى لتكوين الجنين لنرى ماذا وجد العلماء:

تحديد الجنس: Sex Determination

يشكل جنس الفرد (ذكر أو أنثى) من خلال ثلاث مراحل: التركيب الوراثي genetic sex ثم الغدد الجنسية gonadal sex وأخيراً الشكل الظاهري للجنس phenotypic sex

تحديد الجنس عن طريق التركيب الوراثي Genetic Sex : تبدأ أول مرحلة من مراحل تحديد جنس الجنين منذ لحظة إخصاب الحيوان المنوي للبويضة ويطلق عليها مرحلة التركيب الوراثي أو الـ genetic sex، مسؤولية تحديد الجنس في هذه

وإما بإعطاء مركبات توقف مفعول الأندروجين) فان السلوك الجنسي الذكري ينخفض أو ينتهي ويحل محله السلوك الأنثوي ، وبالمثل اذا ما أعطيت الاناث بعد الولادة مباشرة هرمونات ذكورية فان سلوكها ينقلب إلى الناحية الذكورية.

الشكل الظاهري للجنس Phenotypic Sex

معظم الأفراد يتطورون طبقاً لتركيبهم الوراثي الذي تكلمنا عنه من قبل genetic sex ولكن هناك درجات مختلفة للتعبير عن هذا التركيب الوراثي. قد تكون الاختلافات كبيرة لدرجة أن بعض الأفراد يتجهون عكس تركيبهم الوراثي أو يكونون بين الجنسين intersexuality رغم أن تركيبهم الوراثي genetic sex كما هو لم يتغير منذ لحظة الإخصاب، معني ذلك أن هناك عوامل كثيرة تؤثر في الشكل الظاهري للجنس أو مايعرف بـ phenotypic sex هذه العوامل قد تشمل الهرمونات، درجة الحرارة المرتفعة جداً والمنخفضة جداً وربما عوامل أخرى كثيرة. حتى الوقت من السنة الذي يحدث فيه الحمل قد يؤثر في جنس المولود، وقد توصل الصينيون إلى نتيجة calendar للحمل تساعد الأزواج على اختيار جنس المولود الذي يتوقف في هذه الحالة على عمر المرأة وشهر الحمل. ورغم عدم وجود أساس علمي لهذه النظرية، إلا أن دراسة حديثة ظهرت في مجلة التكاثر البشري Human Reproduction عدد أبريل ٢٠٠٢ أشارت إلى أن الشهر الذي يحدث فيه الحمل ربما يؤثر في جنس المولود. قام الباحث الرئيس في هذه الدراسة أنجلو كاجناسي Angelo Cagnacci وزملاؤه في إيطاليا بدراسة السجلات الموجودة في معهد أمراض النساء والتوليد وتحتوي بيانات أكثر من ١٤ ألف طفل مولود في الفترة من ١٩٩٥ إلى ٢٠٠١م. مواعيد حدوث الحمل تم تحديدها بأخذ لقطات تصويرية للأجنة بالموجات فوق الصوتية. وتحليل البيانات وجد الباحثون





المرأة تستخدم علامات بارزة كاستراتيجية للاستدلال والمعرفة، وكمضيق للحياة اليومية أكثر مما يفعل الرجل

- المخ؟ والاجابة: في الأنواع الأقل نضجاً عند الميلاد، تمتد الفترة الحرجة إلى ما بعد الولادة، أما في الأنواع الأكثر نضجاً عند الميلاد أو التي تطورت تطوراً كاملاً عند الميلاد تكون الفترة الحرجة قبل الميلاد.
- ولكن كيف يؤثر التستوستيرون في تطور المخ جنسياً؟
- أوضحت التجارب أن التستوستيرون يتحول إلى استراديول (الهرمون الأنثوي) داخل المخ وأن الأخير هو المسؤول عن توجيه المخ ناحية الذكورة! هل هناك أدلة على تحول التستوستيرون أو الأندروجين إلى استراديول داخل المخ؟ نعم هناك نظرية تؤيد ذلك androgen to estrogen theory
- تعتمد على عدة حقائق:
- أن المخ يمتلك انزيم الأروماتيز *aromatase* المسؤول عن تحويل التستوستيرون إلى استراديول.
 - هرمون الدايهيدروتستوستيرون *dihydrotestos-terone* لا يحدث التأثير نفسه الذي يحدثه التستوستيرون على المخ لأنه لا يمكن أن يتحول إلى استراديول.
 - التستوستيرون الذي تم تعليمه *(H3) labeled* تمت استعادته من المخ على هيئة استراديول يحمل العلامة نفسها.
 - وجد أن اعطاء مثبطات لانزيم الأروماتيز في الفترة الحرجة *perinatal* يعوق تطور المخ ناحية الذكورة.

من الاحتمالات:

- . إنتاج الأسترايول من مبيض الجنين ربما يكون شبه معدوم أو في أقل الحدود .
- . قد لا يوجد عدد كاف من مستقبلات الأسترايول في الأجنة الاناث .
- . ربما يوجد في دم الأجنة الاناث تركيزات مرتفعة من بروتين يرتبط بالأسترايول يسمى AFP (alpha-feto-protein) هذا البروتين له قابلية عالية للاتحاد بالأسترايول ومن ثم فانه من الناحية النظرية لا يوجد استرايول ليصل إلى المخ ويؤثر فيه .

والآن ماذا عن الوضع في الانسان؟

- توقفت حدوث هذه التغيرات في الانسان يختلف عنه في الفئران:
- . تحدث هذه التأثيرات في المخ في الانسان عند الأسبوع ١٦-٢٠ من المرحلة الجنينية .
- . تركيز بروتين AFP يكون عالياً فيحمي الأنثى من تأثير الاسترايول في المخ .
- . يقوم الجنين بتحويل الاسترويدات steroids إلى مركبات غير نشطة .

في هذا التوقيت يكون هرمون البروجسترون مرتفعاً جداً ومن المعروف أن هذا الهرمون يصاد في تأثيره هرموني الاسترايول والتستوستيرون .

زيادة افراز هرمونات الأندروجين من غدة

الأدرينال مرض وراثي يصيب الفتيات: وجد العلماء حالة تعرف بـ congenital adren- hyperplasia (CAH) اتحدث نتيجة عيب جيني genetic defect وتؤدي إلى افراز غدة الأدرينال (فوق الكلية) إلى كميات كبيرة من الأندروجينات الأمر الذي يؤدي إلى تحول الأعضاء التناسلية في الاناث ناحية الذكورة ورغم أنه يمكن تصحيح هذا الوضع جراحياً واعطاء الأدوية التي توقف الانتاج الزائد من الأندروجينات إلا أن التغير الذي حدث في المخ في أثناء التعرض لهذه الهرمونات في المرحلة الجنينية لا يمكن إزالته .

شيري بيرنباوم Sheri Berenbaum أجرت أبحاثاً




دقة التوجه بصيب التفكير، وقليلًا من الاناث!

. الفئران التي بها طفرة تسمى -testicular femini-

zation mutation Tfm والتي تتميز بوجود عدد قليل جداً من مستقبلات الهرمون الذكري، وجد أن إعطائها تستوستيرون يؤدي إلى تطور المخ ناحية الذكورة وتصبح مثل الفئران العادية (هذا يدل على أن التأثير ليس تأثير التستوستيرون وإنما مايؤول إليه التستوستيرون).

ولعلك تتساءل الآن عزيزي القارئ اذا كان الاسترايول هو المسؤول حقيقة عن تطور المخ ناحية الذكورة فلماذا لايفعل فعلته تلك مع الاناث وهو الهرمون الرئيس الذي تفرزه مبايضهن آلسن أحق بذلك من الذكورة؟ لم يجد العلماء اجابة واحدة شافية عن هذا السؤال فقاموا بطرح عدد



الاختلافات الموجودة بين الذكور والإناث نتيجة التفرص للهرمونات الجنسية في مرحلة مبكرة من حياتهم

في جامعتي الينوي الجنوبية وكاليفورنيا لوس أنجلوس، على الفتيات المصابات بهذا المرض (CAH)، وفُتِرت لهن ألعابًا من أنواع مختلفة، سيارات، تركيبات، عرائس، أدوات مطبخ، الخ وأُتاحت لهن حرية الاختيار، لاحظت أن هؤلاء الفتيات يعشقن الألعاب الذكورية، فقد لعبن بالعربات لمدة مساوية لزملائهن الذكور، وكلاهما الأولاد والبنات (CAH) يختلف عن البنات الأصحاء في الاختيارات، استنتج الباحثون أن تعريض الاناث في المرحلة الجنينية أو بعد الولادة بقليل لجرعات كبيرة من الهرمونات الذكرية يعدّ من أهم الأدلة التي تؤكد الدور الذي تؤديه الهرمونات الجنسية في إحداث الفروق بين الجنسين.

هذه التأثيرات المبكرة للهرمونات الجنسية يمكن اعتبارها ذات خصائص تنظيمية organizational باعتبارها تؤثر في وظائف المخ بطريقة مستديرة خلال المرحلة الجنينية أو بعد الولادة مباشرة، فإعطاء هذه الهرمونات في مرحلة متأخرة أو بعد البلوغ لايعطي النتيجة نفسها، تفوق الأولاد في الرياضيات والبنات في اللغات.. هل يرجع إلى اختلافات بيولوجية أم إلى التدريب والممارسة؟ هل هناك فروق في الذكاء بين الأولاد والبنات؟

يمتد العلماء أنه لا يوجد فروق في المستوى الكلي للذكاء overall level عند قياسه بمعامل الذكاء IQ ولكن توجد اختلافات في أنماط الذكاء أو القدرات الذهنية في الموضوعات المختلفة، أي أن لكل منهما ملكات خاصة أو نقاط ضعف ونقاط قوة، فمثلا إذا أخذنا مجموعة معينة من الناس واختبرناهم نجد أن بعضهم يتفوق في المهارات اللغوية والبعض الآخر يتفوق في حل المسائل الرياضية مع أنهم على الدرجة نفسها من الذكاء العام. general intelligence الرجال مثلا يتفوقون في حل المسائل الرياضية والفراغية واختبارات المتاهات وتشير التقارير إلى أن احتمال حصول الرجال على مجموع مرتفع (٧٠٠

فأكثر) في مادة الرياضيات في الامتحان التأهيلي الأمريكي SAT أكبر بمرتين من النساء كما أن احتمال تخصصهم في الهندسة أكبر منهم بأربع مرات، أما النساء فيتفوقن في الاختبارات اللغوية والتعرف على العناصر المتقابلة أو المضاهاة matching وتذكر الأشياء والصور، مما يدعو إلى الاعتقاد بأن المرأة تستخدم علامات بارزة landmarks كاستراتيجية للاستدلال والمعرفة وكمنهج للحياة اليومية أكثر مما يفعل الرجل. والذاكرة اللاندماركية land-mark memory تساعد على تذكر الأشياء ومواقعها في حيز مكاني معين وهل الأشياء تحركت من مواقعها أم لا. وقد وجد الباحثون أن الأولاد الذكور في سن ٤.٣ سنوات كانوا أفضل من أقرانهم من البنات في إدارة الأشكال والأرقام في أذهانهم، بينما تفوقت البنات في تذكر قوائم الكلمات، وبالمثل وجدت كاميليا بنباو Camilla Benbow الموجودة حاليا بجامعة فاندربيلت Van-derbilt أن قدرات الذكور في حل المسائل الرياضية كانت أعلى من الاناث، فقد لاحظت تفوق الذكور في اختبار بنتمان Putnam الذي

هبة حسين حواراً مع العالم الكبير الدكتور فاروق الباز رئيس مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن بالولايات المتحدة ونشرته في أخبار اليوم ١٢ يوليو ٢٠٠٢ . وسألته السؤال التالي : هل هناك فروق بين قدرات الرجل وقدرات المرأة في مجال البحث العلمي ؟

وكانت اجابته : «لا يوجد أي تباين في قدرات الجنسين في هذه الناحية، بل ان المرأة أحياناً ما تكون أفضل في بعض المجالات العلمية وقد ظهر ذلك واضحاً من خلال برنامج طرحته في عام ١٩٩٢ لدراسة صور الأقمار الصناعية وتحليلها وأعلنت عن الحاجة إلى جيولوجيين من الشباب وتقدم لي عدد كبير من ٣٠٠ جامعة وبعد فرزهم وقع الاختيار على ثلاثين شاباً وفتاة وعرضت عليهم صوراً لم يروها من قبل ولم يطلع عليها أي عالم أيضاً .. وكانت عن اكتشاف حجم القمر وأعطيت الباحثين ثلاث ساعات لتحليل هذه الصور وتحديد مكوناتها وبعد هذا الاختبار قمت بتعيين ١٠ فتيات وشابين، فقد تبين لي أن الفتيات لديهن سرعة بديهة وادراك أفضل وقوة ملاحظة أكبر، كما أن لديهن شجاعة أكثر للتعبير عما يدور في أذهانهن حتى ولو كان خطأ» .

سهولة الاتصال بين نصفي المخ في النساء قد يكون السبب في كثرة حديثهن ومهارتهن اللغوية :

أشارت الدراسات إلى أن النصف الأيسر من المخ left hemisphere مهم في الكلام أو اللغة، أما النصف الأيمن فيقوم بالمهام الفراغية . والفروق بين نصفي المخ تبدو واضحة في الرجال عنها في النساء، بعض الدراسات أثبتت أن الجسم الجاسئ corpus callosum الذي يربط بين نصفي المخ وكذلك رابط آخر هو anterior commissure يكون أكبر في النساء عنه في الرجال، وهو ما يؤدي إلى سهولة الاتصال بين نصفي المخ عند النساء مقارنة بالرجال ولهذا نجد أن إصابة أحد نصفي المخ عند النساء تكون أقل تأثيراً منها عند

يتطلب مهارات عالية في الرياضيات. وقالت إن هذه القدرات العالية ترجع إلى اختلافات بيولوجية . أما دورين كيمورا Doreen Kimura فتشير في مقالها المنشورة على الانترنت في ساينتفيك أمريكان Scieintific American (١٣ مايو ٢٠٠٢) إلى حدوث تداخل كبير overlap في كثير من الاختبارات المعرفية cognitive tests بين الرجال والنساء، النساء مثلاً يتفوقن على الرجال في الذاكرة اللغوية أو اللفظية verbal memory أي تذكر الكلمات الموجودة في مقالة أو قائمة، وأيضاً في البراعة اللغوية verbal fluency (مثل إيجاد كلمات تبدأ بحرف معين) والفروق كانت كبيرة في الحالة الأولى أي في التذكر memory ability عنها في الحالة الثانية - البراعة اللغوية fluency، ولكنها تقول إن الاختلافات الموجودة بين الرجال والنساء بصفة عامة تعد أقل من الاختلافات الموجودة داخل كل جنس على حدة.

الرجل والمرأة والبحث العلمي .. تجربة شخصية للدكتور فاروق الباز:

على هامش مؤتمر مكتبة الاسكندرية أجرت





قطة الحساسة الاجتماعية عند الرجال يرجع إلى تصور لما قبل التاريخ

براعة المرأة في التعبير عن مشاعرها وعواطفها ترجع أيضاً إلى كفاءتها في استعمال نصفي المخ.

أوضحت دراسة أجريت في كلية الطب في جامعة Yale باستخدام الرنين المغناطيسي - magnetic resonance netic أن الرجال يستخدمون الجانب الأيسر من المخ فقط للتعامل مع المشكلات اللغوية المعقدة ، أما النساء فيستخدمن كلا الجانبين،

الرجال. ومن ناحية أخرى فقد أوضحت دراسة أجريت في استراليا أن الجزء من المخ الذي يستعمل في الحديث واللغات كان أكبر بنحو ٣٠.٢٠٪ لدى النساء عنه في الرجال (أخذين الاختلاف في الحجم في الاعتبار). وقد أرجع الباحثون سبب تفوق الكثير من النساء على الرجال في المهارات اللفظية أو اللغوية إلى وجود هذا الاختلاف التشريحي .

إلى تحطيم الذات self destruction عند الرجال. فكلما الجنسين لديهم قدر متساو من الضغوط، فبينما تتحدث المرأة إلى زميلاتها أو أطبائها نجد أن الرجل يتجرع كل شيء مما يؤدي في النهاية إلى الانفجار.

تفوق المرأة اجتماعيًا يرجع أساسًا إلى الرجل. شهادة علماء الوراثة والاجتماع:

أثبتت بعض الأبحاث الحديثة أن الفروق بين الجنسين في المهارات الاجتماعية ترجع في جزء منها إلى عوامل وراثية على عكس ما كان يعتقد في الماضي. ذكرنا سابقًا أن تحديد الجنس في الجنين الذكر يعتمد على وجود كروموسوم الجنس Y مع كروموسوم آخر من النوع X أما في الأنثى فكلما الكروموسومين من النوع X، هذا الكروموسوم ينتقل إلى الجنين الذكر من الأب، فالحيوان المنوي هو الذي يحدد الجنس عند إخصاب البويضة. لذلك فإن كروموسوم X في الولد انتقل إليه من أمة وليس من أبيه أما البنت فأخذت X من الأب، X من الأم.

في المرض الوراثي المعروف بمتلازمة تيرنر Turner syndrome الذي يؤثر في التطور الجنسي ويسبب أيضًا مشكلات اجتماعية، وجد أن البنات المصابات بهذا المرض لديهن واحد فقط من كروموسومات الجنس X سواء من الأم أو من الأب. والكروموسوم الآخر مفقود. إذن فهناك نوعان من البنات المصابات بمرض تيرنر، النوع الأول يحمل كروموسوم X من الأم والنوع الثاني يحمل كروموسوم X من الأب. وقد وجد ديفيد سكيوز David Skuse أستاذ العلوم السلوكية في معهد صحة الطفل في لندن، أن البنات من النوع الأول (اللاتي يحملن X من الأم) كانت أعراض إصابتهن أكثر سوءًا مقارنة بالنوع الثاني. وقد استنتج من ذلك أن كروموسوم X الأبوي هو مفتاح البديهة والالهام الذي ورثته البنات عن أبيهن.. انه ببساطة سر تفوقهن في المهارات الاجتماعية. أما الأولاد الذكور فأسوأ حظًا حيث لم يرثوا X

وهذا قد يفسر سر تفوق النساء على الرجال ليس فقط في القدرات اللغوية ولكن أيضًا في الناحية العاطفية. فعلى الرغم من أن النصف الأيسر من المخ يتحكم في الكلام فإن النصف الأيمن يساهم في محتواه العاطفي، فقد أوضحت الاختبارات التي أجريت على أفراد يعانون تلقًا في الجانب الأيمن أنهم يتكلمون من دون عاطفة. ومقبرة المرأة على استعمال كلا الجانبين من المخ في الوقت نفسه عند التخاطب تمكنها من أن تتعامل مع مراكز العاطفة في الوقت نفسه الذي تتحدث فيه. أما الرجل فلا يمتلك هذه المقدرة، ومن ثم لا يستطيع أن يعبر عن مشاعره بسهولة. وهناك فيض من الدراسات السيكولوجية التي تعضد هذه النظريات، مما يؤكد أن المرأة غالبًا ما تستطيع التعبير عن مشاعرها - الحب، الحزن مثلاً - بسهولة ووضوح أكثر من الرجل. هذا الفرق في طريقة استعمال الرجال والنساء لأمخاخهم يخلق سوء فهم في العلاقات، لأنه يؤدي إلى عدم التوازن في طريقة تعبير كل منهما عن شعوره نحو الآخر وأيضًا في الطريقة التي تجري بها المحادثات، فالمرأة يجب أن تفحص الموضوع من جميع جوانبه أما الرجل فيتجه مباشرة نحو الهدف وغالبًا ما يضيق صدره بكثرة حديث المرأة. ويعتقد أحد الاختصاصيين النفسانيين (Kostas Kafetsios) أن عدم قدرة الرجل على التعبير عن مشاعره هو السبب في حدوث الكثير من المشكلات في العلاقات بين الرجال والنساء، ويضيف أنه من الصعب اكتشاف عواطف أو مشاعر الرجل، مما يشكل عقبة أخرى في العلاقات خاصة مع العلاقات التقليدية حيث يكون الرجل شديد التحفظ بينما المرأة أكثر وضوحًا وأحيانًا فضولية. ويعتقد إيان بانكس Ian Banks وآخرون ممن هم في طليعة الباحثين في صحة الرجال أنه لا يوجد سبب في أن المجتمع لا يعمل على التغلب على بعض الضغوط pressures التي تقود

ابتداء من عمر ٨ سنوات استجابة لسيغفونية من الاشارات تؤدي إلى التطور الجنسي. وتعمل غدة تحت المهاد (الهيپوثالامس hypothalamus) في المخ عمل المايسترو لتنبية الغدة النخامية - pituitary - لافراز الهرمونات التي بدورها تحفز حويصلات المبيض على النمو وافراز الاستروجين، وفي عمر ١١ أو ١٢ سنة يزداد افراز الاستروجين وهرمونات أخرى من المبيض بدرجة ينتج عنها نمو وتطور الثدي ونمو شعر الابط والعانة وبداية حدوث الطمث. ولأن هذه الهرمونات تؤثر في كثير من الأنسجة، فإننا نلاحظ ظهور علامات البلوغ على الفتيات مثل زيادة افراز الدهون على الشعر والجلد، تقلب المزاج، الميل نحو الجنس الآخر، بالإضافة إلى التقلصات التي تحدث في أثناء الدورة، وبالطريقة نفسها التي يرتفع بها الاستروجين بعد مرحلة الطفولة، فإنه يبدأ في الزوال بعد ذلك بنحو ٢٠ عامًا أي من بداية الثلاثينيات، ولكن تأثير الانخفاض نادرًا ما يكون ملحوظًا إلا في انخفاض الخصوبة حتى بداية الأربعينيات حيث تبدأ المرأة في الاقتراب من سن اليأس perimenopause فيبدأ حدوث الطمث بصورة غير منتظمة ويجف الجلد ويصبح الشعر سهل التقصف وأقل كثافة وبعض النساء يفقدن الرغبة الجنسية وبعضهن يعانين تقلبات المزاج بطريقة مشابهة لمرحلة المراهقة.

ب. إنه أيضًا سر ذكائها وفطنتها. قبل أن يحدث فعله الساحر والعنيف عند البلوغ، بل وقبل أن تولد البنت يترك الاستروجين علاماته الثابتة التي لا تمحي على الوظائف العقلية - men-tal functions والاستروجين لا يقوم فقط بنقش أو نحت المخ في أثناء التطور الجنيني، ولكنه يظل يؤدي دورًا مهمًا في الذاكرة والتعلم مدى الحياة، وبينما تكون جميع الأجنة سواء كانت ذكورًا أم إناثًا معرضة لتأثير الاستروجين الخاص بالأم في الرحم، فإن الذكور فقط هي التي تتنج

من الأب ومن ثم عليهم أن يتعلموا المهارات الاجتماعية دون مساعدة وراثية أو فطرية. ويعتقد سكيوز أن سبب قلة الحساسية الاجتماعية عند الرجال يرجع إلى عصور ما قبل التاريخ حيث كان الوضع يتطلب زيادة قدرة الرجال على القنص والصيد والقتال على حساب الناحية الاجتماعية، فكان على الرجل أن ينسحب من مجتمعات الكهوف ويتجه إلى الأماكن الموحشة التي تتطلب القوة والصلابة حسب قانون الانتخاب الطبيعي. هذه الصفات خدمت الرجال منذ نحو ٤٠ ألف سنة، أما اليوم فالمهارات والعلاقات الاجتماعية أكثر أهمية من القوة البدنية الغاشمة.

الهرمونات بعد البلوغ. هل تؤثر في المخ والتفكير؟

هل التغيرات الهرمونية التي تحدث في البالغين على مدار الأيام والسنوات تؤثر في طرز التفكير والادراك المعرفي cognitive patterns؟ للإجابة عن هذا السؤال يجب التعريف أولاً ببعض خصائص الهرمونات الذكرية والأنثوية وتأثيراتها في الجسم بوجه عام وعلى الادراك المعرفي والسلوك بصفة خاصة:

هرمون الاستروجين:

أ. سر شباب المرأة وأنوئتها هرمون الاستروجين estrogen هو كل شيء بالنسبة إلى المرأة، إنه الأنوثة بعينها وأكسير الشباب بالنسبة إليها ويكفي أن تعرف أن مستقبلات هذا الهرمون توجد في ٢٠٠ نسج من أنسجة الجسم المختلفة، من المخ إلى الكبد إلى العظام. وهذا يعني أن هذه الأنسجة على اختلاف أنواعها تستجيب بطريقة أو بآخرى لوجود الاستروجين. كثير من الأنسجة مثل القناة البولية التناسلية، الأوعية الدموية، الجلد، الثدي تحتاج إلى الاستروجين للحفاظ على سلامتها ومرورتها والقيام بوظائفها. ومن المعروف أن هرمون الاستروجين يبدأ في الارتفاع في جسم الفتاة



يتقدم العمر بتسخ الرجال والنساء من الساحة الهرمونية على حد سواء تقريباً

اللطيف للأنثى يتم طبعها hardwired قبل الولادة نتيجة تأثير الهرمونات الجنسية. تقوم هذه الهرمونات فيما بعد بدور مهم في تأمين نمو خلايا المخ وسلامتها في كلا الجنسين. (في الذكور يتحول بعض التستوستيرون إلى استروجين في المخ)، وحينما يحدث نقص في مستوى الاستروجين فإن الذاكرة والتفكير يتأثران سلباً. في جامعة ماك جيل McGill في مونتريال

الأندروجين من خصيهم testes في الأسبوع الـ ١٢ من الحمل الذي بدوره يؤثر في المخ خاصة منطقة تحت المهاد (الهيبوثلامس) التي تتحكم في السلوك الجنسي وتقوم بتنظيم ميزان الحرارة والماء في الجسم. وكما ذكرنا سابقاً فإن كثيراً من الفروق الموجودة بين الجنسين مثل تفوق الذكور في الرياضيات وتفوق الإناث في اللغات وفي فهم تعبيرات الوجه والتفوق السمعي

وقد أضافت الباحثة أن هذا لا يعني أن المرأة تكون أقل كفاءة بدرجة ملحوظة في حياتها العملية في هذه الفترة، فالتغيرات تكون طفيفة إلى حد ما. وفي دراسة أخرى وجدت اليزابيث هامبسون E.Hampson بجامعة ويسترن أونتاريو W.Ontario أن مستوى أداء النساء عند تنفيذ مهام معينة كان يختلف باختلاف مستوى هرمون الاستروجين لديهن طوال الدورة الشهرية. المستويات العالية من الهرمون كانت مصحوبة ليس فقط بانخفاض القدرات التخيلية أو الفراغية spatial ability ولكن أيضاً بارتفاع المهارات اللغوية واليدوية.

وهناك بعض الشكوك في أن حالات النسيان التي تتاب المرأة عند اقترابها من سن اليأس menopause ترجع إلى التأثير المباشر لنقص هرمون الاستروجين. وقد وجد أن العلاج الهرموني يعطي نتائج جيدة في التغلب على هذه الحالات.

ولكن كيف يؤثر الاستروجين في المخ في البالغين؟ لا توجد إجابة قاطعة حتى الآن وعلى الرغم من الأبحاث الكثيرة التي أجريت في هذا المجال. ففي جامعة روكفلر Rockefeller Univ. أوضحت الأبحاث التي أجراها بروس ماك أوين Bruce McEwen أن الهرمون يزيد من عدد الوصلات بين الخلايا العصبية في منطقة الهيبوكامبس hippocampus وهي المنطقة التي تتحكم في الذاكرة. وجد أيضاً أن الاستروجين يزيد من إنتاج مادة الأسيتيل كولين acetylcholine ذات الأهمية الكبيرة في عمل المخ والذاكرة، وقد وجد أن مستوياتها منخفضة عند مرضى الزهايمر alzheimer (فقدان الذاكرة أو الخرف المبكر). وفي مركز ماونت سينتا Mount Sinai الطبي بمدينة نيويورك أجرى الدكتور هوارد فيليت Howard Fillit الاختصاصي في طب الشيخوخة اختبارات على نطاق ضيق عن تأثير الاستروجين في النساء اللاتي يعانين الزهايمر المتوسط والخفيف، فوجد أن المريضا اللاتي لم

يكندا قامت بربارا شيروين Barbara Sherwin الاختصاصية في علم النفس بدراسة تأثيرات العلاج بالاستروجين في النساء اللاتي أزيلت مبايضهن (مصدر إنتاج الاستروجين) فوجدت أن النساء اللاتي تم حقنهن بالاستروجين كن أفضل في التعلم واسترجاع المعلومات من اللاتي لم يأخذن استروجين. وقد كان التأثير محدداً بطريقة مدهشة، حيث تفوقت تلك النساء في الاختبارات اللفظية (verbal tasks) مجال تفوق المرأة وليس الذاكرة التخيلية. وقد لوحظ أيضاً أن مجرد الارتفاع والانخفاض في مستوى



السهر نحو الذكاء والسلطة يقوم من عقولنا القديمة القديمة

الاستروجين في أثناء الدورة الشهرية للمرأة يمكن أن يؤثر في الأداء الذهني. فالتغيرات أبلغين بلاء حسناً في اختبارات بربارا شيروين في أثناء الفترة من الدورة التي يرتفع فيها مستويات هرمونات الاستروجين والبروجسترون مقارنة بفترة الطمث menstruation حينما تكون مستويات الهرمونات منخفضة.

المتحدة) بعد ذلك يدخل التستوستيرون إلى أنوية الخلايا ويحث المادة الوراثية DNA على إنتاج مزيد من البروتين اللازم لنمو العضلات. وتجدر الإشارة إلى أنه في أثناء التمرينات العضلية الهوائية يتم تكسير البروتين لاستغلاله في إنتاج الطاقة، وهو ما يؤدي إلى تضائل حجم العضلات. ويعتقد أن هذا هو السبب في أن كثيراً من العدائين runners يمارسون الرياضات الثقيلة مثل رفع الأثقال لاستعادة مايفقدونه من كتلة العضلات. ويقول الدكتور كرامر أنه يمكنك زيادة إفراز هرمون التستوستيرون في أثناء

يعرفن الشهر أو السنة استلطن تذكرهما بعد ثلاثة أسابيع فقط من إعطائهن جرعات يومية من الهرمونات، وقد أصبحن أكثر يقظة وانتباهاً وتحسنت حالاتهن في الأكل والنوم والسلوك الاجتماعي، ويعتقد فيليب أن العلاج بالتستوستيرون ربما يكون له التأثير نفسه في المرضى من الذكور. ومع ذلك فإن الاستروجين لم يتم اعتماده بعد كعلاج لمرضى الزهايمر، ولكن الأمل كبير في أن يصبح علاجاً نافعاً إذا ما توافر مزيد من الأدلة والبراهين التي تؤيد فائدته وسلامته للوقاية أو العلاج من هذا المرض اللعين.

وماذا عن التستوستيرون Testosterone؟

أ. فكرة عامة: التستوستيرون هو هرمون الذكورة male sex hormone أو بمعنى أدق هو أقوى الهرمونات الذكورية التي تعرف بالأندروجينات androgens ويتم تخليقه من الكوليسترول في خلايا تعرف بخلايا ليديج leydig cells بالخصية، ويتم إفرازه مباشرة في الدم، ويبدأ تأثيره في الجنين قبل أن يولد حيث تقوم خصيتا الجنين بإفرازه إذا كان الجنين ذكراً (xy) فيؤدي إلى تطور الجنين ناحية الذكورة وعدم وجوده (xx) يؤدي إلى تطور الجنين ناحية الأنوثة كما ذكرنا سابقاً. بعض التستوستيرون يتحول إلى هرمون مشابه يسمى dihydrotestosterone (DHT) يؤدي إلى نمو الأعضاء الجنسية ويعزى إليه أيضاً حدوث الصلع ومشكلات البروستاتا (prostate) في البالغين. بعد الولادة يتوقف إفراز التستوستيرون ليبدأ إفرازه ثانية عند البلوغ حيث يؤدي إلى استكمال نمو الأعضاء التناسلية وتطور صفات الجنس الثانوية مثل شعر الوجه وخشونة الصوت وإفرازات الجلد الدهنية وخلافها.. بالإضافة إلى تنبيه نمو العظام والعضلات. وفي أثناء التمرين العضلي يزداد تركيز التستوستيرون في الدم بنحو ٢٧٪ (وليام كرامر William J. Kraemer مدير معمل الأداء البشري بجامعة Ball State في إنديانا بالولايات



بعد البلوغ والفتح تقع الحمل فريسة للكشف أكثر من

التمرينات العضلية إذا ما تناولت غذاء غنياً بالكربوهيدرات والبروتين قبل التمرين بساعتين وكذلك بعده مباشرة.

التستوستيرون والسلوك

على الرغم من أن تصرفات الرجال قد تحسنت منذ أيام جنكيز خان الذي استولى على

تفسيرها على أساس الاختلافات البيولوجية أو الموروثة رغم أنه لا يمكن استبعاد الفروق الاجتماعية كلية بسبب مرور ما يقرب من سنة من أعمارهم ذاقوا فيها بعض جوانب الحياة الاجتماعية. بعض العلماء يضعون التستوستيرون في قفص الاتهام حيث اثبتت نتائج التحاليل ارتفاع مستويات التستوستيرون في دماء المجرمين والعدوانيين من الرجال، ولكن ذلك لا يعني أن كل من لديه مستوى مرتفع من التستوستيرون يكون أكثر عدوانية واجراماً من أقرانه ذوي المستويات المنخفضة، فبعض العلماء يعتقدون أن الزيادة من التستوستيرون تتحول في الجسم إلى الهرمون الأنثوي «الاستروجين» خلال عملية كيميائية تعرف بـ aromatization تؤدي إلى انعكاس السلوك negative behavior وهذه العملية قد تكون السبب في نمو أنسجة الصدر لدى بعض الرجال أو ما يعرف بـ gynecomastia في كتابه الشهير «أبطال، مجرمون، محبون: التستوستيرون والسلوك» أجري داببس Dabbs استاذ علم النفس الاجتماعي في جامعة ولاية جورجيا الأمريكية أبحاثاً حول التأثيرات القوية للتستوستيرون على الأفراد والمجتمعات. يقول داببس إن هذا الهرمون هو الذي يعطينا الطاقة والطموح والجرأة ومن دونه ما استطاع الإنسان القديم أن يفاد كهغه وما استطاع الإنسان الحديث أن يخترع أبسط الاختراعات بدءاً من العجلة. ولكن وعلى الرغم من تعدد مزايا هذا الهرمون إلا أنه المسئول الأول عن الجرائم التي ترتكب بحق المجتمع ويشير داببس إلى أن الصندوق الأسود لهذا الهرمون العجيب، على حد قوله، ما زال يحوي الكثير مما لم نعرفه وعلينا الغور في أسباره لاكتشاف كيف يؤثر هذا الهرمون فينا من الناحية الفسيولوجية قبل أن نقوم بتصنيف الأفراد على حسب إنتاجهم من هذا الهرمون. النساء لديهن تستوستيرون أيضاً. من المثير أن نعرف أن الله تعالى لم يحرم النساء

نحو ثلثي العالم في بدايات القرن الـ ١٣ وكان يقول «إن السعادة العظمى التي يمكن للرجل أن يعرفها هي الانتصار على أعدائه وسوقهم أمامه والاستيلاء على ممتلكاتهم» إلا أننا في قلوبنا وعقولنا مازلتنا الحيوانات أنفسها، يقول العالم النفسي بول جليبرت «خذ أكثر من نصيبك ما زال على رأس شعارات الذكورة، ولذلك يمثل العالم بملايين الاستبداديين. فالسعي نحو المكانة والسلطة ليس مجرد عادة أو تقليد ثقافي، ولكنه مقوم من مقومات النفسية الذكورية، انه دافع بيولوجي متأصل في النظام العصبي ومنظم بواسطة هرمونات وكيمائيات مخية. والتنافس الذكوري لا يقتصر على الإنسان فقط ولكنه موجود في جميع أنحاء المملكة الحيوانية ابتداء من الحشرات إلى الحيوانات الأكثر تطوراً كالكلاب والغزلان والقردة وانتهاءً بالإنسان. يقول عالم الأنثروبولوجيا ريتشارد رانجام من جامعة هارفارد: إن التستوستيرون يصل إلى القمة خلال المنافسة ويبقى مرتفعاً بعد ذلك في جسم الفائز ولكنه يهبط في جسم الخاسر. في برنامج تليفزيوني أذيع في الولايات المتحدة على الهواء في فبراير عام ١٩٩٥م تحت عنوان «الأولاد والبنات مختلفون» Boys and Girls Are Different تقديم جون ستوسل John Stossel تحدث فيه عن أبحاث أجريت عن الفروق بين الجنسين. وكان من أهمها البحث الذي أجراه مايكل لويس Mi-chael Lewis على الأولاد والبنات وهم في السنة الأولى من أعمارهم.. وضع حاجزاً يفصل بين الطفل وأمه بحيث يستطيع الطفل رؤية أمه ولا يستطيع الوصول إليها، حاول الأولاد الذكور تحطيم الحاجز والوصول إلى أمهاتهم بينما وقفت البنات يبكين دون حراك. هذا البحث يدعم الدراسات السابقة التي تقول بأن الرجال أكثر عدوانية وأكثر ميلاً إلى العنف من النساء. ولكن بما أن الأطفال موضع الدراسة لم تتعد أعمارهم عاماً ميلادياً واحداً، فإن النتيجة يمكن



٣٧

الذكور في الرياضيات والقدرات التخيلية يتطلب مستوى أمثل من الأندروجين optimum level .

هل هناك علاقة بين التستوستيرون والاكتئاب؟
على الرغم من أن الاكتئاب depression يصيب النساء أكثر من الرجال بمقدار الضعف تقريباً، إلا أن معاناة الرجال منه تكون أكثر. يعتقد العلماء أن هذا الاختلاف يرجع في جزء منه إلى العادات والتقاليد والثقافة السائدة في المجتمع، فالمجتمع يمجّد ويكافئ الرجل القوي، ويرجع في الجزء الآخر إلى الهرمونات، قبل

من هذا الهرمون الخاص بالرجال فقد أعطاهم القدرة على إنتاجه ولكن بنسبة تبلغ ٨/١ إلى ١٠/١ نسبيته عند الرجال، إلا أن النساء دائماً حظنن أو كيدهن عظيم فالعلماء يقولون إن أجسام النساء ذات حساسية للكميات الصغيرة من الهرمون تفوق حساسية الرجال ويتقدم العمر تنخفض مستويات التستوستيرون عند الرجال وترتفع عند النساء نسبياً، وذلك لانخفاض الهرمون الأنثوي (الاستروجين) لديهن، وفي النهاية ويتقدم العمر يصبح الرجال والنساء من الناحية الهرمونية على حد سواء تقريباً.



يغزو الأوتار في النباتات وتغير الفئات في الاختلافات المعقدة

البلوغ يعاني الصبيان والبنات الاكتئاب بنسب متساوية تقريباً، وبعد البلوغ والنضج تقع البنات فريسة للاكتئاب أكثر من الأولاد، ربما بسبب العواصف الهرمونية التي تجتاح الاناث في تلك الفترة، وبالنسبة إلى الذكور فربما توفر لهم الهرمونات الذكرية خاصة التستوستيرون مزيداً من الحماية، وإذا كان الوضع كذلك فهل يقع

ب . هل تؤثر التغيرات الهرمونية لدى الرجال في المخ والذاكرة؟
أثبتت الدراسات وجود اختلافات موسمية في القدرات الفراغية للرجال، حيث يحسن أداؤهم في الربيع، الوقت الذي ينخفض فيه هرمون التستوستيرون على عكس مايتوقع الكثيرون، مما يدعو إلى الاعتقاد بأن تنفوق

كلتا الحالتين. وقد حدثت ثورة في علاج الاكتئاب بداية من تسعينيات القرن الماضي حينما تم اكتشاف عقار البروزاك prozac ومنذ ذلك الحين تتزايد أعداد المرضى الذين يتعاطون الأدوية المضادة للاكتئاب. ففي دراسة حديثة وجد أنه في عام ١٩٨٧م كان ٢٧٪ من المرضى فقط يتعاطون أدوية الاكتئاب. تضاعف هذا العدد تقريبا بعد مرور ١٠ سنوات ليصل إلى ٧٥٪ تقريبا، وهذه الأعداد في تزايد مستمر نتيجة لاكتشاف أدوية جديدة. ومع أهمية استخدام الأدوية في العلاج إلا أن العلاج الذهني cognitive لا يقل بحال من الأحوال عنها في الأهمية ويتم ذلك بالتحدث إلى المرضى وتعليمهم بأن يوسعوا نظرتهم للحياة وألا يلتفتوا الجوانب السلبية والسلبية منها. ويستحسن استخدام الأسلوبين معا من أجل النهوض بالمرضى .

التوحد Autism بالمعنى التقليدي هو خلل عصبي ينتج عن أسباب غير واضحة تماماً، إلا أنها تتضمن عوامل وراثية. ويتميز بنمو سريع للدماغ في المراحل الأولى من الطفولة، وفي شكله التقليدي يفقد الشخص المصاب الحس الاجتماعي ويجد صعوبة في التواصل مع الآخرين ولا يتجاوب مع الألعاب الجماعية ويتصرف بطريقة غير مهذبة مع أنه ذكي بما يكفي لمعرفة التصرف السليم. والكثير من الذين يعانون هذا الداء متخلفون عقلياً ويتطلبون عناية خاصة طوال حياتهم. لكن لداء التوحد عدة صور أخرى لدرجة أن الخبراء يشبهونه بعرض ضغط الدم حيث يختلف الناس المصابون به بدرجات متفاوتة.

ومن الحقائق المعروفة أن التوحد يصيب الذكور أكثر من الإناث، ففي أمريكا وحدها يوجد مليون شخص مصاب بالتوحد، تبلغ نسبة الذكور منهم أكثر من ٨٠٪. وتشير الدراسات إلى أن



المرأة أكثر مقلقة من العنوسة

ومع أن معظمنا يتحلى بالقدرتين معاً، إلا أن الدراسات تشير إلى أن تفكير الإناث يتبع الطراز الأول أي التعاطف ويرمز له بالرمز E. أما الذكور فيتبعون الطراز الثاني ويرمز له بالرمز S. وطبقاً لتعريف بارون كوهين فإن داء التوحد هو نسخة مبالغ فيها من شخصية الذكر أي extreme systemizer أو الولع الشديد بالأنظمة المستندة إلى قواعد مع العجز عن فهم مشاعر الناس ونواياهم. وطبقاً لهذا المفهوم فإن التوحد لا يعتبر مرضاً بحاجة إلى علاج، وإنما هو نمط ذهني mental style يمكن

الهرمونات الجنسية تؤثر في المخ فتصوغ عقول الذكور والإناث لأنواع مختلفة من التفكير. وفي كتاب جديد بعنوان The Essential Difference أي «الفرق الأساسي» لعالم النفس سايمون بارون كوهين Simon Baron-Cohen من جامعة كمبريدج عرّف المؤلف داء التوحد بأنه اختلال في التوازن بين نوعين من الذكاء أو التفكير: النوع الذي يستعمل لفهم الناس ويسميه بالتعاطف Empathizing. النوع الذي يستعمل لفهم الأشياء ويسميه بالتطعيم Systemizing.

على الأقل - في الانتحار، القتل، تليف الكبد، ويعلق ساخراً:

الرجال لا يتعرضون فقط للحوادث أكثر من النساء، ولكنهم في الحقيقة حوادث تنتظر التنفيذ، وتجدر الإشارة إلى أن الحوادث تعتبر ثاني أهم أسباب الوفيات في الرجال ما بين ١٨ و ٢٥ عاماً. وقد ذكر وليامز أيضاً أن الذكور الأمريكيين في جميع الأعمار أضعف صحياً وأكثر عرضة للخطر من الإناث وأن:

- معدل التدخين أعلى في الذكور (٢٦٪) موازنة بالإناث (٢٢٪) على الرغم من أن نسبة المدخنات في تصاعد مستمر.

- احتمالات أدمان الكحوليات بين الذكور ضعف نسبتها بين الإناث. الذكور ينغشطون في سلوكيات تضعهم في مخاطر صحية أكثر من الإناث، ابتداء من المخدرات إلى القيادة من دون حزام أمان.

- الرجال يعملون في أماكن أكثر خطورة من التي تعمل بها النساء، وهذا يتسبب في ٩٠٪ من الوفيات التي تحدث في أثناء العمل ومعظمها في الزراعة.

- الرجال يتعرضون لحوادث مرور أكثر من النساء نتيجة لقيادتهم وسائل نقل أكثر خطورة مثل الموتوسيكلات والنقل الثقيل.

- معدلات إصابة أو وفيات الرجال نتيجة العوامل البيئية مثل الرعد والبرق والفيضانات وغيرها تبلغ ضعف معدلاتها عند النساء، طبقاً لتقرير صدر في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من أن هذه الأسباب وحدها كما يقول وليامز كغالبية بأن تجعل أعمار الرجال أقصر، إلا أن المجتمع يضيف إليها عوامل ومعتقدات ثقافية أخرى مثل مكافأة وتشجيع الرجال الذين يقومون بأعمال وألعاب خطيرة.

الاهتمام بالصحة بين الرجال والنساء:

- النساء أكثر اهتماماً بصحتهن من الرجال،

للناس أن يتعلموا التكيف معه. وتحكي الدكتور بريانا سيجيل Bryna Siegel من جامعة كاليفورنيا - سان فرانسيسكو قصة روتها إحدى الأمهات التي أخذت ابنها المصاب بالتوحد مع أخواته البنات غير المصابات لمشاهدة فيلم يسمى Finding Nemo أو البحث عن نيمو عن ذكر من الأسماك Cown Fish يفقد أمه ويفترق عن أبيه، فسألتهما الفتيات عما إذا كان نيمو خائفاً، أما ابنتها المتوحد فقد ابتعدت عن المشاعر تماماً وسألها: ماذا تأكل هذه الأسماك بالتحديد؟ فالتوحديون يهتمون غالباً بتجميع حقائق كهذه ويتذكرها معظمهم بدقة متناهية، أما الجوانب الاجتماعية والعاطفية فينقلون عنها تماماً.

النساء أطول عمراً من الرجال، لماذا؟

هل سألت نفسك يوماً، لماذا يموت الرجال في عمر مبكر؟ ولماذا تعيش النساء أكثر؟ الاحصاءات تشير إلى أن المرأة تعيش في المتوسط «باذن الله» خمسة أعوام أكثر من الرجل (متوسط عمر الرجل في الدول المتقدمة نحو ٧٤ عاماً والمرأة نحو ٧٩ عاماً). وقد اعتاد الناس على قبول هذه الحقيقة على أنها ناتجة من التركيب الوراثي وليس نتيجة التربية والبيئة. ولكن في دراسة حديثة نشرت في مجلة الصحة الأمريكية ونقلتها مجلة تايم على الإنترنت في مايو ٢٠٠٢ اتضح أن سلوك الرجال وتصرفاتهم والطريقة التي يفكرون ويعملون بها ونظرتهم إلى الحياة ونظرة المجتمع إليهم والضغط التي يتعرضون لها، كلها أمور مسؤولة أيضاً بدرجة كبيرة عن موتهم في عمر مبكر مقارنة بالنساء. ديفيد وليامز David Williams الباحث في العلوم الاجتماعية بولاية ميشيغان الأمريكية يقول في دراسة بعنوان «الرجال يتفوقون على النساء في خمسة عشر سبباً رئيساً للوفيات ماعداً واحداً: الزهايمر»، معدل وفيات الرجال أكبر بمرتين.

٤١

السويد أن جسم المرأة أفضل من جسم الرجل في استعمال الدهون، مما يجعلها أكثر قدرة من الرجل على تحمل الرياضات العنيفة أو الشاقة endurance exercises فمثلاً إذا أُلقيت رجلاً وامرأة في البحر في يوم بارد ستجد أن نظام توزيع الدهن في جسم المرأة يساعدها على البقاء فترة أطول من الرجل. الدهن في جسم الرجل يتركز حول الوسط waist بفعل الهرمون الذكري (التستوسترون) فيأخذ الجسم الشكل التفاحي apple shape أما المرأة فتتميل إلى الشكل الكمثري pear shape بسبب الهرمون الانثوي - الاستروجين (estrogen) وقد وجد أن الجسم ذو الشكل التفاحي أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكر. ورغم أن الأبحاث الطبية في الماضي كانت تهتم أكثر بصحة الرجل، إلا أن الوضع قد تغير حالياً وأصبحنا نسمع عن طرق الوقاية أو الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي أكثر مما نسمع عن سرطان البروستاتا مثلاً.

هل للزواج علاقة بالصحة وطول العمر ؟
وأيهما في حاجة للزواج أكثر، الرجل أم المرأة ؟
لقد حثنا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام على الزواج «يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» وقال أيضاً «أراذل موتاكم عذابكم» وهذا يدل على أهمية الزواج وفائدته لكل من الرجل والمرأة على حد سواء بالإضافة إلى أنه السبيل الوحيد لإقامة مجتمع قوي وسليم من الناحية الصحية والاجتماعية. ولكن.. في كتابين طائراً وحدي Flying Solo: single women in midlife وهو عن النساء اللاتي تجاوزن منتصف العمر ولم يتزوجن وجدت كارول أندرسون، وسوزان ستيوارت، وسونا ديميجيان أن كثيراً من هؤلاء النسوة كن سعيدات في حياتهن على عكس الكثير من النساء المتزوجات. أما الرجال



حالات الشيخوخة التي تتدهور المرأة عند اقترابها من سن الرأس ترجع إلى تأثير الهرمونات في هرمون الاستروجين

فمعدل ذهاب المرأة إلى الطبيب يبلغ ضعف معدل ذهاب الرجل. كذلك فإن درجة اهتمامها بالصحة الوقائية أكثر من اهتمام الرجل، هذا بالإضافة إلى أن الرجال لا يحاولون تنظيم مواعيد أو جداول لزيارة الطبيب للأطمئنان على صحتهم أو للمتابعة مثلما تفعل النساء. - الرجل يحاول دائماً أن يتجرع مشاكله السيكولوجية، بينما تبحث المرأة عن طلب المساعدة من الاخصائيين. - جميع الأمراض المصاحبة للجهد والضغط النفسي ابتداء من ارتفاع ضغط الدم إلى أمراض القلب غالباً ما تكون من نصيب الرجال. - أوضحت بعض الدراسات التي أجريت في



على الجبال منطقة بولسندا وعلى الجبال

والصحة American J. Sociology & Health وجد
أن احتمال إصابة الرجال الغير متزوجين
بالاضطرابات العقلية تبلغ ثلاثة أضعاف
المتزوجون منهم. وقد وجدت إحدى شركات
التأمين الأمريكية أن تقبيل النساء لأزواجهن قبل
ذهابهم إلى أعمالهم يقلل من احتمالات تعرضهم
للحوادث بمقدار النصف مقارنة بأقربانهم الذين
لم يحصلوا على أي من ذلك.

المتزوجون فكانوا في حالة جسمانية وعقلية
ووظيفية أفضل من غير المتزوجين. أي أن
الزواج يؤدي إلى تحسن الحالة الجسمانية
والذهنية والوظيفية للرجل، أما في المرأة
فيؤدي إلى عكس هذه النتيجة على حد قولهن.
وتشير بعض الدراسات إلى أن المرأة أقل احتياجا
للرجل، أما هو ففي حاجة ماسة إليها. وفي
دراسة نشرت في المجلة الأمريكية لعلوم الاجتماع

المراجع والهوامش

- ١- فاروق الباز. (٢٠٠٣). علوم وتكنولوجيا. أخبار اليوم ص (٢٠). ١٢ يوليو ٢٠٠٣. القاهرة. جمهورية مصر العربية.
- ٢- كاوي ج. (٢٠٠٣). لماذا نسعي للحصول على المكانة. Newsweek باللغة العربية. العدد ١٥٩ (أول يوليو) ص ٥٢-٥٧. دار الوطن، الصفقة. الكويت.
- ٣- كاوي ج. (٢٠٠٣). البنات والصبيان وداء التوحّد. Newsweek باللغة العربية. العدد ١٧٠ (١٦ سبتمبر) ص ٤٦-٥٥. دار الوطن، الصفقة. الكويت.
- 4-Cowley, G. (2003), Girls, Boys and Aut-Newsweek.com ism, Newsweek, Sept. 8.
- 5-Dabbs, J. and M. G. Dabbs. Heres. Rogues and Lovers: testosterone and behavior. McGraw Hill/book review: A. M. Paul. Sept. 2000.
- 6-Gene wars: meet man's new boss. Pp. 46-52. Focus, April, 1998, Leicester, U.K.
- 7- Hadley, M. E. 1984. Endocrinology. Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey.
- 8-Kallen, B. (1999). Truth and testes: the pros and cons of our maliest hormone (testosterone). htm.
- 9- Kimura, D. 2002. Sex differences in the brain. May 13. Scientific American.htm.
- 10- McEwen, B. S. 1976. Interactions between hormones and nerve tissue. Sci. Amer. 235:48-58.
- 11- Short, R. V. 1982. Sex determination and differentiation. In: C. R. Austin and R. V. Short, (Ed.) Reproduction in Mammals. 2. Embryonine and fetal development. Pp.70-113, Cambridge University Press, UK.
- 12-Wallis, C. (1995). The estrogen dilemma. Time. Pp. 54-59. June26.
- 13-www. Economist.com. Sex in season. Mar. 27. 2003.
- 14-www.Makind-org-articles-htm. Men, Women and Sex Differences. by: Eisenman, R..
- 15- www. Time.com. Why Men Die Young. by: Gupta, S. May 4, 2003.



أهم ما تفضله المرأة في شريك حياتها

جمع الباحثون في شتى أنحاء العالم خلال نصف القرن الماضي بيانات ضخمة عن أولويات المرأة في الزواج ودرسوا المجتمعات البدائية وأجروا استطلاعات للرأي وحلّلوا حتى الاعلانات الشخصية فماذا وجدوا؟ وجدوا أن المرأة تفضل باستمرار «القدرة على الربح أكثر من الوسامة المظهر الحسن».



التعاون والغدر،
جماعات شتى تقتتل وتفترس وتخنق بعضها
بعضاً، منها المتطفل ومنها السام، وثمة الناعم
المستكين .. والشوك سلاح والزهر إغراء . هنا
مملكة النبات .. أهلاً وسهلاً!!

علاقات الحرب الكيميائية
تزخر المملكة النباتية بأكثر من ألف نوع من
السموم تفرزها أنواع كثيرة من النباتات، النصيب

ونبصر النباتات قضيًا نائمة يحضنها الماء،
يهغو إليها النور ليداعبها فيتسامق الشجر بهيّا
نحو السحاب.

وحين تكتظ الأشجار يشح الضوء والغذاء
فتتنافس ناعسة، لتغط بالليل في سباتها . هذا ما
نرى، ونحن نرى ما نريد . إنما يكون أن نتبصر
مشاهد أخرى لعبة البلسم والسّم، ولعبة الدعم
والخنق !! هنا يختلط الكيميائي بالفيزيائي لتقام
مملكة صاخبة وكائنات تمارس الحرب والسلام..



من أشهر الأدوية البنسلين الذي اكتشفه العالم الكسندر فليمنج عام ١٩٢٨م في فطر البنسيليوم؛ فهذه المادة العلاجية هي في الحقيقية مادة شديدة السمية على كثير من الأحياء. وقد تلا ذلك الاكتشاف العظيم ببضع سنوات ما استخلصه العالم الأمريكي ريتشارد وندلج من أن فطر جلاديو كلاديوم *Gliocladium* ينتج مادة سامة هي *Gliotoxin*.

مع بدايات منهجية البحث في علم النبات


الأوفر منها يفتك بنباتات أخرى، أما القليل المتبقي فهو لمواجهة كائنات شتى خارج مجتمعات النبات، وقد خبر البشر السموم منذ القديم فاستخلصوها تارة للقتل وأخرى للعلاج وقالثة للعطور. فمن القتل ما يروي لنا صاحب الجمهورية الفاضلة في إحدى معاوراته من أن سقراط قد مات نتيجة تأثير سم نبات الشوكران المسمى بمادة الكونين على الرغم من أن الروايات تقول إنه مات مقتولا، أما العلاج، فنحن نعلم أن



النباتات النائية

وتداخله مع علم البيئة لوحظت مجموعات محددة من النباتات تميل للعيش مع مجموعات بعينها من أنواع مختلفة، وعلى النقيض، فهناك أنواع يستحيل أن تتواجد مع أنواع أخرى بغض النظر عن ملائمة البيئة المناخية المحيطة. ومن هنا بدأت تتبلور ملامح السلوكيات والعلاقات للمجتمع النباتي. ويروي العالم جيمس بونر James Bonner سيرة بعض العلاقات الاجتماعية بين النباتات، فتتخيل مصانع خضراء تنتج أسلحة هجومية لحرب ضروس، ليمس ضرورياً أن يشهر النبت السلاح من أجل صراع حول الغذاء أو الضوء، أو خلاف ذلك من الاحتياجات، ولكن يكفي أن يكون بينها نوع من النفور الوراثي. ومن أول التوثيقات العلمية ما سجله النباتي السويسري أوغستين في أوائل القرن التاسع





فطر حبيبي قاتل

عشر، حين رصد إعاقة نمو الشوفان من إفرازات الحسك أو الشوك *Thistles*، ومشايبه لذلك ما دونه الباحث بيكرنج *Pickering* قبل نحو قرن في إنجلترا، الذي استرعى انتباهه أن الماء حين يمر على أحواض بعض النباتات النجيلية النامية ويصل إلى أشجار التفاح كان يعوق نموها، وبعد تعقب وتحليل عثر على إفرازات كيميائية تطلقها في الماء من أجل التخلص من منافسة خصومها على الغذاء واستقبال ضوء الشمس.

على إثر تلك التجارب الأولية توالى البحوث الحديثة، وكان من أجدرها ما تتبعه العالم الألماني بود والبلجيكي فيونك بين العقد الرابع والخامس من القرن العشرين، الأول شاهد تهاك النباتات أو موتها حول أعشاب الشيح الرومي *Artemisia Absinthium*، وكان هذا التأثير يتسع في





شجرة ميموزا في عمق الغابة حيث تنلق الضوء

المسببة للهلوسة وأمراض مستديمة، وكان يقال إنها تجعل القلب أكثر حناناً ورقة. ومع الوعي بسميتها فإن للأبسنتين استعمالات متعددة وهي توجد في الأسواق حالياً بصورة مقلدة.

أما الشجيرة الهشة المسماة انسيليا فارينوزا *Encelia Farinosa* التي تنمو بجنوب غرب الولايات المتحدة فالبقعة التي تظللها والتي تحيط بها تكون في الأغلب جرداء إلا فيما ندر. فمن أوراقها تفرز مادة تقضي على الأنواع النباتية، وليس لها أي ضرر على النباتات الأخرى من النوع نفسه، ولكن بعض النباتات لا تتأثر بسمية هذه المادة كالشعير وعباد الشمس. وقد تبين أن السمية التي تحملها الأوراق المتساقطة من هذا النبات، تظل فعاليتها قرابة عام كامل، ولا تزول سميتها إلا بعد هطول مطر غزير يغسلها من

دائرة نصف قطرها متر. أنتد قام بفك اللغز؛ إنه مركب الأبسنتين *Absinthin* السام، المثبط للنمو والقابل للذوبان في الماء فعندما يهطل المطر يتسرب إلى التربة المجاورة ويهلك من يمتص منها. هذا المركب يتكون في الشعيرات الغدية الموجودة على سطح أوراق الشَّيخ، وليس كل النباتات تتسم به، فبعضها يستطيع مقاومتها.

وكلمة *Absinthium* تعني باللاتينية بلا حلوة أو المر. والمادة الفعالة فيها هي *Absinthe* وكانت توصف لبعض العلل الباطنية كما أنها تقتل الطفيليات الدودية المعوية، وبعض أنواعها لا تزال تستعمل إلى يومنا هذا للغرض ذاته. وفي القرن التاسع عشر كان لتلك المادة شأن مع الفن والأدب إذ كان يصنع منها في أوروبا شراب روحي يفضلته الفنانون، ويحتوي على مادة *Thujone*

ويدعى بالإنجليزية *stinging nettles or greater nettles* وهو نبات زاحف معمر، ساقه ترتفع إلى نحو متر ونصف المتر، ذو أوراق مسننة تغطي بشعيرات لاسعة، وإذا مستها يد غافلة نشبت فيها وتسبب حمض منها عصارة محترقة تؤلم اليد بسبب حمض التمليك وبعض الأمينات *Formic acid, amines* وفي منطقة كوينزلاند بأستراليا توجد أشجار لها شعر لاسع سام وثمارها ذات رؤوس قرنفلية اللون، والشعيرات السامة تثبت في قنابات متضخمة وتمتلك عدداً تنتج إفرازات سامة.

وبعض النباتات المتسلقة الملتفة لها محاليق ذات حساسية عند اللمس، فعند تماسها مع جسم صلب فإن الخلايا التي على الجانب البعيد تستطيل فجأة وبسرعة كبيرة، بينما تنقبض الخلايا الملاصقة للجسم، مما يجعل المحلاق يلتف حوله، ويتم كل ذلك في غضون دقيقة أو نحو ذلك، فهذه النباتات تتحاييل على النباتات اللاسعة وتراوغها، مثل النبات المتطفل المشهور الحامول من نوع *Cuscuta Europaea* الذي يلتف حول النبات دون أن تمسه الشعيرات ثم يتغذى عليه بواسطة ممصات يفرسها في مسار نسغ النبات وعصارته. ومنذ القدم لاحظ الناس أن أشجار الجوز الأسود *Black Walnut* لها تأثير ضار على نمو النباتات المختلفة المحيطة بها، مما أثار التوقع إلى وجود مواد كيميائية تبيث جذور الجوز الأسود في التربة. وفي الزمن الحاضر تبين أن هذه الأشجار تنتج مادة الججلون *Juglone* في أوراقها وجذورها وهي تهلك الكثير من النباتات مثل الطماطم.

وبأساليب متفاوتة يحتدم الصراع ويضطرم، فأشجار الصنوبر تتخلص من الدخلاء بإفراز مادة ذات خصائص سرطانية، ويدور الصراع بين الخزامى والشروء من الفصيلة المركبة، وبين الأفيستين *Absinth* والشمر *Foeniculum*، والثوم يقتل الهندباء والجوز يهلك البرسيم وهلم جرا .. وتستمر الحرب لدرجة أن عشبة الطفرة التي تقوم بإفراز مادة تحول دون نمو المردقوش المنزوع

طبقات التربة العلوية.

وما يثير الدهشة هو أن بعض الأنواع قد تفرز مركبات تكون ضارة أيضاً ببني جنسها نفسها من الأنواع، فشجيرة أقحوان المطاط *Par-thenium Argentatum* التي تنمو في صحاري جنوب غرب الولايات المتحدة، وتنتج مطاطاً من أجود الأنواع الطبيعية تفرز جذورها في العمل مادة تسمم البادرات التي من نوعها نفسه ! وهذه المادة هي السيناميك، ومجرد وجودها في التربة بنسبة خمسة أجزاء بالمليون كاف لمنع نمو البادرات. ويتساءل المرء، ما الذي يدعو نبات ما ليفرز سمّاً يقضي على نبات من أضرابه نفسها في الوقت الذي يكون هذا السم أقل تأثيراً في النباتات من أنواع أخرى ألا يعد ذلك معارضةً لنواميس الحفاظ على النوع؟ يرى بونر بأن ذلك ربما يرجع إلى أنه في البيئات الصحراوية الشحيحة يتم توزيع أفراد النوع الواحد عادة لتكون المسافة بين بعضها متسعة ومنظمة كما لو كان الغرض منها هو اقتسام النزر اليسير من الماء والعناصر الغذائية بما يكفي لبقاء هذه النباتات. وهذا مشابه لأساليب تحديد النسل الذي تنظمه بعض المجتمعات البشرية، أو ربما هو أشبه بعمليات الاجهاض.

ومن لطيف الإشارة أن ثمة محاولات لتهجين أقحوان المطاط وإدخاله كمحصول صناعي لإنتاج المطاط الفاخر، فتلك الشجيرات السامة المؤذية له مطاط يعد خير حل لمن يشكون من حرط الحساسية من لبس المنتجات البلاستيكية كالفخازات والبالونات الجراحية والذين يشكلون ١٠% من البشر في الأيام الحاضرة، ولذلك فأهميته تتزايد مع تنامي الاعتناء بمعالجة الحساسية.

النباتات اللاسعة هي أيضاً عنصر فعال في الحرب الكيميائية، فهي تفرز سموماً تضر بمناهضيهها، ومن أمثلتها جنس القراص *Urtica*، ومن أنواعه القراص الكبير أو اللاسع *U. Dioica*





التكاثر الاجتماعي، دور من قصير المدى

لتحسين خواص التربة وزيادة خصوبتها، وهناك علاقة تكافلية بين البكتيريا العقدية *Rhizobium* التي تعيش في التربة والنباتات البقولية، فالأولى تحصل على غذائها من عصارة جذور النباتات البقولية، بينما توفر البكتيريا النتروجين للبقوليات عن طريق تثبيته هوائياً فيكون جاهزاً للامتصاص من قبل الجذور.

وفي غابات جاوة الاستوائية وجد العالم النباتي ونت، أن لكل نوع من الأشجار أنواعاً خاصة من النباتات المتسلقة التي تستنبت بذورها وتنمو عالياً فوق جذع العائل. ولاحظ أن النيات المتسلقة لا ينمو إلا على ساق نوع نباتي بعينه، ويفسر ذلك لتأثير مركبات خاصة تنتجها الشجرة العائلة وتؤثر تأثيراً خاصاً في استنابت

بجوارها، ربما تفرز من فوط الحماس كميات من السموم أكثر من المطلوب لقتل خصومها، فتعود عليها بالوبال فتهلك هي نفسها.

علاقات التعاون

من المستحسن أن نهدي غلواء الانفعال الحربي مستدركين أنه ليس كل العلاقات الكيماوية بين النباتات ذات طابع عدائي أو هجومي، فالتكافل الاجتماعي أيضاً يؤدي دوراً بارزاً في المجتمع النباتي. فعلى سبيل المثال جميع نباتات العائلة البقولية تثبت مواد نتروجينية في التربة التي تعد أهم العناصر الغذائية للنبات ويمكن أن تمتصها وتستفيد منها النباتات الأخرى المجاورة، ولهذا السبب تستزرع بعض أنواع البقوليات

هي التي تحمل البذور إلى هذه الأغصان العالية. وحين تثبت البذرة يخرج منها نوعان من الجذور، أحدهما يلتف حول جذع الشجرة العائلة وأفرعها، ويتعرض للشمس من أجل عملية البناء الضوئي واستمرار الحياة، ويمتص الرطوبة والغذاء من المخلفات والمواد العضوية الموجودة في شقوق قلف العائل، أما الجذر الآخر فيتوجه نحو القاع ممتدًا على ساق العائل أو متدليًا في الهواء. وحين تصل الجذور إلى التربة تخترقها وتتمدد جذورها، فيزداد نموها بسرعة ويظهر كثير من الأوراق والأفرع ثم تتصلب جذورها المتلفة حول الشجرة الأصلية وتكون تفريعات جديدة من الأنسجة الصلبة التي تقبض على العائل بشدة تدريجية حتى تخنقه. حينئذ تغدو الشجرة الخائفة وارقة الأغصان قائمة بذاتها مستقلة على الرغم من الدلائل الظاهرية التي تشير إلى ماضيها في القتل والاعتماد على الآخرين، فجذعها الذي هو حزم من الجذور المتألفة بشكل أسطواني منتظم يشاهد في جوفه فجوة تشتمل على بقايا ضحيته المتحللة.

إنه مشهد سريالي عنيف أن ترى كرمه أخطبوطية مطبقة بشراسة على شجرة عملاقة، وكأنها مارد خرافي أطبق على فريسة يائسة، كهذا يتحدث دوشانزكي الذي يروي أنه قرب مدينة بلم عند مصب نهر الأمازون تشاهد إحدى أشجار التين الضخمة وقد التفت حول مدخنة طويلة لأحد مصانع الطوب التي هجرت منذ سبعين عامًا فاخفت جميع معالمها. وأشجار التين هذه ليست إلا أحد الأنواع الكثيرة من الأشجار الخائفة، في غابات المناطق المطيرة في الهند وأستراليا والبرازيل ونيوزيلندا وغيرها. وفي نيوزيلندا هناك أشجار خائفة مثل شجرة راتا Rata، واينمانيا Weinmannia، شيفليرا Schefflera، مليكيتاس Melicittas، جريزيلينيا Griselinia.

بذور الأنواع التي تتسلق عليها، أي على تقويض ما تفعله السموم.

علاقات الحرب الفيزيائية

بين أشجار الغابات الاستوائية ثقل الإضاءة كلما توجهنا للأسفل حتى لا يكاد المرء يرى دربه في عمق الغابة. هناك على القاع، يمور صراع على بصيل الضوء، وقد تنعدم فرص النجاة للبادرات الجديدة ما لم تنمو سريعًا وترتفع لاقتناص إشعاعات النور الخافتة لتمثيلها في عملية البناء والنمو، حتى تخترق الشبكة التي تحجبها عن الضوء المطلوب لتصنيع الغذاء، ولأن نمو خشب الجذع يحتاج إلى زمن يفوق قدرة بعض النباتات الصغيرة على النمو في الظل، فإن بعض البادات تتسلق على جذوع الأشجار الأخرى وأغصانها. وفي هذه الحالات تنتج بعض النباتات محاليق لها حساسية عالية للمس، فحين تتماس مع غصن، فإن خلاياها على الجانب الآخر المعاكس تستطيل فجأة وبسرعة كبيرة، بينما تقبض الخلايا الملامسة للغصن مما يمكن المحلاق من الالتفاف حول الغصن.

لإدراك قسوة الصراع بين النباتات، يرصد لنا العالم النباتي دوشانزكي Dobshanzky مشاهداته في الغابات الاستوائية. هناك في عمق الغابة، تثبت بذرة من خدرها وتمتد كبادرة بريئة تنمو بوهن ثم تتسلق حثيثًا مثل كرمه وادعة على جذع إحدى الأشجار المهيبة، وعندما تتسلق الكرمه جذع عائلاها تكسوه تدريجيًا بكتلة كثيفة من الجذور ثم تبدأ في خنقه حتى رمقه الأخير، حينها تتحول الكرمه السابقة إلى شجرة مستقلة بحجم يضاهي الأشجار الضخمة.

وينتشر في غابات الأمازون نوع من أشجار التين البرازيلي أو البنغالي أو التين الخانق. وتثبت بذورها عادة على موضع مرتفع على قمم الأشجار العالية. ومن المرجح أن الطيور وبعض الخفافيش التي تأكل الفاكهة

فريستها بالكامل بل تتيح لها البقاء جنباً إلى جنب معها وتستفيد منها كدعامه، وهذا ليس نبلاً من النبتة المتسلقة لأن لا قدرة لها على الاستقلال، فعندما يموت عائلها تموت معه. فهي، حسب دوبشانزكي، تمثل طوراً من مراحل تطور عادة الخنق في الأشجار. وهناك نباتات في مرحلة تطوريه أقل، فهي تبدأ حياتها، وقد تستمر طويلاً دون التسلق على نباتات أخرى إذا كانت لا تجاوره. ومن هذه النباتات كوسابوا *Cousapoa* التي كثيراً ما تخنق غيرها من الأشجار، والبورما *Pourma* التي تخنق بنسبة أقل، ونبات السروبييا *Cecropia* التي نادراً ما تمارس الخنق.

سلب خيرات الآخرين

مشابه لما تفعله النباتات المتسلقة في خنق عائلها، هناك نباتات تتسلق على عائلها لا لتخنقه ولكن لتتغذى عليه. وعلى ذلك ليست الكائنات الدقيقة والفطريات فقط هي التي تتطفل بل النباتات الزهرية أيضاً. وهذه النباتات ليست ذاتية التغذية، أي لا تتمكن من تصنيع غذائها بنفسها فتعتمد على غيرها في ذلك سواء كانت تفترس حيواناً أو تتطفل على نبتة، ولكن المفترس - وهو ليس موضوعنا هنا - يعتمد جزئياً فقط على عملية الافتراس، أما النباتات المتطفلة فمنها الذي يعتمد كلياً على العائل ومنها الذي يجمع بين التطفل والتغذية الذاتية.

كنا المحنا في عرض حديثنا عن النباتات المتسلقة الخائقة إلى الحامول أو الكشوث كأشهر نبات متطفل. فعندما تثبت بذرة الحامول تعتمد في البداية على مخزون الغذاء من البذرة ولكن لا تثبت أن ينمو محلاقها على صورة خيط برتقالي مصفر ويلوب بحركة تشبه حركة أفعى دقيقة. وحين يلامس مبتغاه يلتف حوله ويتسلقه حتى يعثر على ساق أو جذع غصن فينشب بممصاته ويغرسها كالجرجير في الخاصرة ويمتص ما طاب له من الغذاء حتى تذبل فريسته مع مرور الوقت،

وشجرة التين البنغالي أو الأثاب لها قصص بدیعة حول العالم منها قصتها في هاواي، فقبل مئة وثلاثين عاماً جلبها وليم سميث حاكم بلدة لاهينا العاصمة القديمة لمملكة هاواي، وغرسها قرب قصر الحكم وفوقها يرخرف العلم الوطني. وتحت ظلال هذه الشجرة الوارفة جرت أهم احتفالات البلدة خاصة عندما حلّ العلم الأمريكي مكان الراية السابقة، وغدت ملاذاً للعمال المنهكين ولحشود الناس والتجمعات السياسية. وعبر السنين كانت الجذور الهوائية المتدلية تنمو ببطء حتى تغرس في التربة فتتضخم ثم تتدلى فروع هوائية من الأغصان فتغدو جذوعاً لدعم الشجرة، ومع تنامي عدد الجذوع الذي وصل إلى اثني عشر جذعاً رئيساً إضافة إلى الساق الأساسية الضخمة، امتد محيط الشجرة إلى زهاء ربع ميل مغطية مساحة مقدارها ثلثا فدان أي نحو ثلاثة آلاف متر مربع. بشامتها الفارعة التي تربو على ستين قدماً، وصارت هذه الشجرة الأسطورية أهم رمز للمدينة. وتواجه تلك التحفة النادرة خطر التلوث خاصة عادم سيارات الزائرين. وقد صدرت برامج لحماية.

تلك الشجرة الخائقة المتوحشة ألفها البشر هناك كأم رؤوم، كما وصفها ستيفن مالكويف *Ste-phen Malkoff*: «في المساء يُسمع صرير أغصانها بطيئاً مع هبوب الريح، كأغنية تهويدة رقيقة وهي تحضن بأذرعها أطفالاً لعوبين وتهدهدهم كي يناموا. والشمس الخادرة تلقي بنقشها البرتقالي والأصفر عبر أصابع الأثاب المزركشة. وعندما تغيب الشمس على لاهينا القديمة تلتئم آلاف من طيور المينة في كورس مهيب وتنشد أغنية شجرة الأثاب العظيمة»

وعوداً إلى الأشجار الخائقة، يذكر أن ثمة أشجاراً أقل عنفاً لا تقوم بقتل عائلها، مثل شجرة كلوزيا *Clusia* في البرازيل، وهي تقوم بكل العمليات السالفة الذكر عدا أنها لا تقضي على




وخلال عملية التطفل يرسل محاليق أخرى في الاتجاهات كافة باحثًا عن ضحية أخرى.

ولا ينتج الحامول أوراقًا خضراء لتصنيع غذائه فهو يعتمد كلية على النباتات الأخرى، وإذا لم يعثر عليها يهلك. وحين يصل النبات طور البلوغ تتفتق زهور قرنفلية اللون صغيرة الحجم شمعية المظهر وبعد اكتمال نمو البذور تنضج وتسقط في التربة وتحتاج البذرة لكي تثبت إلى مثل ما تحتاج إليه النباتات الأخرى من رطوبة وظروف مناخية ملائمة.


وهناك نباتات تتطفل عبر إرسال ممصات في جوف الأرض مثل نبات الهالوك أو الجعفيل *Orobache*، حيث يرسل شعيرات جذرية تحت سطح التربة حتى تلامس جسمًا غصنًا كالجذور فتتشب فيه ممصاتها وتمتص عصاراته المغذية حتى تقتضي عليه ببطء ويسمى هذا النبات، أيضًا، أسد العدس لأنه يفضل نبات العدس في المقام الأول ويتسلط عليه كثيرًا، وهناك أسد العدس الأحمر الذي يحبز جذور نبات اللبلاب، والهاالوك ذو أزهار كبير بنفسجية، ويرى كثيرًا في الصحراء بلون أصفر عشبي.

وهنا تنتهي رحلتنا مع الصراع بين النباتات وهو ليس إلا وجهًا من أوجه العلاقات الاجتماعية الكثيرة التي تسود المجتمع النباتي وجزءًا من النظام البيئي العام. ومع ذلك يجدر بنا أن نستدرك ونقول إن علاقات العتف أو الحرب أو الهجوم، سمها ما شئت، في مجتمع النباتات الزهرية علاقات نادرة الوقوع وتمثل الشذوذ الذي يدعم قاعدة التنافس السلمي أو الصراع الإيجابي بين النباتات، وما فتئ النبات في تربته ملكًا جليلاً، يحتضن لهيب الشمس فيغدو المدى ظلًا ظليلاً، ويعتصر ماء الصخر بين أنية رمل يخيل، لتجنتي رطبًا يانعًا مع هياج المقييل. هي النباتات، مصنع التحول الأول من الضوء إلى الغذاء .. إنها البلاستيكية الخضراء !! العرق الأعرق، سيدة الحياة وفارستها الأولى،




الرحلات إلى المريخ بدءًا من عام ٢٠٠٧م روتينية. وعندما تصل المركبة الفضائية الأوروبية إلى سطح المريخ فسوف تبت بكاميرا ثلاثية الأبعاد من نوع (HRSC) صور كوكب الحرب مارس. وسوف يستمر التصوير مدة عام وعلى مدار السنة سوف يستمر البث اليومي بحجم ٣ جيجا بايت، أي ما يعادل حجم كتاب منتفخ في ٣٠٠ صفحة (١). وسيقوم العلماء بتحليل الصور لكشف سر تحول هذا الكوكب إلى ثلاجة صحراوية لا ماء فيها ولا

لم يكن المريخ والأرض باقترابهما بعضهما من بعض بالصورة الحالية منذ ستين ألف سنة. وفي شهر يونيو ٢٠٠٣م، بفارق أسابيع أطلق الأوروبيون مركبتهم الفضائية (قطار المريخ Mars Express) على ظهر صاروخ روسي من قاعدة باكينور في كازاخستان ليلحق بهم الأمريكيون فيطلقوا من قاعدة (كانافيرال Canaveral) مركبتهم (روفر Rover) الأولى ثم الثانية يحملها صاروخ من نوع (Delta II). ويتفاءل العلماء أن تصبح



طبّق غلاف المريخ ويصمد لشواظ الحر الهائل الناجم عن الاحتكاك بجو المريخ وهو ينقضى بسرعة عشرات الآلاف من الكيلومترات. وقبل الوصول إلى سطح المريخ بـ ١٣ كم يظهر باراشوت يخفف من سرعة النزول حتى إذا وصل إلى ارتفاع ٢٥٠ متراً ظهرت ثلاث بالونات كبيرة من الطبق لتصدم سطح المريخ بسرعة ٩٠ كم/ ساعة ويعد عدة قفزات تستقر لينفتح من بطنها محطة فضائية مزودة بأسلح تمتص الطاقة

حياة. أين ذهب الماء؟ وما بال العواصف الرملية تضرب سطحه الجليدي (٢٠١) والنشيء الثاني الذي ستقوم به المركبة هو إرسال مسبار يستقر على سطح المريخ لدراسته مباشرة. وقد منح اسم (بيجل اثنين Beagle 2) تيمناً برحلة شارلز دارون البحرية في سفينة بيجل إلى أمريكا الجنوبية التي أثمرت كتابه (أصل الأنواع) عام ١٨٥٩م (٢). وسوف يكون هبوط المسبار على مراحل: في الأولى يخرق



خريطة المريخ

الأرمادا من المركبات الفضائية عملية النزول على سطح القمر. ولا تفرد أمريكا بالعمل هذه المرة بل يشارك فيه الأوروبيون واليابانيون. وإذا سارت الأمور كما خطط لها فسوف تبتث المركبة الأوربية أولى صورها مع اليوم الثاني من أعياد الميلاد؛ لأن الرحلة حتى المريخ تستغرق ستة أشهر في المتوسط. أما الأمريكية فستبتث في يناير من عام ٢٠٠٤م. وفي الوقت نفسه الوقت ينتظر وصول المركبة اليابانية (نوزومي Nozomi) أي سفينة الأمل بعد أن شردت في المأل العلوي مدة خمس سنوات لعطل فني في صواريخ الدفع. ويرى العلماء أن المريخ كوكب يشبه الأرض

الضوئية من أشعة الشمس وذراع لسير التربة والحفر في العمق لاكتشاف أثر الحياة والماء (٤)٩. وبالنسبة إلى أمريكا فهناك مسباران يحومان حول المريخ منذ زمن هما (مراقب المريخ الكوني Mars Global Surveyor) و(الأوديسة Mars Odyssey) والأول أرسل حتى الآن أكثر من مئة ألف صورة ومنها تم اختيار مكان النزول. أما المركبة الأمريكية روفر فسوف يكون طولها نحو المتر من نوعية البانقايندر نفسها التي أنزلت عربية السوجرنير عام ١٩٩٧م. بست عجالات وثلاثمئة حجرة ضوئية وكاميرا ثلاثية الأبعاد ويمكن أن تتجول حتى مسافة ميل. ويضاهي إرسال هذه



أنها موجودة تحت سطح التشردة والجواب
سنأخذ حينما تهبط المركبة على سطحه وتبحث
في أعماقه حتى مسافة متر ونصف المتر تحت
السطح وهو ما ليس في قدرة السوجرنيزر
السابقة أو مركبة روفر الأمريكية الحالية.
وهدف هذا أن الحياة قد تكون مخبئة في العمق
بعيداً عن تأثيرات الأشعة الكونية التي قتلت
الحياة على ظهر المريخ وحولته إلى سطح عقيم.
ونحن نعرف أن الحياة اكتشفت في القطب
الجنوبي تحت المدرعة الجليدية. كما عثر عليها
في أعماق المحيطات حيث الفوهات الكبريتية
التي تفور بدرجة الغليان.

في وجوه كثيرة وبالعشور على الحياة فيه فإنه يعني كسب كرة أرضية جديدة. والإجابة عن السؤال الغامض الذي طرحه العلماء هل نحن وحدنا في الكون؟


وتتقل مجلة (در شبيجل Der Spiegel) الألمانية في عددها ٢٢/٢٠١٣م، عن الفيزيائي الأسترالي (باول ديفيس Paul Davies) قوله: إذا تحقق هذا فسيكون الإنجاز الأعظم في كل تاريخ الجنس البشري حتى لو عثرنا على ميكروب واحد.

ومن وجهة نظر علماء الأحياء الكونية يعد المريخ كوكبا معقولا للمثور على الحياة فيه، وهل وجدت حياة بدائية في فترة مبكرة من حياته أو

وبالنسبة إلى الأوربيين فهي المرة الأولى التي يتفردون بالعمل فيها واشترك في العمل الكثير من دول القارة؛ فالحجر الضوئية أنتجت في بريطانيا والسويد وألمانيا. ومن إسبانيا جاءت انتينا الاتصالات. ومن سويسرا جسم الإقلاع. وفي إيطاليا ركبت القمط إلى بعضها. وفي فرنسا تمت برمجة الكمبيوتر. أما رئيس المشروع (رودي شميدت Rudi Schmidt) فهو نمساوي. وأما صاروخ الدفع فهو روسي من نوع سيوس فريجات (Sojus Fregat). وفي كازاخستان ومن محطة (بايكونور Baikonur) سوف تطلق المركبة. واليوم يطور الأوربيون بواسطة مركبة غاليلو ملاحه فضائية متطورة بكلفة ثلاثة مليارات يورو بحيث تمكن كل راكب ومتحرك في القارة الأوربية من تحديد موقعه بالسنتمتر. وقد حاول الأمريكيون عرقلة هذا المشروع عبثاً خوفاً على مشروعاتهم (GPS) الذي لا يمتاز بالدقة نفسها ويستطيع العسكريون التحكم في فتحه وإغلاقه. ويقول (لوتس ريشتر Lutz Richter) من مركز الملاحه الكونية في ألمانيا الذي طور ذراع المركبة الأوربية (مارس اكسبرس) مع مهندسين روس إنه يمكن الحفر وتحليل العينات مباشرة وبث الخبر إلى الأرض فوراً. والمهم الوصول إلى سطح الكوكب الغاصب المحتقن بالحمرة، وكل إرسالية تحمل نسبة ٥٠٪ من الفضل. وبالنسبة إلى مسلسل إرسال المركبات إلى المريخ حتى الآن فكانت إحدى عشرة مركبة: كانت الأولى روسية تحمل اسم مارس واحد وأرسلت عام ١٩٦٢م ولكن الكبسولة تعطلت مع الانطلاق. وفي عام ١٩٦٥م، أرسلت أمريكا مارينر (٤) حيث وصلت المريخ وأرسلت (٢١) صورة. وفي عام ١٩٧١م، أرسل الاتحاد السوفييتي مارس (٢) ومارس (٣) فتعطلت الأولى ووصلت

وبالنسبة إلى الأوربيين فهي المرة الأولى التي يتفردون بالعمل فيها واشترك في العمل الكثير من دول القارة؛ فالحجر الضوئية أنتجت في بريطانيا والسويد وألمانيا. ومن إسبانيا جاءت انتينا الاتصالات. ومن سويسرا جسم الإقلاع. وفي إيطاليا ركبت القمط إلى بعضها. وفي فرنسا تمت برمجة الكمبيوتر. أما رئيس المشروع (رودي شميدت Rudi Schmidt) فهو نمساوي. وأما صاروخ الدفع فهو روسي من نوع سيوس فريجات (Sojus Fregat). وفي كازاخستان ومن محطة (بايكونور Baikonur) سوف تطلق المركبة. واليوم يطور الأوربيون بواسطة مركبة غاليلو ملاحه فضائية متطورة بكلفة ثلاثة مليارات يورو بحيث تمكن كل راكب ومتحرك في القارة الأوربية من تحديد موقعه بالسنتمتر. وقد حاول الأمريكيون عرقلة هذا المشروع عبثاً خوفاً على مشروعاتهم (GPS) الذي لا يمتاز بالدقة نفسها ويستطيع

صورة تلتقطها المركبات الفضائية من المريخ





صورة المريخ من رحلة الفينيكس


خلف بعض بسبب خطأ مضحك حيث خلطت بين المتر والقدم والكيلو والباوند وهما Mars Climate Orbiter) و(Mars Polar Lander). وفي عام ٢٠٠١م وصلت الأوديسة وبدأت بالمسح المنتظم لسطح الكوكب وما زالت. وفي صيف عام ٢٠٠٢م انطلقت أربع مركبات أوربية وأمريكيان ويابانية. تزن المركبة الفضائية (بيجل ٢) ٦٥ كغ وستكون منطقة النزول قريبة من خط الاستواء مع قدوم الربيع على المريخ وسوف تهدأ العواصف تسيباً وبعد الظهر ستكون الحرارة عشر تحت الصفر ومنطقة الرسو اسمها المنطقة الهادئة (Isidis Planitia). وبالنسبة إلى الأمريكين فتم انتقاء المكان من ٥٥ موضعاً. في منطقة (Gusev Krater) وربما كانت سابقاً مكان بحيرة عظيمة.

الثانية وأرسلت بعض الصور. وفي عام ١٩٧٢م، أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية مارينر (٩) فأرسلت الكثير من الصور التي كشفت عن براكين هائلة ومنحدرات شاهقة. وفي عام ١٩٧٦م، أرسلت أمريكا من جديد فايكنج (٢) رست على السطح وأرسلت صوراً ويبحث عن الحياة في التربة من دون الوصول إلى دليل. ثم خفت الحماسة للمريخ فترة عشرين سنة حتى أرسلت أمريكا عام ١٩٩٧م البانفايندر وعربة السوجرنير التي رست بأمان على سطح الكوكب الأحمر وأرسلت الصورة الأشهر. وفي العام نفسه أرسلت أمريكا مراقب المريخ الكوني وأرسل مائة ألف صورة ديجيتال. وفي عام ١٩٩٩م، خسرت ناسا مسبارين



المسبار من المركبة الأوربي

فقرب المريخ والأرض هذا العام سيكون أدعى لتوفير الطاقة واختصار زمن الرحلة وسوف يرى أهل الأرض التمتع المريخ هذا العام أشد من الشعري اليمانية Sirius. وسوف تصدق جماعات اليوفو (U F O) أن طبقاً كونياً في طريقه إلى الأرض؟ ومنذ القديم حامت الأساطير حول المريخ؛ فعند البابليين كانوا يسمونه الإله (نرغال) مصدر الشؤم والخراب، وعند الرومان كان إله الحرب مارس. أما الفيلسوف (إيمانويل كانت) الألماني فاعتقد على العكس أن فيه كائنات كاملة وأن القوى العقلية تزداد سموً مع الابتعاد عن الشمس (٥). وزعم الإيطالي جيوفاني شيايار يللي (Giovanni Schiaparelli) عام ١٨٧٨م، أن المريخ فيه حضارة متقدمة بدليل أكتية للري تنقل المياه من القطب إلى الوسط. وتبين أنها كانت خدعة بصرية، ومنهم من رأى على سطحه ما يشبه أبو الهول وكان ذلك ضرباً من ظلال الألوان. وتحمس المؤرخ البريطاني (H. G. Wells ويلز)





قطار المريخ وكاسيرا ثلاثة الأشعة

ونحن نعرف اليوم أن الحياة عنيدة ويمكن أن تنمو في عمق المحيطات حيث لا أكسجين ولا نور وتغلي الأرض بالكبريت من فوهات بركانية. كما عرف عن صمود بذور البكتيريا في جو الفضاء الخارجي مدة تطول وتقصّر بعد أن كان المعتقد أنها تهلك تحت تأثير الأشعة الكونية. بالإضافة إلى اختباء الحياة تحت المدرعة الجليدية في القطب الجنوبي. هذا ما قالته جيردا هورنيك من معهد الفضاء الألماني (DLR).

وكان السؤال هل حفرت الفايكنج في المكان الخطأ؟ وهل كانت المسابر غير كافية للعمق؟ والجواب سيكون مع بعثة قطار المريخ حالياً التي ستعتمد على الحفر واكتشاف الحياة في العمق تحت السطح المعقم بالأشعة الكونية. ومن العمق سنعرف عن وجود الماء من عدمه.

ونحن نعرف اليوم عن المريخ ما يأتي: فالسنة فيه ٩٨، ٦٨٦ نسبة للأرض ٢٤، ٣٦٥ يوماً فيكمل المريخ دورته حول الشمس قريباً من ضعف المدة التي تفعلها الأرض.

وأما اليوم على المريخ فهو أطول بقليل مما عندنا ويبلغ ٢٤ ساعة و ٤٠ دقيقة. أما قطر المريخ فهو نحو نصف قطر الأرض حيث يبلغان على

(٦) في كتابه (حرب العوالم) إلى أن هجوماً من كائنات مريخية تم على الأرض ولم ينقذهم سوى موت هذه الكائنات ببكتيريا أرضية لا يملكون مقاومة لها. وفي عام ١٩٣٨م، قام المذيع (أورسون ويليس Orson Welles) من محطة نيويورك بقراءة القصة على الناس فصدقها البعض وفروا على وجههم إلى الجبال حتى تبين أنها كانت مزحة ثقيلة. يعدّ جو المريخ رقيقاً للغاية وكان المعتقد أن الميكروبات يمكن أن تعيش فيه ولكن مسبار فايكنج الأمريكي قبل ثلاثين سنة لم يعثر على أي أثر من حياة. وما زال المتشككون يرون أن نتائج الفايكنج ليست حاسمة حول الموضوع. والذي قوى هذا الاعتقاد قصة حجر المريخ الذي عثر عليه في القطب الجنوبي والذي انتقل من سطح المريخ قبل أكثر من مليون عام وقام بالسباحة في الملكوت قبل أن يرسو قبل ١٢ ألف سنة في الانسراكسيس ولم يكن هناك وجود لأي حضارة على وجه الأرض وتبين أنه يحمل بصمات من بقايا حياة بدائية عليه. ويومها أعلن الرئيس الأمريكي كلينتون عام ١٩٩٧م، هذا الحدث التاريخي بعد دراسة مخبرية منفصلة من مخابر شتى لمدة خمس سنوات.

ومن المهم في البعثة الجديدة أنها قد تهب عقيدة
تفرد الحياة على الأرض وجهاز المخبر سوف
يرسل النتيجة فتصل الأرض في عشرين دقيقة
وهناك جهاز (مقياس الطيف الجماعي لرسم
ألوان الغازات) وتمتاز الكائنات الحية على وجه
الأرض سواء كانت فيلًا أو فطريات أو حلزونًا
تتجمع الكربون ١٢ وإذا اكتشف هذا مخبر ييجل
٢ فسيكون دليلًا على الحياة.

ويتناقش العلماء اليوم بحماس عن
السيناريو الذي حدث على ظهر المريخ قبل ثلاثة

التوالي ١٢٦٥٧ كم و٦٧٩٤ كم. أما الضغط فهو أخف بما لا يقارن على الأرض فهو على الأرض ١٠١٤ ميلي بار وعلى سطح المريخ ٦ ميلي بار. أما محتويات الجو فالمريخ يعيق بغاز ثاني أكسيد الكربون. ٩٥٪ والأزوت ٣٪ وبقية من أرغون وسود ٢٪ في حين تتكون غازات الأرض من ٧٨٪ أزوت وأمل ٢١٪ أكسجين و١٪ غاز ثاني أكسيد الفحم وسود أما درجة الحرارة في المتوسط فهي على ظهر الأرض ١٥+ أما المريخ فنناقش - ٦٣. أي أن الكوكب غارق في براد جلدي سيبيري.

Figure 1





الروحانية الطائفة استيريكس كرية الفضاء الأمريكية

المراجع

١. مجلة دار شيجيل الألمانية العدد ٢٣ عام ٢٠٠٣م، ص ١٦٢.
٢. يراجع كتاب الكون كإرل ساغان، ص ٩٧، فصل لأغان حادثة الكوكب الأحمر، ص ١٦٦ عن خبر وصول مركبة الفضاء بيناريج ٢٠ يوليو تموز عام ١٩٧٦م.
٣. صدر كتاب أصل الأنواع، عام ١٨٥٩م، ثم صدر الكتاب الثاني عام ١٨٧٧م، عن أصل الإنسان وما زال الجدل قائماً من أصل الهومو سابينز الإنسان العاقل وكم أصبح له على وجه الأرض وآخر الأبحاث التي صدرت هي التي قام بها العالم الفرنسي برونيت والفريق التشادي وأعلن عن عمر يقرب من سبعة ملايين عن السنين وهي ليست بشيء، بعمر الأرض البالغ ٤.٦ مليارات سنة.
٤. تأسست النزول على سطح المريخ بالآلية نفسها التي نزلت فيها البافاندر عام ١٩٩٧م وهو العام نفسه الذي أعلن ولادة دولتي النعجة بالاستساع.
٥. من الغريب أن يفكر كانت على هذه الطريقة وهو يدل على أن التغيرات غير الكشوف العلمية وأن الفلسفة تهيء العلم التجريبي.
٦. هـ. ج. ويلز مؤرخ بريطاني مشهور ومن أجمل ما كتب في التاريخ بأربعة مجلدات معالم تاريخ الإنسانية كما كتب في القرن وما ذكرنا عن حروب العوالم وكذلك معالم جديده حربي وتبا عليه بالاستساع.

مليارات سنة فيبدو أن المسح الذي جاءت به المركبة الفضائية الأمريكية يفيد بوجود مياه غاصت إلى العمق وهي محفوظة مثل مياه البرادات المجمدة، ولكن هذا القول سيظهر صحته من خطئه بتحليل البيجل اثنين، وتفكر ناسا أن تصل المريخ بطائرة خاصة عام ٢٠٠٩م، كما أن الوكالة الأوروبية (ESA) تفكر في جلب عينات من المريخ إلى الأرض بعد فحصها في المحطة الفضائية الدولية بعد أن تكون قطعت مسافة ١٣٩ مليون كيلو متر.

هم يبحثون عن وجود حياة بدائية على شكل ديدان تسعى على ظهر المريخ تمهيداً لاستعماره في المستقبل ونحن نملأ المعتقلات بمخالفني الرأي والمجتمع بالمخبرين السريين ونعيش فترة ما قبل الثورة الفرنسية. وفي اللحظة التي ينتقلون إلى المريخ قد نكون دخلنا العصر.

إن مأساتنا أننا لا نفهم ما يحدث ولا نشارك فيه لأن كل العلم المعاصر والحداثة لم نشارك في صنعها فهي تمثل لنا سحر الجن الأزرق، وكل يوم هو في شأن.



مناطق زلزلة عنيفة مدمرة وبؤر بركانية فاعلة، كما في طوق النار (٢١) الذي يحيط بشرق المحيط الهادي وغريه. كما اكتشف العلماء السلاسل الجبلية المحيطية المتوسطة العملاقة (أكثر من ٨٠ ألف كم) التي تمد شيعان المحيطات بسيل دائم من المهل (Magamas) وبكميات من المياه تقدر بميلليمتر واحد سنوياً (٢٢)، ويعمل المهل المتدفق على تحريك الصفائح القشرية المحيطية والأرضية عامة، فيتسبب بذلك في ظهور

في ظل التقدم التقني الكبير الذي شهدته القرن العشرون، تمكن علماء المياه من الكشف عن الكثير من المظاهر الطبيعية في أعماق المحيطات وقيعانها، فلقد تعرفوا جيداً على مكونات القشرة الأرضية المحيطية البازلتية الخصائص، وكشفوا أسرار حداتها وتجدها المستمر، وتأكدوا من حركتها الدائبة نحو القارات لتغوص تدريجياً تحتها مكونة بذلك ما يعرف بنطاق الابتلاع القشري الأرضي (Subduction) (٢٣)، ومحدثة



ارتفاعها . ولكن الأمر بالنسبة إلى الماء ليس كما ذكرنا تمامًا، وذلك لأن للماء خصوصية فيزيائية متميزة نابعة من خصوصية بنيته الجزيئية [الشكل رقم (١)]: إذ إنه من المعروف أن جزيء الماء (H_2O) مكون من الهيدروجين (١٩ . ١١٪) ومن الأكسجين (٨١ . ٨٨٪)، وترسم ذراته مثلثًا متساوي الأضلاع تقريبًا تتمركز ذرة (o) السالبة في قمته، بينما تتمركز ذرتا الهيدروجين (H^+) في القاعدة (الشكل السابق) . وتفصلها عن ذرة

الأنشطة البركانية والزلزالية ويغير . ويبطء . مظهر التوزع القاري المحيطي وواقعه .

من المكتشفات المهمة كذلك معرفة التطبيق المائي الكتلي المحيطي (١) ومدلولاته الطبيعية المهمة، إن التعرف الصحيح على هذه الظاهرة إنما ينطلق من دراسة واقع كثافة الماء، والكثافة كما نعلم تمثل درجة تمركز المادة (m) في وحدة الحجم (v)، ومن المعروف فيزيائيًا تزايد كثافة المواد مع انخفاض الحرارة وتناقصها مع




الكتلة المائية تدور عن خصوبة المكان حرارة وملوحة

الداخلي للماء، ولأضحي الجزيء مستقرًا شاردياً. ولكن، وبسبب وجود الزاوية المشار إليها أنفاً، نرى فائضاً في قوة الجذب الجزيئي للماء، وهو ما يعرف بالقوة المتبقية (١)، وهي في الواقع قوة ارتباط شاردية فعالة سمحت بوجود قطبين متعاكسي الشحنة (+، -)، وهما متعادلان مقداراً، وبسبب ذلك ظهور عزم (شعاع قوة) يتجه من الشحنة السالبة إلى الموجبة. هذا الواقع، وبالإضافة إلى الشكل الرباعي لشبكة الماء البلورية، قد أدى إلى ظهور مجمع جزيئي (٢) مائي مكون من جزيء تحيط به أربعة جزيئات


الأكسجين زاوية مقدارها ١٠٤, ٢٧° وهنا يكمن سر تميز الماء فيزيائياً. إن لدى ذرة الأكسجين (٥) إلكترونيات سالبة، ويوجد الإلكترونان موجبان لكل ذرة هيدروجين، ولهذا السبب تأخذ شبكة الماء البلورية شكلاً رباعياً، وتمتلك أربعة أقطاب من الشحنات: شحنتين سالبتين، وشحنتين موجبتين. يجب أن أشير إلى أنه لو كانت ذرة الأكسجين الواقعة بين ذرتي الهيدروجين على امتداد أفقي واحد [H-O-H] مع ذرتي الهيدروجين لتعادلت قوى الجذب الجزيئي

[تريهيدروكس (H₂O)₃] لقد ساعد الشكل البلوري الرباعي لجزيء الماء ووجود الأقطاب السالبة والموجبة المتعددة، إضافة إلى قوة الارتباط الهيدروجينية السالبة الشحنة على الحفاظ على الماء السائل، وعلى وجوده سائلاً وصلباً وغازاً وبخاراً (٨) في آن واحد.

إن لبنية جزيء الماء المتميز بشبكته البلورية، وبثائثته القطبية انعكاساً شذوذاً مهماً جداً آخر بالنسبة إلى الأرض بكل جغرافيتها وواقعها



الشكل رقم (١١) : خصوصية بنية الجزيء المائي



الشكل رقم (١٢) : التسلسل النطاقي لقيم الحرارة (٢١) واللوجة (٨) والكثافة (١٧) لسطح الجليد

الطبيعي الخاص بها، إلا أنه الشذوذ الكثافي، فالكثافة المائية لا تتبدل تماماً حسب ارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة، بل نجد أنفسنا وكأننا أمام محطة كثافة مائية، تزداد نحوها الكثافة وتتناقص كلما ابتعدنا عنها، ولا فرق في ذلك إن زادت الحرارة أو انخفضت، إلا أنه من الضروري التمييز ما بين الماء العذب والماء البحري المالح، فبالنسبة إلى المياه العذبة (المقطرة) وهي ظل الضغط الجوي المعياري أي (١٠١٣) ميلibar على

أخرى، وما ذكر آنفاً قد مكن الماء كذلك من جذب الشوارد الأخرى غير المائية، وتفكيك مركباتها وجزيئاتها، وهذا ما يفسر غنى الماء بالعناصر الغذائية المعدنية والعضوية، ويجعل الماء سبباً أساسياً في ظهور الحياة واستمرارها «وجعلنا من الماء كل شيء حي» [الأنبياء: ٣٠]. ومما يعزز ما ذكرته حركة الماء السهلة المعيارية . لزوجته المعيارية . ومقدرته الكبيرة على نقل المادة واحتواء (امتصاص) الطاقة وحملها إلى أماكن أخرى، وتيار الخليج في المحيط الأطلسي خير مثال، إذ يحمل هذا التيار من النطاق الاستوائي . المداري كميات هائلة من المياه الحارة إلى شمال الأطلسي وغرب أوروبا وشمالها، فلا تتجمد مياه (٨) شواطئها شتاء كما في شرق القارات، إن التجمع الجزيئي الأنف الذكر قد يكون أحادياً (H₂O)، ويسمى بالهيدروكس، وهو ما نراه في بخار الماء، ولكن في الماء السائل يضاف إلى ما سبق تجمع جزيئي ثنائي (H₂O)₂ أي ديهيدروكس، وفي الجليد (الماء الصلب) تسيطر المجمعات الثلاثية

السم ٢، نجد أن الكثافة الأكبر للماء تتحقق في درجة الحرارة (4°C) مثوية، لذا فإن الكثافة ستتناقص كلما ابتعدنا سلباً أو إيجاباً عن الدرجة المذكورة والعكس صحيح.

يفسر ما ذكرته التطبيق الحراري الفصلي في البحيرات وفي كل تجمع مائي قليل الحركة تطبيقاً يبدو لا منطقيّاً في بعض الفصول، فبالنسبة إلى مياه البحيرات في الأقاليم المتوسطة الباردة (خط عرض 40° - 60°) حيث الفصول واضحة جداً، نجد أن التطبيق الحراري الصيفي مباشر، أي أن درجات الحرارة تتناقص من الأعلى نحو الأسفل مقتربة بذلك أكثر من درجة الحرارة (4°C) ، أما في الشتاء فالتطبيق معكوس، أي أن الحرارة تزداد من الأعلى نحو الأسفل باتجاه قاع البحيرات أو السدود، وفي الحالتين يسود الهدوء الحركي في طبقات الماء المختلفة؛ لأنها تتموضع حسب تزايد قيم الكثافة من الأعلى نحو الأسفل، وفي فصلي الخريف والربيع يحدث مزج مائي في كل طبقات الماء، وقد يؤدي إلى تجانس حراري وكثافي، إن لم تكن البحيرات عميقة جداً.

يبدو أمر تحديد درجة حرارة الكثافة العظمى للماء بالنسبة إلى المياه البحرية والمحيطية أكثر تعقيداً، إذ إن الحرارة ليست هي العامل الطبيعي الوحيد المحدد لقيم الكثافة؛ بل يضاف إليها تبدل قيم الملوحة إضافة إلى تزايد قوة الضغط المائي مع تزايد الأعماق، وبسبب ذلك لا تصادف درجة حرارية وحيدة تمثل محطة الكثافة المائية العظمى (١٠) كما في الماء العذب، وبالمطبع فإن دور درجة التملح هنا واضح جداً، وذلك لأن تبدل قيم الكثافة مع تزايد ضغط الكتل المائية بسيط بسبب طبيعة الماء الفيزيائية.

ويمكن القول: إن درجة حرارة الكثافة العظمى في المياه البحرية تزداد انخفاضاً كلما ارتفعت نسبة الملوحة (٥) والجدول (١١) الآتي يمثل ذلك:





الكتشف العلماء السلاسل الخيلية الخيلة التي قد قيعان الخيطات سبيل دالم من المهيل

إلى الماء العذب المقطر المعتمد أساساً لحساب قيم كثافة الماء البحري ووزنه النوعي، والقيمتان متساويتان، ومتعادلتان رقم (١)، ولكن المدلولات مختلفة، فالكثافة تعبر عن تتركز المادة في وحدة الحجم (سم^٣)، بينما الوزن النوعي يمثل وزن وحدة الحجم وهنا (سم^٣) (١٥) من الماء البحري.

بسبب ما ذكر سابقاً يستعمل علماء البحار والمياه مفهوم الكثافة بدلاً من الوزن النوعي.


وهكذا؛ لكي نعرف على كثافة الماء البحري في مكان ما محدد (Insitu) والمتميز بقيم ملوحة (s) معينة وبحرارة ما (t) لا بد من مقارنة هذه الكثافة مع كثافة الماء المقطر في درجة حرارته (+t) وفي ظل الضغط الجوي المعياري، ويرمز لما ذكرته (s) وهنا كثافة الماء المقطر معروفة، ولكن

أكثر كثافة من المياه الاستوائية ذات الأقاليم العالية الرطوبة، وسنرى فيما يأتي انعكاس هذه الحقيقة على تطبيق المياه المحيطية وعلى حركيتها السطحية والعميقة (١٢) [الشكل رقم (٢)].


د. إن حرارة الكثافة العظمى أعلى من حرارة التجمد المائي عندما (١٢) تقل نسبة التملح عن (٢٥٪) ولكنها أدنى من حرارة التجمد عندما تزيد درجة التملح على النسبة الألفية السابقة، وهذا يعني أن مياه الفئة الأولى ستبلغ قيمها العظمى قبل أن يتجمد الماء البحري، بينما نجد في الفئة الثانية أن الماء لن يبلغ درجة الكثافة العظمى لأنه سيتجمد قبل بلوغها.

والآن لتحديد كثافة المياه البحرية والمحيطية المتبدلة الخصائص ملوحة وحرارة لابد من اللجوء

بسبب التباين الكبير في قيم الحرارة والملوحة، ومن ثم الكثافة تظهر في المحيطات تيارات مائية كثافية تعرف بالمتدرجة أو الفراديانية (Gradient Currents)، وتتحرك هذه التيارات على سطح المحيطات وفي أعماقها موزدة إلى نقل ومزج (١٥) كميات هائلة من المياه بواسطة ما يسمى بالتيارات الحملانية



الشكل رقم (٤) (أ) حركة مياه البحر الأحمر داخل خليج عدن وشذلات قيم الحرارة (١) والملوحة (٢) العظمى والصغرى.
٤-ب - كمية انتشار مياه البحر الأحمر ضمن مياه خليج عدن ومساراتها



الشكل رقم (٥) التبادل المائي الأطلسي - المتوسطي
تبر مخفي جبل طارق (أ) تشير إلى المياه المتوسطية
المنشأ الخارجة إلى الأطلسي

من المياه الأطلسية إلى البحر المتوسط سنوياً، وهي ذات ملوحة وحرارة وكثافة أقل من المتوسطية، لذا تكون كتلة المياه السطحية، وفي الوقت نفسه تخرج من المتوسط قرابة ٢٨,٥ ألف كم^٣ من المياه الأكثر ملوحة وحرارة وكثافة [الشكل رقم (٤)] إلى الأطلسي لتنتشر بسعة في شمال الأطلسي، ويعتقد أن هذه المياه التي تشكل إسفيناً يمتد حتى مشارف المحيط المتجمد الشمالي تكون (٤٪) من مياه الأطلسي، بل يرى بعض العلماء أنها مصدر أساسي من مصادر تملح المحيط العالمي.

مثل هذه الصورة نراها بالنسبة إلى البحر الأحمر. إذ يتلقى مياهاً سطحية من خليج عدن بما يعادل ٢٠ ألف كم^٣ سنوياً، ويدفع بمثل هذا الكم مياهاً تحت سطحية أكثر حرارة وملوحة وكثافة إلى خليج عدن والمحيط الهندي، وتبلغ هذه المياه سواحل أفريقيا الشرقية ومناطق خط الاستواء [الشكل رقم (٥)] وفي البحرين السابقين وسبب التباين الكثافي، نجد ثلاث طبقات مائية: (أ) علوية

الكتل المائية الإقليمية الانتشار.

إن الحد أو البرزخ الذي يفصل بين هذه الطبقات والكتل يتمثل بقيم الكثافة، فكل كتلة أو طبقة كثافة مميزة تعرقل امتزاجها بالمياه الأخرى التي تلامسها، ومن هنا انقسمت مياه المحيطات إلى طبقات وكتل (بحار) واسعة الانتشار، ونصادف جميع هذه الكتل في النطاق الاستوائي، وتتكون هنا من: (أ) طبقة مائية استوائية سطحية قليلة الكثافة ومرتفعة الحرارة، ثم تليها (ب) طبقة مدارية المنشأ أكثر ملوحة وكثافة، ثم (ج) طبقة مائية متوسطة - شبه قطبية، باردة عالية الكثافة، (د) مياه قاعية قطبية شديدة البرودة والكثافة؛ وجرت العادة على تسمية هذه الطبقات: والشكل بالسطحية والانتقالية والعميقة والقاعية، والشكل المبسط التالي يوضح ذلك ويمثل مقطعاً في المحيط الهادي. [الشكل رقم (٣)].

٣. التبادل المائي الكثافي بين البحار (المتوسط والأسود) وبين البحار والمحيطات (المتوسط والأطلسي، والأحمر والهندي) وتدل القياسات (١٦) على دخول ٤٠ ألف كم^٣

مستوى البحر لتعرف سماكة المياه العذبة القائمة، وذلك بأن نضرب مقدار الارتفاع المذكور بـ ٤، ١ مرة، ونضيف للناتج مقدار الارتفاع فوق البحر.

تكثر هذه المظاهر في الشواطئ الرملية ذات التغذية المائية التهطالية الجيدة، كما في شمال وغرب أوروبا وفي المناطق الرطبة في الأقاليم الأخرى من العالم.

٦. تكثر ضمن الصحاري الرملية أماكن وجود المياه العذبة المتجمعة فوق وضمن المياه المالحة التي قد تصل ملوحتها إلى (٣٠ - ٤٠ ج/ل) كما في البحار والمحيطات وتمثل مورداً حيويّاً للسكان ولسوائهم في هذه المناطق، بل وتستغل للري كذلك، فيما إذا ما كان الاحتياطي كبيراً. وقد يصل هذا الاحتياطي (٢٠) إلى مليارات الأمتار المكعبة (٢١) كما في صحراء قراقوم التركمانستانية وصحراء تاكلا ما كان الصينية، ومن المؤكد وجود مثل هذه المياه وبكميات كبيرة في صحراء الربع الخالي وبخاصة في أطرافها، حيث تجاور الجبال اليمنية والسعودية والعمانية.

نجد مثل هذا المياه في مناطق انتشار الصحاري الغضارية الطينية حيث الخبرات (Takyar)، إذ تتسلل مياه الأمطار عبر شقوق الغضار لتتوضع فوق المياه المالحة على شكل عدسة قد تكون كبيرة بشكل كاف للاستعمال المحلي، وكثيراً ما يشير نبات الأثل (Tamarix) على وجود المياه العذبة. قال تعالى: ﴿وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحماً طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون﴾ [فاطر: ١٢] (٢٢).

وهكذا يمكن القول: إن التباين في قيم الكثافة بين الكتل المائية المختلفة الأصول والملوحة هو الذي يمثل الفاصل والحاجز والبرزخ الذي

قليلة الكثافة أطلسية أو هندية المنشأ. (ب) متوسطة انتقالية عالية الكثافة بالمقارنة مع العلوية، وتمثل المياه الأصلية في البحرين المذكورين. (ج) قاعية دافئة، وهي الأكثر كثافة حبسية البحرين بسبب ارتفاع عتبات مضيق جبل طارق وباب المندب.

وهكذا نرى مياهها محيطية بسطح البحار ومياهها بحرية تتغلغل عميقاً في المحيطات، محافظة على شخصيتها الفيزيائية ومتميزة عما يحيط بها؛ قال تعالى ﴿مرج البحرين يلتقيان﴾ بينهما برزخ لا يبغيان﴾ فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾ [الرحمن: ٢١، ١٩] (١٧).

٤. نشاهد في مصبات الأنهار الغمرية الصابة في البحار والمحيطات كما في شمال البرا الآسيوي، غزواً متبادلاً من قبل مياه الأنهار التي تدفع عذبة بعيداً في عرض البحر واندساساً مائياً بحرياً مالحاً داخل مصبات الأنهار (١٨) [الشكل رقم (٦)]. ولكل ماء صفاته المميزة، ويفصل بينها برزخ وحدٌ بسيط كثافي، ولقد أشار رب العزة إلى هذه الظاهرة بقوله: ﴿وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخاً وحجراً محجوراً﴾ [الفرقان: ٥٣]. ويقصد حسب التفسير بجملة «حجراً محجوراً» حراماً محرماً.


إن آية أخرى هي: ﴿وجعل بين البحرين حاجزاً﴾ آله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون﴾ [النمل: ٦١].

٥. كثيراً ما نصادف قرب الشواطئ البحرية (١٩) الرملية الناعمة وفي جزرها تجمعات مائية عذبة كبيرة، يمكن استخدامها في أغراض الشرب والري وبخاصة إن كانت التغذية التهطالية جيدة. هذه المياه وبسبب قلة كثافتها تعوم فوق المياه البحرية وتضغط عليها وتعمق فيها، ويرتفع قسمها الأعلى فوق مستوى ماء البحر. [الشكل رقم (٧)]. وكيفي أن نعرف مقدار ارتفاع هذا القسم فوق


يعيق امتزاج هذه المياه طويلاً جداً، ويحفظها آلاف السنين بل وأكثر بكثير.

إن زوال هذه الحواجز الكثافية ليس بالأمر الصعب، إذ يكفي تبدل درجة حرارة المياه لتحقيق ذلك، فلو انخفضت حرارة المياه العذبة الموجودة ضمن المياه المالحة لازدادت كثافتها لاقتربها حرارة من حرارة الماء الأعظم الأنف الذكر، ومن ثمة نراها تأخذ بالامتزاج التدريجي السريع مع المياه المالحة فتصبح ملحاً أجاباً، وهذا ما يعبر عنه في سورة الواقعة تحذيراً: «أفأرأيتم الماء الذي تشربون» أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجاً فلولا تشكرون» [الواقعة: ٦٨ - ٧٠].

وفي بحيرات الأقاليم المتوسطة وسواها دليل سنوي على ما ذكرناه، إذ يتم في كل فصل ربيعي وخريفي مزج مياه البحيرات، بسبب التبدل الحراري للمياه السطحية الذي يؤدي إلى زيادة كثافتها وغوصها نحو الأسفل، لتحل مكانها المياه الأعمق الأقل كثافة، فيحدث التماثل والتجانس الحراري والكثافي في هذه البحيرات (١٢).



الشكل رقم ١٦: تفاعل المياه الباردة تحت مياه الدفء - التماثل في البحيرة



الشكل رقم ١٧: مياه عذبة في جزيرة (مليكة) ضمن المياه المالحة - يستقر الماء العذب فوق مستوى ماء البحر - تفسق المياه العذبة تحت مستوى ماء البحر

البحر



الهوامش والتعليقات والمراجع:

١. شويبا يف. آب. علم الأرض. موسكو، ١٩٧٦م، ص ١٢.
٢. تتميز المناطق الساحلية للأمريكتين والمطلّة على المحيط الهادي، وكذلك السواحل الآسيوية المقابلة لها ويسبب وجود مناطق الابتلاخ القشري الأرضي بأشعة زلزالية وبركانية كبيرة، ومن هنا برزت تسمية طوق النار بالنسبة إلى المحيط الهادي.
٣. الجغرافية الطبيعية للمحيطات، موسكو، ١٩٨٤م، ص ٢١٢.
٤. الفيزياء العامة، ج ٣، موسكو، ١٩٧٣م، ص ١١٩.
٥. إيسنوشين. ب.وف. علم المحيطات، موسكو، ١٩٧٧م، ص ١٤.
٦. يقصد بالكتل المائية المحيطية تلك الكتل التي تتشكل ضمن إقليم محيطي له خصوصيته المكانية والطبيعية التي تعكس بوضوح على شيريزاء هذه الكتل (ملوحة، حرارة، كثافة، غازات) وتبرز شخصية كل كتلة عما سواها ومن هذه الكتل: (الاستوائية والمدارية وشبه القطبية والقطبية)، كما توجد عدة كتل انتقالية ثانوية.
٧. دافيدوف وآخرون، الهيدرولوجيا العامة، موسكو ١٩٧٣م، ص ٢١٩.
٨. أشكال المياه في الطبيعة كثيرة، ويظهر هذا الأمر أن المياه ليست مركباً كيميائياً بسيطاً كما يعتقد، وذلك لأن الهيدروجين خمسة نظائر أبرزها (III) ويكون الماء الخفيف العادي وآخر ثقيل ($H_2=D$) ثم ثقيل جداً ($H_3=T$)، كما أن للأكسجين خمسة نظائر كذلك: ($O16, O17, O18$) إضافة إلى نظيرين حصل عليهما مخبرياً هما: ($O15, O19$). وبالواقع يكون الماء الخفيف (H_2O) قرابة (99.9%) من حجم الماء في الأرض وما تبقى يعرف بالماء الثقيل وبخاصة الديتريوم ($H_2O O16$) أو ($D 2O$).
٩. لوينطونا إلى (H_2O) كمركب كيميائي وليس جزيئاً مائياً له قوة ارتباط ذري وجزيئي كبيرة جداً، لتبخر هذا المركب في درجة الحرارة (100°). ومن ثم ستختفي من على الأرض المياه السائلة والمتجمدة، وسيبقى بخار الماء فقط، وهذا يعني أن الأرض سوف تتبدل إلى كوكب آخر ميت حيويّاً وله جغرافية أخرى ليست كالحالية.
١٠. بوركوف، ف. أ. حركة المياه المحيطية العامة، لينينغراد، ١٩٨٠م، ص ٢١٩.
١١. بالنسبة إلى الماء العذب في درجة الحرارة (4°) يبدأ تهدم شبكة الماء في طوره السائل، والتحول التدريجي إلى شبكة الماء الصلب الجليدي التريهدرولي (H_2O). الأمر الذي يؤدي إلى تقارب أكبر لجزيئات الماء فتزداد كثافته، ولكن ما إن تصل درجة حرارة الماء إلى الصفر، حتى يبدأ تكوين الشبكة الجليدية للماء، وهذه الشبكة بسبب طبيعتها التريهدرولية تتباعد جزيئات الماء عن بعضها. أكثر من الماء في طوره السائل فتقل كثافة الجليد بمقدار (8%) مقارنة مع كثافة الماء السائل، لذا يعم الجليد فوق الماء السائل حامياً المياه في الأسفل من التجمد، ولولا ذلك

- لسيطر الجليد في كل المحيطات تقريباً، تقل الكثافة كذلك عندما تزداد الحرارة على (4°)، لأن الطاقة الحرارية تباعد بين جزيئات الماء، وفي درجة الحرارة (100°) يتحول الماء إلى الطور الغازي، ويخضع لقوانين الغازات الفيزيائية والكيميائية، ولا يسمح ماء.
١٢. إيفاتوف، أ. علم المحيطات، موسكو ١٩٨٠م، ص ١٢١.
١٣. تقسم مياه المحيطات ملوحة إلى مياه قليلة التملح، وذلك عندما تقل النسبة الألفية للملحة عن (24.622%)، وإلى مياه مالحة عندما يزيد التملح على هذه النسبة.
١٤. الوزن الحقيقي لسم ٣ واحد من الماء المقطر في درجة الحرارة (4°) يعادل (999.٩٩٧٢ ج)، ويختصر بـ جرام واحد/سم ٣.
١٥. يتم المزج المائي جزيئياً وهو شليل الفاعلية وزوياً مضطرباً (توربولنيتي) في الشرائح الفاصلة بين الكتل المائية، والدور الأساسي للمزج حملاني المظهر (Convection).
١٦. بالاختين، إ. هيدرولوجيا البحار المتوسطة، لينينغراد، ١٩٨٩م، ص ٢٠٥.
١٧. بالرجوع إلى بعض التفسيرات وإلى معجم الصحاح للرازي، وجدت أن كلمة مرج تعني: أرسل، دفع، سلم؛ ويرمز: الحد الفاصل، ولا يعني: لا يطلق واحد على الآخر فيبقده خصائصه وملامحه الأساسية.
١٨. سوخوف، في. ف. بحار المحيط العالمي، لينغراد، ١٩٨٦م، ص ٧٨.
١٩. دورونين يوب، الأكيا نوغرافيا الإقليمية، لينغراد، ١٩٨٦م، ص ١٤١.
٢٠. ميخائيلوف، ل. ي. الهيدرولوجيا، لينغراد، ١٩٨٥م، ص ٦٨.
٢١. في صحراء قراقوم التركمانستانية عدسات مائية عذبة كبيرة تم اكتشاف الكثير منها واستغلاله، ومنها ياسخان الذي تشغل المياه العذبة المتموضعة فوق المائدة عدسة إهليايجية الامتداد يصل طولها إلى ٦٥ كم، وعرضها الأكبر ٣٠ كم ويساكنة متوسطة (٤٠ م).
٢٢. يطلق العرب اسم البحر حتى على المياه العذبة كمياه الأنهار الكبيرة والبحيرات، وعلى كل مجمع مائي كبير، وفي جنوب السودان تصادف تسعينات مائية عذبة مثل بحر العرب، بحر الجبل، بحر الزراف... إلخ.
٢٣. الهيدرولوجيا العامة، مرجع سابق، ص ٣١٠.
٢٤. معتمد علي الصايوني، صفوة التفاسير.
٢٥. تفسير ابن كثير.
٢٦. المنتخب في تفسير القرآن الكريم، مشروع زايد لتحقيقه للقرآن.
٢٧. معجم مختار الصحاح للإمام الرازي.



(الهرمونات، ومركبات الزنك)، والإنزيمات والمهدئات، والمواد المضادة للأكسدة وغيرها من المواد. فهي جميعها مركبات كيميائية تجد لها طريقاً لتسج الحيوان أو لحليبه أو بيضه مما يجعلها تصل إلى المستهلك من دون قصد لتراكم في نسجه وأحشائه مسببة له أمراضاً مختلفة. وفي الآونة الأخيرة تعالت الأصوات من عدة منظمات تنادي بمراقبة الأدوية المعطاة للحيوان بقصد العلاج أو الوقاية أو

عادة تستخدم الأدوية البيطرية لعلاج الحيوانات من كثير من الأمراض التي تهدد حياتها أو تضعف إنتاجها، ومن ناحية أخرى يمكن أن تضاف إلى علائق الحيوانات لتزيد من إنتاجها أو لتحفظ هذه العلائق من التلف والتحلل.

إن استخدام مثل هذه العلاجات وبشكل عشوائي له آثار ضارة خاصة الصادات الحيوية والمواد السلقاميديّة والمواد المحفزة للنمو



على التعليمات والتوصيات الخاصة بطرائق الاستعمال والحفظ وفترة سحب الدواء .
إن بقاء هذه الأدوية أو مركباتها في نسج الحيوانات وأحشائها يسمى بالثمالات، وقد عرفت من قبل المجموعة الأوروبية على أنها بقايا من رواسب لها تأثير دوائي ومخلفات ناتجة منه تبقى في اللحوم أو الحليب أو البيض مما يؤدي إلى خطورة تهدد صحة الإنسان.
ومن أهم الأدوية التي تستخدم:

لزيادة الإنتاج لما لها من أضرار تلحق بالمستهلك وقد وضعت هذه المنظمات حدوداً عظمى لكل دواء بيطري في نسج الحيوان وأحشائه ومنتجاته يسمح بها ويمكن استهلاكها . كما أوصت بأن يحتوي كل دواء بيطري لكي يحقق الغاية المرجوة على ملصق يكتب عليه نوعيته والجرعات العلاجية والوقائية والتحذيرات من التفاعلات الجانبية السيئة التي قد تنتج عنه، كما يجب أن يحتوي

٧٨ - الصادات الحيوية Antibiotics:

وهي تؤدي دوراً رئيساً في هضم الطعام واستقلاب الدواء. لذا فإن التراكيز العالية من الصادات الحيوية قد تؤدي إلى آثار ضارة على توازن البيئة الجرثومية الطبيعية، ومن ثم التعرض المتكرر لجرعات علاجية من الصادات الحيوية يمكن أن يفسد الزمرة الجرثومية المعوية الطبيعية عند الإنسان ومن ثم يعمل على تغيير فعالية الإنزيمات المسؤولة عن استقلاب المواد الداخلة والخارجة كما يضعف المقاومة تجاه الجراثيم الممرضة التي يمكن أن تزيد من الحساسية تجاه الجراثيم الداخلية مثل العصيات التيفية وعصيات الزحار والعصيات القولونية، كما يمكن أن تنشأ نوعية مقاومة من الجراثيم ضد هذه الصادات الحيوية، لذا من الضروري تحديد تركيز كل من الصادات الحيوية التي لا تحدث ضرراً على الزمرة الجرثومية المعوية عند الإنسان.

الصاد الحيوي هو أي مادة كيميائية تنتج كلياً أو جزئياً من الأحياء الدقيقة وله القدرة على تثبيط أو قتل البكتيريا وذلك في تركيزات مختلفة وتستعمل هذه الصادات الحيوية للحيوانات كجرعات علاجية أو وقائية. إلا أن استعمالها بشكل متكرر يؤدي إلى ظهور ذراري جرثومية مقاومة يمكنها إحداث إصابات مستعصية لعلاج الإنسان مثل الإصابة بـ (جراثيم المكورات العنقودية الذهبية وذيفاناتها) كما أن بقايا هذه الصادات قد تسبب حساسية للمستهلك، وتشكل الزمرة الجرثومية للجهاز الهضمي البشري مركباً شديداً التعقيد وثابتاً نسبياً لمحتوى بيئي لأكثر من عشر خلايا جرثومية في كل جرام واحد من المحتوى وأكثر من أربعمئة نوع جرثومي وما يقارب ٩٠٪ من هذه الأنواع هي لا هوائية مخيرة لـ ٢٠ نوعاً مختلفاً.

الشعاعيات: شعاعيات رصاصية وحلقات دوائية تنقل في الحليب واللحم والبيض





المواد السلفاميدية لها تأثير ضار على منطقة الغدة الدرقية

أما تأثيرها في صحة الإنسان:
 إن معظم المواد السلفاميدية لها تأثير مضاد
 لنشاط الغدة الدرقية في الحيوانات ويتجلى ذلك
 عمومًا على شكل زيادة في وزن الغدة الدرقية
 وفقرت تنسج وفقدان للفروانية وفي بعض الأحيان
 يحصل فرط تنسج في الخلايا الحاتة للدرق
 الموجودة في الفص الأمامي للغدة النخامية.
 تنبيه: يجب أن يقلل من استخدام المواد
 السلفاميدية قدر الإمكان.
 - محفزات النمو Growth Promoters:
 أ. المركبات الهرمونية Hormones:
 تستخدم الهرمونات لبعض العلاجات أهمها
 داي إيتيل ستيلبوستيرول (DES) الذي يعمل
 على زيادة معدل التحويل والنمو في الحيوانات
 حيث إن الحيوانات المعالجة تعطي وزنًا أكبر من

- المواد السلفاميدية Sulfonamides:
 لا تعد المواد السلفاميدية قاتلة للجراثيم
 ولكنها مثبطة وفعالة ضد الأولي Protozoa.
 وتمتص بعض أنواع المواد السلفاميدية من القناة
 الهضمية بينما يكون امتصاص بعضها الآخر
 محدودًا. ويتم طرح مركبات السلفا من الجسم عن
 طريق الجهاز البولي وبمعدل سريع جدًا، وهي
 ذواية في الماء بشكل جيد وتتبلور عندما يصل
 تركيزها في المحلول إلى درجة التشبع، ولزيادة
 قابليتها للذوبان فإنها تستخدم علاجًا على شكل
 أملاح الصوديوم السلفاميدية ولكنها تطرح على
 شكل حمض السلفا مما يجعلها أقل قابلية للذوبان
 في السوائل الحامضية كبول الإنسان مثلاً لذا فقد
 ينتج عن تلك الحالة التي تسمى بالبول الميكرو الذي
 يعمل على إتلاف أنابيب الكلية.



الربيع علاج فعال ضد التوكسينيا الاكثري في الدواجن

أما بالنسبة إلى الإنسان فقد استخدم لعلاج الحوامل المهددات بالإجهاض ولكن وجد أن معظم النساء اللاتي يلدن بعد معالجتهم بهرمون DES يصابن بسرطان عنق الرحم والثدي ونزف دموي مفاجئ وهو أكبر برهان على خطر مثل هذه المواد لذا فإن قرار (E C) لعام ١٩٨١م، حظر استخدام مثل هذه المواد.

وقد تناضت اللجنة عن الهرمونات الطبيعية مثل الاستراديول والبروجسترون والتستوسترون حيث لا تشكل هذه الهرمونات أهمية إذا ما ووزنت بالهرمونات الصناعية التركيب ذات الأثر

الحيوانات غير المعالجة، وحقق هذا الهرمون لإناث الماشية سوف يؤدي إلى تغيرات تشريحية واضحة كالتوسع في مناطق الحوض والكفل والضرع وغيرها.

وقد كان حقن العجول الصغيرة المنتجة للحم يتم بجرعات تراوح من (٣ إلى ٥) مل وأحياناً تصل إلى ٨ مل من هرمون (DES) حتى سحبه من الأسواق العالمية عام ١٩٧٢م، لأن الطرائق الحديثة في التحليل أثبتت وجود كمية لا بأس بها من هذا الهرمون في أكباد الحيوانات المعالجة وهو مصنّف تحت اسم المواد المولدة للسرطان.



المسلمات العالقة بالهرمونات الذكورية أكبر عرضا

ويصبح هذا التأثير ضعيفا في فترة النمو المتأخرة، كما أنه علاج فعال ضد الكوكسيديا (الأكرية) في الدواجن وضد الديسنتاريا في الخنازير. لذلك يرفض المربي التوقف عن استخدامه في عليقة الحيوان حتى قبل التسويق ولو بفترة وجيزة. فوجود مثل هذه السمالات في نسج الحيوانات المعالجة يكون واضحا. علما أن الحد المسموح به هو ٨مغ/كج، كما يجب التقيد بخلو العليقة الزنيغ قبل (٥ إلى ٧) أيام على الأقل من الذبح وذلك ليتسنى للحيوان أن يتخلص منه وتصيح العضلات والكبد خالية من هذه المادة.

التراكمي الشديد، كما يتعين في هذه الهرمونات المستخدمة أن تعطى للحيوان بحذر شديد حتى لا تترك أثرا تراكميا ضاراً بالنسج الحيوانية.

وأيضاً تم تحديد الخطر ومقدار السلامة لبعض المواد مثل زيرانيول Zeranول وترينبولون Trenbolon.

كما يجب ألا ننسى بأن بعض الهرمونات لا تتخرب بالطبخ.

ب. مركبات الزرنيخ:

يعدّ الزرنِيخ من أهم محفزات النمو
(محفزات) في الفترة الأولى من حياة الحيوان

النوبة القلبية: الإجراءات الوقائية والاستعافية

حسان عكـفـلي



النوبة القلبية (الاحتشاء العضلي القلبي myocardial infarction) يموت جزء من عضلة القلب عندما يحرم من الدم، فالقلب، لكي يبقى معافى، بحاجة إلى أكسجين ومواد مغذية أخرى يحملها الدم، وهو يحصل عليها عن طريق الشرايين الإكليلية أو التاجية التي تلتف حول القلب من الخارج، يمكن أن تصيب الأمراض أي جزء من القلب، لكن الأكثر شيوعًا بينها هو مرض خفي يصيب الشرايين الإكليلية، إنه تصلب شرياني يدعى

كل سنة يصاب ملايين الرجال والنساء بنوبات قلبية. وكثيرون يتجون من النوبة دون أن تترك وراءها آثارًا تذكر. وآخرون لا ينجون، وآخرون أيضًا يتضرر قلبهم بحيث تصير «العودة إلى النشاطات المفيدة أمرًا غير محتمل»، كما يقول طبيب القلب بيتر كون، ويضيف: «لذلك يجب أن تعالج النوبات القلبية قبل أن تحدث كلما كان ذلك ممكنًا». القلب عضلة تضخ الدم في كل الجسم. وفي



من العرض. حتى في الشرايين التي لم تضيق إلى حد خطر يمكن أن يتحطم ترسب من اللويحة ويؤدي إلى تشكل جلطة دموية (خثرة thrombus) أضف إلى ذلك أن الشرايين المصابة هي أكثر قابلية للتشنج. ويمكن أن تتشكل جلطة دموية في موقع التشنج، مما يطلق مادة كيميائية تضيق أكثر جدار الشريان، الأمر الذي يسبب نوبة. عندما تحرم العضلة القلبية من الأكسجين لفترة كافية، قد يتضرر النسيج المتأخم. والعضلة

العصاد atherosclerosis. وفي هذه الحالة تتكون لويحة plaque، أو ترسبات دهنية، في جدران الشريان. وخلال فترة من الوقت يمكن أن تزداد اللويحة حجمًا، وتصلب الشرايين وتضيقها، وتحد من تدفق الدم إلى القلب. إن مرض الشريان الإكليلي الكامن هذا هو الذي يمهّد السبيل لمعظم النوبات القلبية. يؤدي الانسداد في شريان أو أكثر إلى حدوث نوبة عندما يصير طلب القلب للأكسجين أكبر

القلب هو العضلة التي تضخ الدم في جميع أنحاء الجسم



كلما كانت النوبة أطول زاد الضرر الذي يتسبب في له القلب

غير المتضررة من العضلة القلبية كبيرة كانت فعالية القلب في الضخ بعد النوبة أكبر. لكن بعض النوبات القلبية لا أعراض ظاهرية لها. وفي هذه الحالات قد لا يدرك الشخص أنه مصاب بمرض الشريان الإكليلي. ومن المؤسف أن تكون النوبة الحادة هي الإشارة الأولى إلى وجود مشكلات قلبية. وعندما يحدث توقف القلب (حين يكف القلب عن الضخ) يكون الأمل بالنجاة ضعيفاً جداً، إلا إذا استدعي فريق إنقاذ على الفور، وقام أحد الموجودين دون تأخير بعملية إنعاش قلبي رئوي CPR.

وعن غالبية الذين يعانون أعراض مرض الشريان الإكليلي، يخبر مرجع طبي متخصص أن نصفهم تقريباً لا يطلبون مساعدة طبية فوراً. ولماذا؟ «لأنهم عادة لا يعرفون ما تعنيه الأعراض

القلبية، خلافاً لبعض الأنسجة، لا تتجدد. وكلما كانت النوبة أطول زاد الضرر الذي يتعرض له القلب وارتفع احتمال الوفاة. وإذا تضرر نظام القلب الكهربائي، يمكن أن يضطرب النظم rhythm السوي للقلب، ويبدأ يختلج أو يرجف بقوة. وفي هذه الحالة من عدم الانتظام arrhythmia، يفقد القلب قدرته على ضخ الدم بفعالية إلى الدماغ. وفي عشر دقائق يغوت الدماغ وتحصل الوفاة.

أعراض النوبة

عندما تحدث أعراض النوبة القلبية، من الضروري طلب مساعدة طبية فوراً، لأن خطر الموت يكون أكبر خلال الساعة الأولى التي تعقب النوبة. ويمكن للمعالجة السريعة أن تنقذ العضلة القلبية من ضرر لا شفاء منه. وكلما كانت النسبة




«تفعل في اللحظة بمرء» في حالة الاستدعاء العليل لتسريع للماء

ذبحة *angina*، هو إشارة تحذيرية لنحو نصف الذين يعانون نوبة قلبية، ويشعر البعض بأعراض مثل ضيق النفس أو التعب والوهن. مما يدل على أن القلب لا يحصل على ما يكفي من الأكسجين بسبب انسداد شرياني إكليلي، وعمومًا تشمل أعراض النوبة القلبية ما يلي:

- شعور مزعج ضاغط أو قابض أو ألم في الصدر يدوم أكثر من مجرد دقائق معدودة. يمكن

التي يشعرون بها أو لا يحملونها محمل الجد». يناشد أحد الأشخاص الذين تعرضوا إلى نوبة قلبية قائلاً: «عندما تشعر بأن شيئًا لا يجري على ما يرام، لا تتأخر عن طلب المساعدة الطبية؛ لأنك تخشى أن تظهر وكأنك تضخم الأمور. فقد كنت أفقد حياتي لأنني لم أتصرف بالسرعة الكافية».

إن الألم أو الضغط في الصدر، الذي يدعى



رسم القلب لتحديد الحالة



الأعراض القلبية الرئوية لابد أن يقيم به متخصصون

أية مجموعة من هذه الأعراض، فيلزم طلب المساعدة فوراً، فهذه الإشارات التحذيرية يجب أن تحمل الشخص على الذهاب إلى الطبيب لإجراء تقييم لحالة القلب، ومع ذلك، هنالك حالات لا تكون فيها للنوبة القلبية أعراض بادية.

الإسعافات الأولية للنوبة

- إذا تبين أنها أعراض النوبة القلبية، فحينئذ يلزم عدم تجاهل كونها أعراض نوبة قلبية.
- التوقف عن متابعة كل ما يجري فعله والجلوس أو الاستلقاء.
- إذا دامت الأعراض أكثر من مجرد دقائق معدودة، فمن الضروري الاتصال هاتفياً برقم

- أن يُعتقد خطأ أنه حرقاة شديدة.
- ألم يمكن أن ينتشر إلى . أو يتمركز في . الفك، العنق، الكتفين، الذراعين، المرفقين، أو اليد اليسرى.
- ألم متواصل في أعلى البطن.
- ضيق نفس، دوام، إغماء، تعرق، أو إحساس بالبرودة عند اللمس.
- إنهاك . وقد يُشعر به قبل النوبة بأسابيع.
- غثيان أو قيء.
- نوبات متكررة من الذبذبات لا يكون سببها الإرهاق.
- قد تراوح الأعراض بين الخفيفة والقوية، ولا تحدث كلها في نوبة قلبية. ولكن إذا حصلت

المحافظة على الهدوء، سواء من المساعد أو المصاب، فقد تزيد الإثارة عدم انتظام القلب الذي يشكل خطراً على الحياة.

إذا بدا أن المصاب لم يعد يتنفس، فعندئذ يجب أن يتم سؤاله بصوت عال: «هل تسمعني؟» فإذا لم يجب المصاب، إذا لم يكن هنالك نبض، ولم يعد يتنفس، يجب البدء بالإنعاش القلبي الرئوي CPR.

إن الخطوات الرئيسية الثلاث للإنعاش القلبي الرئوي هي:

١. ارفع ذقن المصاب إلى أعلى لفتح مجرى الهواء.

٢. بانفتاح مجرى الهواء، أغلق منخري المصاب بأصابعك وانفخ ببطء مرتين في فمه حتى يرتفع الصدر.

٣. اضغط من ١٠ إلى ١٥ مرة على وسط الصدر بين الحلمتين لدفع الدم إلى خارج القلب والصدر. كرر النفختين والـ ١٥ ضغطة كل ١٥ ثانية إلى أن يعود النبض والتنفس أو إلى أن يصل فريق الإسعاف.

يجب أن يقوم بالإنعاش القلبي الرئوي شخص مدرب عليه. ولكن إذا لم يكن هنالك شخص مدرب، «فأي إنعاش قلبي رئوي خير من لا شيء»، كما يقول الدكتور كومنز، أحد الخبراء في الرعاية القلبية الطارئة. وفرص النجاة تتعدم تقريباً إذا لم يتم أحد بهذه الخطوات. فالإنعاش القلبي الرئوي يعمل على كسب الوقت حتى وصول المساعدة.

كيف يمكن خفض الخطر ؟

يرتبط مرض الشريان الإكليلي بعدد من العوامل الوراثية، البيئية، وينشط حياة المرء، فمرض الشريان الإكليلي والنوبة القلبية يمكن أن ينتجا من سنين، إن لم يكن من عقود، من الأخطار المقرنة بواحد من هذه العوامل أو أكثر. السن، والجنس، والوراثة: تزداد مع تقدم



السدانة تعجز الإسعاف بالمرص

الإسعاف المحلي، ويجب أن يجري إخبار الشخص على الهاتف الذي سيرسل الإسعاف أنه يحتمل الشك في نوبة قلبية.

إذا كانت هنالك إمكانية لإيصال المصاب إلى قسم الإسعاف في إحدى المستشفيات في وقت أسرع إن تم أخذه بسيارة خاصة إلى هناك، فيجب فعل ذلك، وإذا كان الشخص يعتقد أنه يتعرض لنوبة قلبية، فيلزم أن يطلب من أحد أن يقود السيارة ويأخذه إلى هناك.

وعند انتظار فريق الإسعاف الطبي، فعندئذ يلزم أن يتم إرخاء الثياب الضيقة، بما في ذلك الحزام أو ربطة العنق، وأيضاً يجب أن تتم مساعدة المصاب ليرتاح، بوضع وسائد له إذا لزم الأمر.



الشخص في أحم عوامل الإصابة بمرض الشريان الإكليلي

السن أخطر الإصابة بالنوبة القلبية، فنحو ٥٥ في المئة من النوبات القلبية تحدث لأشخاص يزيد عمرهم على ٦٥ سنة. ونحو ٨٠ في المئة من الذين يموتون بنوبة قلبية هم في الـ ٦٥ من العمر أو أكبر.

والرجال الذين هم دون الخمسين عرضة للخطر أكثر من النساء اللواتي ينتمين إلى فئة العمر نفسها. وبعد سن اليأس، يزداد الخطر الذي تتعرض له المرأة بسبب النقص الحاد في هرمون الإستروجين الوافي. واستناداً إلى بعض التقديرات، يمكن لمعالجة الاستعاضة للإستروجين أن تقلل خطر مرض القلب عند النساء بنسبة ٤٠ في المئة أو أكثر، مع أنه قد يرتفع خطر بعض السرطانات. وتؤدي الوراثة دوراً رئيساً، فالأشخاص الذين أصيب والدوهم بنوبة قلبية قبل الخمسين من العمر معرضون أكثر لخطر الإصابة بنوبة. حتى لو أصيب الوالدون بنوبة بعد الخمسين يبقى الخطر كبيراً. فإذا كان في تاريخ العائلة ما يدل على وجود مشكلات تتعلق بالقلب، يزداد الاحتمال أن تعاني الذرية مشكلات مماثلة.

عامل الكوليسترول: إن الكوليسترول، وهو نوع من الشحوم، ضروري للحياة. يقوم الكبد بإنتاجه، والدم يحمله إلى الخلايا، في جزيئات تدعى البروتينات الشحمية، ومن أنواعها، البروتينات الشحمية الخفيفة الكثافة (كوليسترول LDL) والبروتينات الشحمية العالية الكثافة (كوليسترول HDL). ويتحول الكوليسترول إلى عامل خطر يؤدي إلى مرض الشريان الإكليلي عندما يتركز كوليسترول LDL أكثر من اللازم في الدم.

يعتقد أن البروتينات الشحمية العالية الكثافة HDL تؤدي دوراً وقائياً إذ تزيل الكوليسترول من الأنسجة وتعود به إلى الكبد، حيث يعدل ويزال من الجسم. وإذا أظهرت الفحوص نسبة عالية من البروتينات الشحمية الخفيفة الكثافة LDL ونسبة قليلة من البروتينات الشحمية العالية الكثافة HDL، فهذا

يعني أن خطر مرض القلب كبير، وبخفض مستوى البروتينات الشحمية الخفيفة الكثافة LDL يمكن أن يتراجع الخطر بشكل كبير. ومن المهم الاهتمام بالنظام الغذائي عند المعالجة، ويمكن لممارسة التمارين الرياضية أن تساعد. وثمة عقاقير مختلفة مفيدة، ولكن لبعضها تأثيرات جانبية غير مستحبة.

و يوصى بنظام غذائي قليل الكوليسترول والدهون المشبعة، واستبدال الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، كالزبدة، بأطعمة ذات نسبة أدنى، كزيت الزيتون الذي،

٨٩

كاروتين، والفيتامين ج C يمكن أن تبطل العصاد (تصلب الشرايين) لدى الحيوانات، واستتجت إحدى الدراسات أنه يمكن أن تقلل أيضًا حدوث النوبات القلبية لدى البشر. والاستهلاك اليومي للخضر والفواكه الغنية بالبيتا كاروتين وغيرها من أشباه الكاروتين مع الفيتامين ج، كالطماطم، والبقول الورقية القائمة اللون، والفليفلة، والجزر، والبطاطا الحلوة، والشمام يمكن أن يزود بعض الحماية من مرض الشريان الإكليلي.

إن الفيتامين ب6 B6 والمغنيزيوم نافعان أيضًا، ويمكن أن تقيد الحبوب الكاملة كالشعير والشوفان، وكذلك الفاصولياء والعدس وبعض الثمار الجوزية. وبالإضافة إلى ذلك، يعتقد أن تناول أسماك كالسلمون أو الإستمري أو الرنكة أو التونة مرتين في الأسبوع على الأقل يمكن أن يخفض أخطار مرض الشريان الإكليلي، ذلك لأنها غنية بالحموض الدهنية المتعددة غير المشبعة أوميغا ٣.

نمط حياة قليل الحركة: إن الأشخاص القليلي الحركة يواجهون خطر الإصابة بنبوة قلبية أكثر من غيرهم، فهم يقضون معظم يومهم دون القيام بنشاط جسدي ولا يمارسون تمارين رياضية بانتظام. وغالبًا ما تحدث النوبات القلبية لدى هؤلاء الأشخاص بعد أعمال شاقة كإجهاد النفس في البستنة، الهرولة أو حمل أحمال ثقيلة كبيرة. ولكن الخطر ينخفض بين الذين يمارسون التمارين الرياضية بانتظام. فقد وجدت دراسة بارزة على ١٧ ألف من خريجي هارفرد أن التمرين يمكن أن يقاوم استعدادًا موروثًا للموت المبكر. وأضافت: «إن احتمال تطور مرض القلب الإكليلي عند الشخص النشط جسديًا هو نصف الاحتمال عند الشخص غير النشط جسديًا».

و السير يغطي سريرة من ٢٠ إلى ٣٠ دقيقة ثلاث أو أربع مرات في الأسبوع يمكن أن يقلل خطر النبوة، وتحسن التمارين المنتظمة قدرة القلب على الضخ، وتساعد على تخفيف الوزن، ويمكن أن تخفض مستويات الكوليسترول



يمكن أن يخفض البروتينات الشحمية الخفيفة الكثافة ويحفظ العالية الكثافة منها. ومن ناحية أخرى، تذكر المجلة الأمريكية للصحة العامة أن الزيوت النباتية المهدرجة أو المهدرجة جزئيًا والموجودة في معظم أنواع المرغرين والسمن النباتي يمكن أن تزيد البروتينات الشحمية الخفيفة الكثافة وتخفف العالية الكثافة منها. ويوصى أيضًا بالتقليل من تناول اللحوم التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون واستبدالها بقطع لحم الدجاج أو الديك الرومي.

و أظهرت الدراسات أن الفيتامين هـ E، البيت



إذا لم يكثر تناول شخص سماد فاني لعلنا قلبي خير من لا شيء

الدم). يمكن أن ينخفض خطر النوبة القلبية من ٢ إلى ٣ في المئة. ويمكن أن تكون الأدوية التي تخفض ضغط الدم فعالة، وتتبع نظام غذائي، وفي بعض الحالات الحد من تناول الملح، بالإضافة إلى أن ممارسة تمارين رياضية بانتظام لتخفيف الوزن يمكن أن تساعد على ضبط ضغط الدم المرتفع.

ويعزز الوزن الزائد ارتفع ضغط الدم والمستويات غير الطبيعية للشحوم، وتجنب البدانة أو معالجتها طريقة مهمة للوقاية من السكري، فالسكري يسرع بمرضى الشريان الإكليلي ويزيد

وضغط الدم. الضغط المرتفع، والوزن الزائد، والسكري: يمكن لضغط الدم المرتفع أن يضر جدران الشرايين مما يتيح لكوليسترول LDL دخول البطانة الشريانية ويعزز تراكم اللويحة. ويزداد ترسبات اللويحة، تزداد المقاومة لتدفق الدم فيرتفع ضغط الدم.

يجب أن يحرص ضغط الدم بانتظام، لأنه قد لا يكون هنالك دليل ظاهري على وجود مشكلة. ومقابل كل نقطة واحدة تنخفض في الضغط الانبساطي (الرقم الثاني عند قياس ضغط

رجاء لضحايا النوبة القلبية

بعد الإصابة بنوبة قلبية، من الطبيعي أن يشعر المرء بالخوف ويعتريه الهم. هل أصيب بنوبة أخرى؟ هل أصبح عاجزاً أو متقيداً بسبب الألم وفقدان القوة والحيوية؟

يقول الدكتور بيتر ليو، مدير بحوث طب القلب في مستشفى تورونتو، إنه: «كان يظن قبل أن لا مفر من قصور القلب، ولكن يمكن إبطال الضرر بالتمرين». وبعد دراسة بنتائج جيدة أجريت على الجرذان، عمدت «عيادة وظائف القلب» في المستشفى إلى جعل مرضى القلب «يمشون مسافات متزايدة تدريجياً كل يوم». كما يذكر التقرير، وتضيف: «تظهر النتائج الأولية أن المشي مسافة كيلومتر على الأقل كل يوم يمكن أن يبطل (الاندحار) نحو قصور القلب غند البشر أيضاً». إلا أن الدكتور ليو قال: إن الخطوات يجب أن تكون سريعة نسبياً، وأن السير يجب أن يخضع للإشراف.

وتجمع الأبحاث الطبية على المساعدة الأساسية: لكي يشفى القلب يجب ألا يكون وحيداً. فدمع العائلة والأصدقاء يؤدي دوراً كبيراً وإيجابياً في شفاء من تتألم قلوبهم. فالقلب بحاجة إلى تعزية ومواساة القلوب الأخرى لكي يستمر في الخفقان.




يتراجع الخطر عند ممارسة التمارين الرياضية

المراجع

- American Journal of Public Health; July 2000
- American Journal of Public Health; November 2000
- Consumer Reports on Health, January 2001
- From Stress to Strength, Dr. Robert S. Eliot
- Protect Your Heart, Dr. Anthony Graham
- Heart Attack-What Can Be Done? Thomas Stegmann

خطر النوبة القلبية.

التدخين: إن تدخين السجائر من أهم العوامل المهمة في الإصابة بمرض الشريان الإكليلي. فهو مسئول مباشرة في الولايات المتحدة عن ٢٠ في المئة تقريباً من الوفيات الناتجة من مرض القلب، وعن ٥٠ في المئة تقريباً من النوبات القلبية لدى النساء اللواتي لم يتجاوزن الـ ٥٥ من العمر. فتدخين السجائر يرفع ضغط الدم ويدخل مواد كيميائية سامة كالنيكوتين وأول أكسيد الكربون إلى مجرى الدم، وهذه المواد الكيميائية بدورها تؤذي الشرايين.



ثلاثة أضعاف ما يحتاج إليه جسمه، فرض عليه الصوم حرصاً على سلامته ودوام صحته وقوته، وذلك ما دعا بعض الأطباء إلى أن يقول: «من أكل حتى يمرض صام حتى يشفى».

والصوم لغة هو الإمساك عما تنازع إليه النفس (لا مطلق الإمساك)، وقيل للمصمت: صوم لأنه إمساك عن الكلام، وقد جاء في القرآن الكريم على لسان السيدة مريم عليها السلام ﴿ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِمَ

لقد فرض الصوم على الإنسان المسلم في السنة الثانية الهجرية، والغاية من الصوم عند الإنسان بصورة عامة هي الاستجابة لأوامر الله، ومن رحمته تعالى بعباده أنه جعل أداء هذا الفرض تنقية للجسم من المواد السامة والفضلات المتراكمة بسبب سوء التغذية الخاطئة التي نسير عليها، والتي تكون في أحوال كثيرة سبباً لإصابتنا بمختلف الأمراض والأدواء.

ولما كان الإنسان يتناول من طعامه وشرابه



عمومًا، فالصيام على نوعين كلي وجزئي،
فالصوم الكلي: ينقطع فيه المرء عن جميع
الأطعمة سواء منها السائلة أو الجامدة مقتصرًا
على الماء فقط. غير أن هذا النوع يستدعي الدقة
والحذر خشية الإصابة بضرر، فمن الواجب ألا
يصوم الإنسان إلا بعد أخذ رأي طبيب يمهّد له
السبيل ويرشده إلى الطريق القويم.
أما الصوم الجزئي (المعبر عنه بالحمية)
فينقطع الإنسان فيه عن الأطعمة الثقيلة

اليوم إنسيًا» [مريم : ٢٦]. وكذلك صام زكريا
عليه السلام عن الكلام ثلاث ليالٍ سويًا،
والصوم في الإسلام هو الإمساك عن الأكل
والشرب: بل كل ما يدخل الجوف، وعن الاتصال
الجنسي ... ومدته: من طلوع الفجر الصادق إلى
غروب الشمس.
ولكي نستدل . من جهة أخرى . على أن
الصوم في الحيوان هو معجزة إلهية كبرى كما
سنرى لاحقًا، لابد لنا من معرفة أنواع الصيام



قدرة الجمل على حمل الحمل (الصيام عن الماء) تجعله حيواناً لا مثيل له بين الأحياء

فالصيام عند الكائنات الحية من «نمط خاص» وله وضع حيوي (بيولوجي) آخر غير الذي نعرفه عند البشر، وتختلف مدة هذا الصيام من كائن حي لآخر، كما يختلف شكله وأسلوبه ومزاياه أيضاً في عالم الكائنات الحية، فهو بشكل عام حالة عضوية حيوية (فيزيولوجية بيولوجية)، معنية تعتري بعض الأحياء دون غيرها في فترة زمنية من حياتها في كل عام.

وإذا كان الإنسان . في فترة صيامه . يمتنع عن الطعام والشراب وتزغ نفسه إليه مدة من الزمن، ويتحرك ويعمل أو يرقد أو ينام في أثناء صيامه. فإن عدداً من الكائنات الحية تمتع أيضاً عن الغذاء والشراب كلياً، وقد تتحرك وتتنقل من مكان لآخر وقد تنام أو لا تتحرك أو تسكن البتة إبان فترة صيامها كذلك.

وعندما نقول: الصيام عند الكائنات الحية، يتبادر إلى ذهن القارئ العزيز . للوهلة الأولى . أنه حالة التعبد التي يقوم بها الكائن الحي لربه

واللحوم، مقتصرًا على الأغذية السهلة اللطيفة أو الشمار الناضجة وما إلى ذلك، ولكل مرض نوع خاص من الحمية، وكميات خاصة من ذلك النوع من الأغذية.

وقد قسم علماء الطب الطبيعي الصوم الكلي إلى قسمين: طويل وقصير: فالصوم الطويل يقضي بلزوم الانقطاع عن الطعام كلياً (ما عدا الماء) إلى أن يظهر الجوع.

وأما الصوم القصير: فهو الانقطاع عن الطعام بضعة أيام، فيما عدا الماء ثم يتناول الطعام أياماً أخرى، ثم يعود إلى الصوم وهكذا حتى يظهر الجوع الحقيقي، وربما وفي الغرض الاستغناء عن وجبة أو اثنتين. وعموماً فقد اختلف العلماء في تحديد مدة الصوم عند الإنسان، فقال قائل منهم: كل صيام جاوز الخمسة عشر يوماً عُدَّ من الصوم الطويل، وما دون ذلك من الصوم القصير. ومنهم من ذهب إلى أن مدة الصوم الطويل عشرة أيام فما فوق.

ومن ناحية أخرى، فعلى الرغم من أن أحدًا من البشر لا يستطيع البقاء حياً ثلاثة أسابيع دون ماء، وأن الإنسان قد يبقى على قيد الحياة شهراً دون أن يتناول طعاماً، ولكن إذا توازر له الماء؛ فإن الأمر يختلف تماماً عند الكائنات الحية، وهذا الشيء في حد ذاته دليل أكيد على قدرة الخالق العظيم، الذي مكن بعض الكائنات الحية . دون غيرها . كل عام من العيش والحياة مدة زمنية طويلة دون تناول غذاء أو ماء، إذ يكفيها في هذه الفترة ما تدخره في أجسامها من مواد غذائية مؤونة العيش والبقاء على قيد الحياة إبان هذه الفترة الحياتية الغربية والمعجبية، التي تقضيها في مخابئها وأعشاشها . فإن هذا قليل من كثير عن الصوم عند الإنسان. أما الحديث عن الصيام في عالم الكائنات الحية: فإنه يطول ويطول، وهو حديث شائق وغني بالفائدة، ويظهر قدرة الله الكبيرة في خلقه، وأنه وحده الخالق القادر على كل شيء.

والأرض وهو العزيز الحكيم﴾ [الحشر: ٢٤].
والطبع، فإن الصوم، هو في الحقيقة، كما قلنا، فرض على الإنسان وليس فرضاً على بقية الكائنات الحية، ونحن لا نسوق هذا الكلام من قبيل الاستدلال على أن الكائن الحي يصوم صوماً حقيقياً لله عز وجل، مثله مثل الصوم الحقيقي، بمعنى العبادة المفروضة، الذي يقوم به الإنسان المسلم في شهر رمضان، أو كالصوم الذي يقوم به الإنسان تطوعاً في غير رمضان.

إن الصيام عند الكائنات الحية مظهر عضوي (فيزيولوجي) معين من مظاهر الحياة، يخص بعض الكائنات دون غيرها في كل عام، وقد يكون له معنى آخر ودلالات ثانية لا يعلمها إلا الله عز وجل، وهي في هذا الوضع الحياتي (البيولوجي) الشاذ، الذي لا نعرف ماهيته، ولا ندري مفهومه ومغزاه، وإن كنا نعرف أن الكائن الحي الصائم في هذه الفترة يقوم بعملية التوالد أو التكاثر أو فقس البيض وما شاكل ذلك، ومن ناحية أخرى، فنحن مادامنا نتحدث عن الصيام عند الكائنات الحية، لا بد من ذكر حالة تستحق منا الذكر، وتستوقفنا مذهولين مفكرين بقدرة الله وعظمته في خلقه أجمعين، تلك الحالة، هي ذلك الوضع العضوي (الفيزيولوجي) الخاص الذي يحصل عند بعض الثدييات، والكائنات الحية في فصل من الفصول، وبخاصة في فصل الشتاء. وهذا الوضع العضوي (الفيزيولوجي) في حد ذاته يُعدُّ شاهداً حياتياً (بيولوجياً) على قدرة الله الكبيرة في حفظه لمخلوقاته العجيبة فترة من الزمن في حالة عضوية جسمية معينة بعيدة عن الغذاء والماء، ولعل ذلك الوضع (الفيزيولوجي) الجسمي الذي يخص بعض الكائنات الحية والمخلوقات دون غيرها، هي تلك الحالة التي ندعوها اصطلاحاً في علم الحياة Biology «الإشتاء أو اليَّبات الشتوي» Hibernation ومعناه علمياً: الحالة الساكنة أو الهاجعة أو حالة السُّبات (حال الهجوع أو السكون) Dormant State



الشميرات سبات صرايتها لشتا

العظيم، أو بمعنى آخر هو الفرض الذي فرضه الله تعالى على الكائنات الحية خلال فترة من حياتها كل عام. وفي واقع الأمر، نحن لا نقصد من كلامنا ذلك المعنى الذي قد يفهمه القارئ الكريم خلال قراءته عنوان المقالة، وما تحتها من سطور عن الصيام، مع قناعتنا الكاملة، بوصفنا مسلمين. أنه ما من شيء في هذا الوجود إلا ويسبح بحمد الله العظيم، مستدين في هذا إلى قول الباري عز وجل: ﴿تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً﴾ [الأنعام: ٤١].

وقوله تعالى: ﴿ألم تر أن الله يسبح له من في السموات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون﴾ [النور: ٤١].

وقوله أيضاً: ﴿هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات

حقيقية، مثل: الضفادع والسلاحف والقنافذ ومرموط الخمائل Woodchuck والفئران الوثابة Jumping mice والجُرَذ السَّجَّابِي (Myoxos glis) Dormouse وسناجب أرضية معينة والهَمْسَرَات Hamsters، وتلك الخفافيش التي لا تهجر جنوباً في فصل الشتاء؛ ولكل حيوان من هذه الحيوانات طريقته في الإشتاء.

فالإشتاء بالمعنى الحرفي إذن هو الصيام عند الكائن الحي في فصل الشتاء ولمدة من الزمن، ويقابل كلمة الإشتاء كلمة «التَّصَيُّف» Aestivation أو السَّبات الصيفي، وهو نوع من صيام الكائنات الحية في فصل الصيف والمقصود من التصيف هو قضاء الصيف في حالة خَدَرٍ وفَقْدِ حَسٍّ، أو بمفهوم آخر هو فَقْدِ النشاط في الصيف أو في فصل حار أو وقت انحباس المطر مدة طويلة، وهو - في واقع الأمر - نمط من الصيام تمارسه بعض الكائنات الحية

التي تنفق (تقضي) فيها أنواع حيوانية معينة فصل الشتاء. وهذه الحالة تتميز بالتَّخَدُّر (الخَدَر) Narcosis وبانخفاض حاد في درجة حرارة الجسم والنشاط والحيوية والفعالية الاستقلابية Metabolic Activity للجسم، ويعني أدق يُعرَّف السبب بأنه الحالة التي يتم فيها إنفاق فصل الشتاء بالسَّبات، أو هو اكتنان الشتاء، أي فتور الحياة في النباتات وبعض الحيوانات في الشتاء، وفي هذا الوضع (الفيزيولوجي) تصبح تلك الحيوانات التي يعثرها السبات خاملة غير نشيطة في فصل الشتاء، وتكون درجة حرارة أجسامها منخفضة على نحو كبير، ويظل معدل تنفسها وضربات قلوبها قريبة من المعدل الطبيعي كما في الحالة السوية لتلك الحيوانات، وعلى سبيل المثال لا الحصر، نذكر من بين الثدييات (اللبونات) Mammals التي تعدّ حيوانات سبات

نمط من الصيام يقيم في فصل الشتاء يتأخر الطعام للحيات في الحيات





سجور البحر تضي قضا من قضا في حالة سكون

أيضاً، كل عام من حياتها. وقبل الدخول في ذكر الأمثلة من عالم الحيوان عن الحيوانات التي تمارس حقاً الصيام، لا بد لنا من شرح مفهوم كلمة الإشتاء التي مر ذكرها قل قليل للتبيين الغاية منه (بيولوجياً)، ولتلقى بعض الأضواء على معنى الصيام في عالم الحيوان كذلك، وهو الأمر الذي نعتيه في بحثنا من المعروف أن الثدييات (الحيوانات الثديية) هي حيوانات ذوات دم حار، ولا ترتفع درجات حرارة أجسامها ولا تنخفض تبعاً لدرجة حرارة محيطها أو بيتها، مثلما يحصل لدرجة حرارة أجسام الزواحف والبرمائيات (الحيوانات البرمائية) Amphibians والأسماك، ومعظم الثدييات تمتلك درجة حرارة ثابتة نظامية مستديمة هي نحو (٩٨) درجة فهرنهايت، وتكون

درجة حرارة جسم الإنسان ٩٨.٦ درجة. ويمكن لثدييات معينة - من ناحية ثانية - السماح لدرجات حرارة أجسامها بالانخفاض إلى ما يقارب درجة حرارة محيطها وبيتها، ويحصل هذا الشيء خلال فترة النوم العميق في أثناء الطقس البارد (الجو البارد)، أو بمعنى آخر خلال الإشتاء. وحالة (الإشتاء)، في الواقع - أكثر من حالة (النوم العميق)، فعلى الرغم من أن درجة حرارة الحيوان تكون منخفضة، فإن جميع العمليات الجسمية تكون أيضاً بطيئة أو منخفضة تماماً، ويشمل هذا أيضاً ضربات القلب ومعدل التنفس عند الحيوان ذاته، فعلى سبيل المثال، يضرب قلب مرموط الخماثل على نحو طبيعي ومنظم وسوي نحو ٨٠ مرة بالدقيقة، وفي الإشتاء يضرب نحو ٤ مرات في الدقيقة الواحدة، ويكون متوسط معدل تنفس

إن الثدييات التي تشتي (تسبب)، تفعل ذلك لسبب مقنع وواقعي: ففي الشتاء لا يكون الغذاء الواجب عليها تناوله متوافراً وفي تناولها، وإذا كانت هذه الثدييات مفعمة بالنشاط ورشيقة فإنها في فصل الشتاء هذا سوف تموت من الجوع. كذلك فإن الخفافيش الآكلة للحشرات Insect-Eating bats في المناطق المعتدلة، لا تتمكن من إيجاد الحشرات والعثور عليها خلال أشهر فصل الشتاء البارد. ولهذا فإنه يجب عليها إما أن تهاجر بعيداً نحو الجنوب (المنطقة الجنوبية) تماماً، حيث تكون الحشرات ناشطة هناك في فصل الشتاء كله، أو أن تدخل في الإشتاء (البيات الشتوي)، وخلال إشتائها تنقص سرعتها، وفي ذلك الوضع تستعمل دهنها المخزن في أجسامها لإمدادها بالغذاء. وفي الأسابيع التي تسبق دخول الحيوانات الإشتاء تقوم باحتزان كميات ضخمة وكبيرة من الدهن في أجسامها. وبعدئذٍ ومع اقتراب فصل الإشتاء ودنوه يصبح الحيوان أقل نشاطاً وفاعلية.

ومعظم القوارض التي تشتي تصنع حجرات أو تجاويف أو فجوات خاصة في الأرض (تحت سطح الأرض)، وبعددها تتكور (بشكل كرة أو أسطوانة) أو تلتف على نفسها بشكل كرات في داخل أعشاشها وأماكن إيوائها التي تعملها هي بنفسها من الفراء أو الوبر أو خمل النسيج، والحشائش والنباتات العشبية أو أوراق الشجر. وذلك في هذه التجاويف المعمولة تحت سطح الأرض. أما هذه التجاويف أو المعتزلات أو أماكن الإشتاء التي تصنعها مثل هذه الحيوانات القارضة فينبغي أن تكون - سواء أكانت في الأرض أم في الكهوف - باردة باعتدال، ولكن يجب أن تبقى درجة حرارة هذه الأماكن أعلى من درجة التجمد، حيث لوحظ أن درجات الحرارة البيئية لهذه الكائنات المشتية إذا كانت أدنى أو أقل من درجة التجمد؛ فإنها تسبب تشكيل بلورات جليدية (بلورات ثلجية) Ice Crystals في



الراخف لها القدرة على تغيير درجات حرارة أجسامها



أحد الأساليب التي تستخدمها بعض الكائنات لتقليل فقد الماء في الصيف هو أن يغير لونها وألوان أقدامه خلال هذه تلك

هذا الحيوان كذلك (٢٥ إلى ٣٠) مرة في الدقيقة في الحالة السوية، ويصبح في البيات الشتوي (الإشتاء) تنفساً واحداً فقط كل ٥ دقائق. أما درجة الحرارة السوية والنظامية والطبيعية لحيوان مرموط الخماثل ذاته بينما تكون ٩٧ درجة فهرنهايت بينما تكون في حالة الإشتاء نحو ٣٧ درجة فهرنهايت .



السلحفاة لغم من الأحياء ذات الصياد الطويل الأمد



الحشرات ذات "الدم البارد" تتغير أجسامها بالنسبة إلى الحرارة المحيطة بها

وتعرضه لأشعة الشمس، وكثيراً ما تحفر جحوراً جديدة وتبطنها بنبات السرخس والأعشاب استعداداً لفصل التزاوج.

كذلك تثير بعض كتب علوم الحياة ما يدعو إلى الدهشة والاستغراب عن حياة الدببة القطبية وبخاصة في فترة صيامها؛ فقد ذكر أن الدببة السمراء والسوداء التي تعيش في القطب المتجمد

الدم تقضي إلى موت الحيوان المشتي ذاته، ومن جانب ثان: فإنه لا يوجد حيوان من أكلات اللحوم (اللواحم) Carnivores بما في ذلك الدببة والراكون Raccoon (procyon lotor) يسبت أو عُرف عنه أن يُشتي. وهذه الحيوانات ربما تصبح خاملة غير نشيطة في فصل الشتاء، ولكنها لا تُسبت أو لا تشتي في الواقع، ولا تكون درجات حرارة أجسامها منخفضة على نحو كبير، ولا يبقى معدل تنفسها وضربات قلبها قريباً من المعدل كما هو الحال في الوضع الطبيعي أو السوي للحيوان نفسه، ومع كل هذا فقد قرأنا في بعض الكتب أن بعض الدببة القطبية تصوم أيضاً، والمعروف أيضاً، أن الضفادع العادية (أو الشائعة) تشتي عادة في الطين أو الوحل في قاع البرك، وكذلك تسبت بعض أنواع السلاحف كالسلاحف الصندوقية عن طريق الاختباء والإقامة في ملجأ أو جحر في التربة أو الأرض. أما القنافذ؛ فإنها تسبت في أعشاشها الدافئة، فيتكور كل قنفذ على نفسه بشكل كرة محكمة الإغلاق، وأقدامه تكون مثنية على مقربة من جسمه، حيث يقضي فصل الشتاء نائماً، وكل تلك الحيوانات التي ذكرناها هي أمثلة حية (من عالم الحيوان) تؤكد أن الحيوان يصوم عن الطعام والشراب أيضاً، وهذا ما يدل دلالة حقيقية على قدرة الخالق العظيم في حفظه تلك الكائنات الحية دون شرب ماء أو تناول طعام أثناء تلك الفترة التي تقضيها في حالة الإشتاء كل عام.

ومن المعلوم كذلك أن الغرير Badger (Meles Taxus)، وهو حيوان ثديي قصير القوائم يحتفر في الأرض أوجرة يسكن فيها. يمارس الصيام أيضاً، وعلى هذا، ففي المناطق ذات البرودة الشديدة تبقى الغرائر نائمة في أوكارها من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني إلى شهر مارس/ آذار. أما في البلدان المعتدلة؛ فإنها تخرج كمعادتها في الليالي اللطيفة، وليس غريباً أن نرى آثارها في الثلج، وفي شهر مارس/ آذار تخرج الغرائر ما تكون قد اتخذته فراشاً لها



الحيوان حثيث في الأرض أو حذر يستكن فيها - وادي
الحيوان



أحد الدبة القطبية (بلا طعام) طوال فصل الشتاء
مكثية يشجع جسمها

الشمالي في مكان بعيد نحو الجنوب، تعتمد إلى التخفي طوال الشتاء والنوم خلال فترة هي في أقصى درجات البرودة، أما الدبة القطبية فعلى الرغم من أنها تعيش في مثل هذه المنطقة الباردة، فإنها لا تحاول إيجاد ملجأ لها في الشتاء إلا إنائها المقبلة على الولادة. وقبل أن يصبح الشتاء شديد القسوة تحضر أنثى الدب القطبي تجويفاً تحت صخر أوفي ركام من جليد، ومع سقوط الثلج وتزايد سماكة السقف فوقها يزداد دفء كهفها الثلجي. هنا تولد صغارها في شهر يناير/ كانون الثاني. وتبقى الدبة القطبية الأم (بلا طعام) طوال فصل الشتاء مكتفية بشحم جسدها. والواقع أن الدبة الذكور نفسها يقل طعامها في هذه الفصل: لأنها لا تستطيع صيد الأسماك عندما تتجمد المياه. وحين يأتي الربيع في القطب المتجمد الشمالي ويذوب الثلج تنبت الأعشاب والطحالب بسرعة ووفرة فتأكل الدبة كلها، ذكوراً وإناثاً وصغاراً، هذه النباتات، مألوفة بها بطونها في غالب الأحيان قبل أن تتجول بحثاً عن (فقمة) مستلقية على الثلج أو عن جثة حوت مرمية على الشاطئ. ومن جهة أخرى، فإنه على الرغم من أن الراكونات لا تسبت حقيقة كما ورد في بعض الكتب العلمية، إلا أن بعض كتب علم الحياة قد ذكرت أيضاً أن الراكونات Raccoons هي حيوانات تصوم مثل بعض الكائنات الحية، وهي كائنات تمضي في المناطق الباردة معظم أيام الشتاء وهي نائمة، وهذا يدعو إلى العجب والتظن والتأمل في خلق الله ملياً.

أما حيوانات الفقمة أو عجول البحر Seal (Phoca) فهي من الحيوانات التي تمضي فترة من الزمن في حالة صيام أيضاً. وهذه الكائنات الحية تعيش في مجموعات كبيرة، وفي فترة التناسل يختصم ذكورها بشراسة من أجل الإناث، إذ يحاول كل ذكر أن يحتكر لنفسه كل ما يستطيع من الإناث، وفي هذه الفترة تكون ذكور هذه الكائنات ذات الفراء التي تسمى أيضاً بـ «الدبة

والغذاء . ما بين نهاية تشرين الأول (أكتوبر) ونهاية آذار (مارس) تقريباً، ومن الخفافيش ما يقوم بهجرة قصيرة لا تزيد على ثلاثين ميلاً بحثاً عن أماكن سبات ذات درجات حرارة مناسبة. كذلك فإننا إذا قرأنا عن حياة بعض الحيوانات، فإننا سنجد حتماً أشياء تدعو للاستفهام والتعجب، وحيوان الليمور Lemar هو من تلك الأحياء التي تصوم وفي حياتها كثير من الأسرار . فهي حيوانات تقضي نهاراتها في أوكار أو أعشاش في أعالي الأشجار في الغابات المدارية ولا تنتقل إلا عند منتصف الليل، ونادراً ما تنزل إلى الأرض، ولذلك لا نعلم غير القليل جداً عن عادات هذا الحيوان، وحيوانات الليمور حيوانات تأكل الحشرات وببض الطيور والحيوانات الصغيرة والثمار وأوراق النبات. وتستعمل أيديها الناشطة للحفر ولحمل الطعام، ولكنها لا تستعمل أذناها كالعساعدين للتعلم بالأشجار . وهناك نوع من الليمور الصغير الفأري الحجم، له ذيل سمين يزداد سمكة حين يكون الطعام وافراً كسنام الجمل، وفي الفصل الحار الجاف حين يندر الطعام ينام الليمور في كركه ويعيش على ما اختزنه من غذاء في ذيله.

وإذا انتقلنا إلى عالم كائنات حية أخرى، وهو عالم المحار لوجدنا العجب العجيب، ولعرفنا أن المحار كائن حي يصوم كما تصوم بقية الأحياء، إذ إن هذه الكائنات أو هذه المحارلات لا تأكل ولا تنمو إلا في فصل الصيف، ويمكن أن نعرف عمرها من الخطوط الموجودة على أصدافها، ففي الشتاء حين تكون المحارة ساكنة كل السكون، يتصلب الخط الذي نما في الصيف السابق، ويظهر بوضوح حين تبدأ المحارة بالنمو ثانية في الصيف اللاحق. ويكتمل نمو المحارة حين يصبح عمرها أربع سنوات، فإذا ن هذا مثال مدش عرفناه من محيط كائنات حية تعرف بالمحارات وهي من مجموعة الرخويات Mollusca (Molluscs) التي هي ثاني أكبر مجموعة في مملكة

البحرية مشغولة بتثبيت مكانتها وحماية إنائها حتى لا يبقى لها وقت للأكل، لذلك تصبح هزيلة نحيلة بعد بضعة أسابيع.

كذلك: فإن من الأحياء التي تمارس الصيام ما يُعرف بـ الرغبات أو الفئران النومة وهي حيوانات أشد شبهاً بالسناجب الصغيرة منها بالفئران بسبب ذيلها الكثيفة، وهذه الكائنات تجلس عادة منتصبة وهي تحمل طعامها بأيديها، وهي تعيش في الأشجار والنباتات الخفيضة، وتبني أعشاشاً من لحاء الياسمين البري في السياجات أو في نبات العليق لتلد فيها صغارها: ولقضاء الشتاء تبني أعشاشاً في ثقوب الأرض أو تحت الأوراق اليابسة، وهي مشهورة بنومها العميق جداً في فصل الشتاء الذي يستمر نحو سبعة أشهر، إنها تنام نوماً عميقاً، وقد تحمل وتُدحرج من غير أن تفيق، فانظر إلى قدرة الله يا قارئ العزيز.

أما الصوم عند السناجب فهو من نوع الصيام القصير، ورغم أن السناجب Sciurus حيوان مرهف الحس إلا أنه يسكن فترة. فد ذكر أن السناجب تنام في أعشاشها وتبقى فيها يومين أو ثلاثة أيام إذا كان الطقس عاصفاً أو ماطرًا، ولكنها لا تقضي الشتاء كله نائمة كالقناخذ إلا في المناطق الشديدة البرودة، إذ ذاك يكون صيامها من النوع الطويل.

ومن جهة أخرى يمكن القول إن الخفافيش (طيور الليل) من الحيوانات التي تصوم طويلاً، وهذه الخفافيش تعيش في كل أنحاء العالم، وهي تقتات بالحشرات بالدرجة الأولى ومنها ما يعيش على الثمار . كما ذكرنا من قبل . ولعل أشهرها هو الخفاش النموذجي المعروف بالببسترا (من خفافيش بريطانيا)، ومن طعام هذه الخفافيش الذباب والبعوض والخنافس الصغيرة التي تلتقطها وهي طائرة في الفضاء . أما الشيء الذي يثير الدهشة في هذه الخفافيش فهو أنها تنام نومها الشتوي الطويل . بسبب انعدام الحشرات





القرطان للهندسة تحت الحيوانات/سيمات طبيعية

تلتصقها بسطح الصخر ثم تستقر فوقها وتحرسها بحذر وشراسة، و تهاجم كل من يقترب منها، وتبقى في هذا الوضع ثلاثة أشهر بلاطعام إلى أن يفقس البيض وتموت الأنثى عادة بعد ذلك.

ومن الكائنات الحية الصوامة يمكن أن نذكر السرطانات Crabs وهي حيوانات ذات أصداف صلبة تسمي بالحيوانات القشرية (القشريات) ومن أنواع هذه السرطانات ما يعرف بـ السرطانات المدارية التي تعيش على الشواطئ الرملية أو الموحلة، وهي كائنات تحفر لها سراديب في الرمال ولا تخرج للأكلا إلا عند انخفاض المد.

وإذا أعينا النظر في كائنات عالم الحيوان أيضاً لوجدنا حيوانات أخرى تقوم بالصيام في بعض أطوار حياتها، وخير مثال على هذا خنفساء Beetle تعرف بالخنفساء التمرية Tiger Beetle وهي خنفساء مُفترسة للحشرات. وهذه الخنفساء الطريفة بما عليها من ترقيط، تضع بيضها في ثقب تحت الأرض، ثم تعتمد يرقاتها

الحيوانات ماعدا مجموعة المفصليات التي لها أنواع أكثر. وهناك أمثلة أخرى من الكائنات الحية من مجموعة الرخويات تسكن أو تسبت أو بمعنى آخر تصوم فترة من الزمان، وخير مثال على ذلك الحلزون (Helix) الشبيه بالبزاق (Limax) العريان إلا أنه يحمل على ظهره غلافاً صدهياً يستطيع أن يختفي فيه تماماً. وهذا الغلاف الصدهي مصنوع من كلس إضافة إلى مواد أخرى قرنية، وهو يكبر كلما كبرت الحلزونة؛ وفي الشتاء يختفي الحلزون في أصدافه ويغطي فتحتها بغطاء من مادة لزجة وكلس ثم يسكن أو يسبت . وفي الربيع يبلل الحلزون هذا الغطاء من الداخل إلى أن ينحل، ثم يخرج. ولا يحب البزاق العريان ولا الحلزون الطقس الجاف والشمس الحارة، ويختبئ في النهار في شقوق أو تحت أوراق بالية حيث الرطوبة، ويخرج في الليل بحثاً عن طعام، ويخرج أيضاً بعد زخة من المطر، فالدم لا يسري في أجسامها بسهولة ما لم تتسرب الرطوبة إليه. وفي فترات الجفاف الطويلة، حيث لا تتسرب الرطوبة إلى أجسام البزاق العريان والحلزون تعجز هذه الرخويات عن القيام بنشاط، وتختفي في أصدافها أو تحت غطاء رطب وتهدأ كأنها على وشك أن تنام نوماً طويلاً.

كذلك إذا تأملنا حياة الأخطبوط Octopus، وهو حيوان من الرخويات أيضاً؛ لأن له جسماً رخوياً ولكنه ليس محصوراً في صدفة صلبة كالمحارات والحلزون. فصدفة هذا الحيوان تختلف عن أصداف الحيوانات السابقة؛ لأنه موجودة داخل جسمه وليس مغلفاً بها، ثم إن له أذرعاً متعدد متشعبة في رأسه بدلاً من القدم، وهو حيوان ليس بطيء الحركة بل حيوان صائد نشيط وسريع السباحة، كما أن الكثير منه كبير الحجم جداً؛ إذا تأملناه لرأينا ما يدعو إلى الاستغراب والدهشة، فأنثى هذا الكائن الحي تضع بيضها عادة في غشاء رخوي في شق بين الصخور،

وعموماً فإن الفراشات لا ترى في فصل الشتاء. كذلك؛ فإن في عالم النحل والزنابير أسراراً وأنغازاً وأعاجيب تثير فضولنا في معرفة كل شيء عنها وعن حياتها، فمن المعروف أن مربى النحل يقوم في فصل الشتاء بتأمين الطعام للنحلات في الخلايا. أما نحلات الخلايا البرية فتعمت باستثناء الملكات التي تقضي الشتاء في سبات أو بمعنى أصح في حالة صيام. وتعيش الزنابير أيضاً في مجموعات منظمة على شكل مجموعات النحل إلى حد بعيد؛ ففي الربيع تبدأ ملكة الزنابير التي كانت في سبات في فصل الشتاء ببناء عش لها في شجرة مجوفة أو وكر في ضفة تمضع قطعاً صغيرة من الخشب



الفنار النواقة أشبه بالصناعات ويستمر بنائها الشتوي
سبعة أشهر

لتصنع نوعاً من ورق تبني به قرصاً له خلايا لوضع البيض، ثم تضع بيضها وتعمل لبعض الوقت بجهد كبير لتأمين الطعام لليرقات التي تفقس. وفي يونيو/ حزيران تكون اليرقات الأولى قد

حين تفقس إلى حفر ثقوب تبقى فيها متربصة إلى أن تمر حشرة فتشب وتقبض عليها بفيكيها الحادين وتجبرها إلى جحرها وحين يحل فصل الشتاء تختم اليرقات الثقوب وتنام حتى الربيع. تابنا أيضاً بحثنا واستقصاءنا عن الكائنات الحية التي تصوم في إبان حياتها لألفينا كائنات عجيبة أخرى، حياتها فيها الكثير من الأسرار والغرائب، وما عالم الفراش والعث عنا ببعيد. فالكثرة الغالبة من الفراشات والعثات تقضي الشتاء على شكل بيض أو أساريع أو زيزان، ولو أن القليل منها. كالفراشة الصفراء. يقضي الشتاء نائمًا في مكان آمن صائمًا عن الغذاء والشراب. وكذلك تفعل الأساريع أيضاً، فهي تختفي بين النبات أو الأعشاب ولا تتحرك ولا تأكل قبل قدوم الربيع. وأكثرها يقضي الشتاء كزيران مطمورة، في الغالب، تحت التراب، أو في الأوراق والأوساخ على الأرض. ثم إن بعضها يطير إلى البلدان الدافئة في الخريف ولا يعود إلى البلدان الباردة إلا حين يأتي فصل الصيف.

جافة تؤلولوية. هي من الكائنات التي تدل على عظمة خلق الله وقدرته. فهذه الأحياء تسبت أو تسكن وتنام في الأرض خلال فصل الشتاء عادة، وتتوالد بعد توالد الضفادع العادية بأسابيع قليلة. وتضع إنثاه بيضها خيوطاً رخوية طويلة تلفها جذوع النباتات المائية. أما

نمت وأصبحت عاملات، فتواصل بناء العش وتأمين الغذاء بحيث ينحصر عمل الملكة عند ذاك بوضع البيض. وفي نهاية الصيف تطير الذكور والملكات الصغيرات وتتزوج وبحلول فصل البرد تموت الذكور والعاملات والملكات الكبيرة بسبب الرطوبة والبرودة إلا أن عدداً ضئيلاً من الملكات



الحلزون يحمل على ظهره غلافاً صلباً يحمي فيه في فصل الشتاء

الضفادع العادية فهي الأخرى كائنات غريبة في حياتها، فنحو منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول يأخذ الطقس بالبرودة. وفي هذا الوقت تدفن الضفادع العادية نفسها في الوحل في قاع البركة، وتشتي (تسبت)، أي أنها تبقى كذلك سابتة، أو نائمة، أو صائمة إلى أن ينصرم

الصغيرة ينجو بسببته خلال فصل الشتاء ليعود إلى بناء الأعشاش الجديدة مع حلول فصل الربيع. وإذا ما انتقلنا إلى الضفادع تلك الكائنات العجيبة الخلقة لعرفنا شيئاً من معيشتها وأسرارها من حياتها؛ ولعل الضفادع البرية - التي تختلف عن الضفادع العادية في أن لها جلوداً

الثابتة في عالم الحيوان، وسماك السلمون يبدأ حياته في المياه العذبة، إذ تضع إناثه بيوضها في سراديب غير عميقة تشققها بأكتافها في أرضيات مفروشة بالحصى في جداول سريعة الجريان. وتستغرق البيضة الواحدة التي تكون بحجم حبة البازلاء من خمسة أسابيع إلى خمسة أشهر لتفقس، وتكون السمكات الجديدة دقيقة وشفافة في البداية لكنها تنمو وتتخذ شكل السلمون الصغير بسرعة، ويكون جسمها مخططاً بخطوط سوداء، وتظل في الأنهار مدة ستين وتتغذى بالفريسة والحشرات المائية إلى أن يبدأ لونها بالتحول إلى لون فضي جميل، عند ذلك تصبح على استعداد لمباشرة رحلتها في النهر انتقلاً إلى البحر.

ويبقى السلمون في البحر سنة أو أكثر أحياناً، ويتغذى غذاء ممتازاً ويصبح مصقولاً أملس وقوياً ذا لحم أحمر جامد. وبعد ذلك، في فصل الخريف عادة يبدأ رحلة العودة إلى النهر الذي فقس فيه، وقد يكون على هذه الأسماك أن تشب وثبات هائلة فوق الشلالات والسدود الصغيرة قبل أن تصل إلى المياه الهادئة في أعلى النهر. وفي الكثير من الأمكنة أنشئت لسماك السلمون ممرات خاصة لتمكينه من مواصلة صعوده في النهر. وحين يصل إلى المكان الذي كان يعيش فيه من قبل في النهر، يضع سمك السلمون بيضه. وفي الربيع التالي يبدأ رحلة ثانية طويلة عائداً إلى البحر. إلا أنه، وقد قل غذاؤه في المياه العذبة يصاب بهزال شديد ويموت القسم الأكبر منه في الطريق الطويلة التي سلكها، وهو في حالة صيام. أما ما يصل منه إلى البحر حيناً فيبدأ بالتغذي، وسرعان ما يستعيد لونه الزاهي ويسمن ويقوى من جديد. وهكذا؛ فإن الأمر الذي يثير الجدل في حياة سمك السلمون هو صبره الكبير على الجوع خلال رحلته الشاقة الطويلة التي قد تصل لمئات بل آلاف الكيلومترات ولعدة شهور معتمداً في

الشتاء. وفي نهاية شهر فبراير/ شباط، حين يأخذ الطقس بالدفء، تخرج الضفادع من سباتها وتنتقل إلى برك تتوالد فيها وهناك تضع الإناث بيضها كتلاً رخوية.

وعلى هذا؛ فإن حياة معظم الكائنات غريبة وعجيبة، ومن يطلع ويلج في عالمها سيعرف الكثير الكثير من الأسرار والألغاز عن تصرفاتها وطباعها، وسيستنتج في نهاية المطاف أن الله هو الخالق الواحد القادر على كل شيء.

ومن جهة أخرى ففي عالم الأنهار والبحار والمحيطات كائنات حية تصوم أيضاً تذهل عقولنا وتحير ألباننا في طباعها وعاداتها ومعيشتها، والأمثلة في هذا لا تعد ولا تحصى، خذ مثلاً السمك المعروف بالسمك اللؤلؤي، فهذه الأحياء تقضي شتاءها ساكنة نائمة على اليابسة تحت الحجارة أو جذوع الأشجار. وفي فصل الربيع تذهب إلى البرك للتوالد.

أما أسماك الأسقمري؛ فإنها من الأحياء التي تصوم أو لا تصوم خلال فترات حياتها. ففي خلال فصل وضع البيض لا تأكل هذه الأسماك غير القليل، أو أنها قد لا تأكل شيئاً أبداً، ولذلك تكون شديدة الجوع في فصل الصيف. وهذا هو سبب سهولة صيدها بالطعم المعدني العازل؛ لأنها تكون آنذاك على استعداد لالتهام أي شيء يشبه الطعام.

ولعل سمك السلمون (سَمَكُ سَلْمَان) Salmon من بين الأسماك الأكثر شهرة؛ لأنه طعام مهم، ولأن صيده رياضة مثيرة أيضاً. وهو من الكائنات التي تنتقل وتهاجر من المياه العذبة إلى المياه المالحة (من الأنهار إلى البحار) دون أن يتضرر أو يتأثر من هذه الهجرة؛ لأنه استطاع أن يكيف نفسه للحياة في البحار والأنهار على حد سواء. وسمكة السلمون تقوم بهذه الرحلة الطويلة الممتعة مرة واحدة في حياتها وتموت بعد أن تلقي بكميات من البيض، وهي عادة من عادات الهجرة



هذا على ما يختزنه من دهن في جسمه من أجل الغذاء، ثم تكييفه الغريب وتأقلمه العجيب للحياة في المياه البحرية فترة والمياه العذبة فترة أخرى، وهكذا لمرات متكررة ذهاباً وإياباً، وهذا في واقع الأمر قدرة إلهية خارقة منحها الله لهذه الكائنات العجيبة التي يضرب المثل في صيامها وصبرها على الجوع من بين سائر المخلوقات. ويقوم سمك الأنقليس (إنقليس) *Anguilla Vul-garis* بهجرة مشابهة لهجرة سمك السلمون من المياه العذبة إلى المياه المالحة أيضاً وبالعكس، ويمكن مشاهدة الملايين من أسماك الأنقليس الصغيرة في أثناء عودتها إلى المياه العذبة بين شهري يناير/ كانون الثاني، ومايو/ أيار، عند مصاب الأنهار في أوروبا وشمال أفريقيا. وعندما تنمو صغار الأنقليس، تختزن في جسمها من الغذاء ما يكفيها لرحلتها الشاقة الطويلة، إلى حيث تضع بيضها في المياه المالحة، وحين يكتمل نمو السمكة، في العام السادس عند الذكر والثامن عند الأنثى، يتغير لونها الزيتوني الداكن إلى اللون الرمادي الناصع، الذي يماثل بيئة المياه المالحة، كما يتغير لون البطن المصفر إلى اللون الأبيض، وكذلك تتسع العينان وتبرزان قليلاً .. وبذلك يكتسب الأنقليس صفات الأسماك البحرية، وتنمو أعضاء التناسل نمواً كبيراً، ويضمهر الجهاز الهضمي مما يدل على حلول موسم الصوم الذي تقوم به معظم الأسماك قبل وضع البيض، وتتم هذه التطورات خلال أربعة أشهر. ثم يتجه السمك بعدها نحو البحر، لا يعوقه عائق مهما كان عن بلوغ غايته، أما إذا حبل بينه وبين البحر، بوسائل صناعية أو طبيعية فلا تنضج فيه أعضاء التناسل، بل تبقى ضامرة مهما بلغت الأسماك من العمر. ويقوم الأنقليس عادة بهذه الرحلة إلى البحر في الليل المظلمة، وفي الجو الرطب الحار، ولله في خلقه شؤون.

والشيء الذي يلفت أنظارنا ويبهير عقولنا هو تلك الفترات الطويلة من الصيام التي تمر بها

هذه الأسماك دون أن تدنو من غذاء، وكذلك تلك المسافات الطويلة الصعبة التي تقطعها بحثاً عن أماكن تضع فيها بيضها أو مواضع تؤوي بها صغارها بعيداً عن أعين الأعداء، وهي في كل ذلك إبان نشاطها وتكاثرها وسفرها الشاق المتعب صائمة، وبتنقلها من مياه عذبة إلى مالحة ومن مياه مالحة إلى مياه عذبة ... محروسة بعناية خالق قدير وإله عظيم. ومن المعلوم أيضاً أن عجول البحر - التي مر ذكرها قبل قليل - هي من أعظم الحيوانات المهاجرة ... فعجل البحر الذكر يترك مقره الشتوي في اليابان في منتصف شهر أبريل (نيسان) ويتجه نحو شمال المحيط الهادئ، وفي شهر مايو (أيار)، يزحف بجسمه الضخم الذي يزن ٦٠٠ رطل على سواحل المحيط الحرجية، ويظل بها لا يتركها في انتظار وصول الأنثى في منتصف شهر يونيو (حزيران) أي قبل أن تضع صغارها بأيام. وتلد الأنثى عادة عجلاً واحداً .. وفي الحال يحيط كل ذكر بعدد منها ويقوم على حمايتها وحماية المنطقة التي يمتلكها، وتظل هذه الحيوانات ثلاثة أشهر من دون طعام وهذا بمشيئة الله وقدرته. وأخيراً وفي شهر أغسطس (آب) تترك الذكور حريمها، وبذلك تسمح للصغار بالحركة بحرية تامة على الشواطئ. وبعد أن تكون الأنثى قد حملت، ولكنها لا تضع صغارها إلا في العام التالي. وفي شهر ديسمبر تترك عجول البحر كلها الأنثى والصغار، الشواطئ وتعود إلى موطنها الأصلي .. وإلى هذا الحد نقول ليس كل ذلك الذي حصل في حياة هذه الكائنات وما رأيانه من طباعها وعاداتها وسلوكها المعيشي دليلاً قوياً وشاهداً حياً على قدرة الله في خلقه وروعه وعظمته في بديع صنعه !!

ومن الجدير ذكره أن هناك أيضاً أنواعاً من الثعابين المشهورة بصيامها، خذ مثلاً على ذلك تلك الأفعى الهندية المعروفة بـ (حية الصخر الهندية). فهذا الكائن دون عنه علماء الحيوان

الحيوانات الموجودة في كل مكان، وتعيش في أنحاء متفرقة من العالم. وتختفي هذه العظاية وتنام خلال فصل الشتاء بين أكتوبر (تشرين الأول) ومارس (آذار). ثم تبدأ بالظهور ثانية حين تطل شمس الربيع. ولابد لها في البداية من أن تبقى بعض الوقت ورأسها في الشمس لتدفئة دماغها لأنها لا تستطيع أن تتحرك بسرعة قبل ذلك ومن ثم يمكن للطير أن يختطفها. وإذا كان النهار دافئاً خرجت العظاية واستحمت بالشمس على جدار أو صخر أو ضفة لكنها تعود إلى وكرها ليلاً. وفي اليوم التالي تطل برأسها ثانية للتدفئة لكنها لا تخرج إذا كان النهار بارداً. وما إن يصبح الطقس دافئاً في أواخر أبريل (نيسان) أو في مايو (أيار) حتى تتزاوج العظايا. وفي هذا الوقت تنهمك العظايا كلها بالصطياد الذباب والنمل والأساريع حتى الجنادب وأم أربع وأربعين. وتولد هذه الكائنات في فصل الصيف.

فيأخذ بعد كل الذي ذكرناه عن الصيام عند الكائنات الحية الذي هو في واقع الأمر حقيقة مؤكدة، يمكن القول إن عالم الحيوان يعج بأعداد كبيرة من الأحياء التي قد تصوم لسبب ما في كل عام من حياتها، وما أوردناه هنا في مقالنا ما هو إلا أمثلة رائعة من هذا العالم العجيب الغريب الدال على عظمة الله وقدرته. لكن من الشائع بشكل عام أن في عالم الأحياء نوعين من الصيام هما: الصيام الشتوي كالصيام الذي تقوم به الضفادع والمحارات وعجول البحر وبعض القوارض والذئبة القطبية والخنفساء النمرية والخفافيش الأكلة الحشرات والسماك العُلجمي والقنافذ والغضير وبعض الأفاعي، وكائنات أخرى.... والصيام الصيفي كالصيام الذي يفعله الليمور وأسماك الأسقمري وأسماك الرنكة *Chupea harengus* وغيرها من الأحياء على سبيل الذكر. رغم أن عدداً من الحيوانات لا نعرف مقدارها، ربما يكون صيامه في غير هاتين

ملاحظات كثيرة، منها أن ثعباناً من هذا النوع فقس في إحدى حدائق الحيوان عام ١٩٥١م. وأخذ العلماء يقيسونه سنوياً فلاحظوا أنه نما بسرعة عجيبة خلال السنوات السبع الأولى حتى بلغ عشر أقدام ثم أخذ ينمو ببطء بعد ذلك، أي أن نسبة الطول انخفضت بعد سبعة أعوام عنها في السنين الأولى. وبعملية حسابية استطاع العلماء أن يصلوا إلى سن ثعبان كبير بلغ طوله ١٧ قدماً فوجدوا أن سنه بلغ ٣٤ عاماً، وقد قال العالم هرندون داوولنج المسؤول عن قسم الزواحف في حديقة حيوان برونكس بنيويورك: إنه إذا استمر نمو الثعبان الذكر من هذا النوع بعد سبعة أو عشرة أعوام من فقسه، فإنه يبلغ عشرين قدماً بعد مضي عشرين سنة، أما الأنثى فتصل إلى الطول نفسه بعد مضي خمس وعشرين سنة: لأنها ترفض الطعام ولا تقبله من وقت التزاوج حتى يحين الوقت الذي تتخلّى فيه عن حراسة البيض، فتصوم ستة أشهر كاملة، بينما ينتظم الذكر على التغذية خلال هذه المدة فيزيد طوله على الأنثى خمس أقدام خلال عشرين سنة ويزيد عليها في الوزن.

وإضافة إلى ما ذكرنا من كائنات حية تقوم بالصيام، يمكن أن نذكر أيضاً حيوانات تعرف بالعظائيات *lizards* فهذه الكائنات زحافات كالحيات والتماسيح والسلاحف البرية، والقسم الأكبر منها يعيش في البلدان الحارة. وهي من الحيوانات التي تسميها بذوات «الدم البارد» أي أن أجسامها لا تحتفظ بحرارة واحدة أو متقاربة طوال الوقت كأجسامنا، بل تتغير بالنسبة إلى الحرارة المحيطة بها، وهكذا فإنّ العظايا لا توجد في البلدان ذات البرودة القصوى. وفي بلدان كبريطانيا مثلاً فإن هذه الأحياء تسبت في الشتاء أي أنها تدفن نفسها وتنام خلال فصل الشتاء صامتة. وعلى هذا فإن مثل هذه الكائنات تعد من الأحياء ذات الصيام الطويل الأمد. أما العظاية العادية فهي من

طوالاً يتوقف عددها . طبعاً . على كثير من الظروف والأحوال: مثل بنيانه الموروث ومدى إجهاده في الحمل والسير ودرجة حرارة الجو ونسبة الرطوبة فيه، ونوع الغذاء الذي تقتاته الإبل له أهمية خاصة في ذلك. فهي إن كانت تُلعم نباتاً طرياً غزياً بعد أمطار الشتاء

الفترتين في كل عام من حياة الحيوان ولا مجال لذكر شواهد على ما تقول.

ومن ناحية ثانية يمكن أن نذكر أيضاً أن هناك كائنات حية قد تصوم عن الغذاء أو الماء فترة من الزمن دون أن تنأذى حياتها ومعيشتها أو تتأثر أجسامها، وما الكائنات العجيبة الخلق المعروفة بسفن الصحراء (وهي الإبل) ببعيدة عن أذهاننا، وإن قدرة الجمل على تحمل العطش (الصيام عن الماء) تجعله حيواناً لا مثيل له بين الأحياء، إذ يمكن الاستفادة منه عند محاولة استغلال الأراضي الجدياء القاحلة حيث لا يوجد في ما بين الحيوانات الثديية حيوان يستطيع أن يحاكيه في هذه الخاصية. ومن المعروف أن المكان وسن الجمل وخصيلته ودرجة الحرارة والمناخ والغذاء... وغير ذلك له تأثير في احتياج الجمل من الماء. وقد تبين أن الجمال الصومالية تشرب الماء مرة واحدة في فترة تراوح بين ثلاثة وسبعة أيام، وقد سُجِّل أيضاً أنه في خلال الأشهر الستة أو السبعة الباردة في الصحراء وُجد أن الجمال لا تشرب الماء إطلاقاً، وتعتمد اعتماداً كلياً على الغذاء الذي يقدم لها وما يحتويه هذا الغذاء من ماء. وقد وجد نتيجة الأبحاث أن الجمال التي اعتمدت في تغذيتها على الأعلاف الجافة وبقيت من دون ماء لمدة (١٧) يوماً قد ضعفت بشكل كبير، ولكنها حافظت على حالتها الصحية. كما توصل العلماء إلى أن الجمال يمكن أن تبقى من دون ماء بحدود (١٤) يوماً حتى ١٧ يوماً، وفي أستراليا قطعت جمال محملة مسافة ٤٥ كيلو متراً يومياً طوال ثمانية أيام بلا ماء. وفي بلاد الصومال قطعت قافلة من الجمال مسير ستة أيام بلا ماء وفي الأراضي الحارة الجافة في شمال أستراليا قطعت قافلة من الجمال مسافة (٨٦٤) كيلو متراً في ٣٤ يوماً دون ماء. وقد مات الكثير من جمال القافلة في الطريق وسلم القليل منها برعي الأعشاب المبللة بالندى. وقد تبين أن الجمل أيضاً يستطيع أن يتحمل العطش أياماً



أسماء الرنكليات في القرآن

استطاعت أن تصبر على العطش شهرين متتاليين، بل ربما أعرضت عن الماء إغراضاً حين تورد إليه، وذلك لأن الماء الذي كان في طعامها الرطب فيه الغناء. أما إذا كان غذاء الإبل جافاً يابساً فإنها قد تتحمل قسوة الظمأ في هجير الصيف أسبوعين كاملين أو أكثر ولكن آثار هذا

١٠٩

الجمال طعاماً. وقد ذكر الكثير من بدو الصحراء العربية أن الإبل تصبر - بل تصوم - على الغذاء أياماً متواصلة وإن كانوا لم يحددوا عددها. ومن المعروف أن كل أنواع الحيوان تحتزن ما يفيض على حاجتها العاجلة مما تطعم وتهضم في صورة مدخرة من الغذاء غير قابلة للذوبان إلا عند الحاجة إليها، وقد يحتزن الغذاء في صورة غليكوجين (نشاحسيواني) glycogen أو دهن. والدهن هو أفضل الأغذية المدخرة؛ لأنه أكثر صور المواد العضوية المولدة للطاقة تركيزاً. ومعظم الدهن يختزنه الجمال في سنامه (أو سناميه) فإذا ما طال السفر وزاد العناء وشح الغذاء، أو حتى انعدم تماماً لجأ الجمال إلى دهنه المختزن فأخذ يحرقه شيئاً فشيئاً وسنامه يزوي يوماً فيوماً حتى يميل على جنبه ثم يصبح كيساً خاوياً متهدلاً من الجلد. إذا طال بالجمال المسافر المنهك الجوع. ولهذا فلا عجب أن يدل حال السنام على صحته أو مرضه في عرف الأطباء البيطريين، وقد علل بعض العلماء صبر الإبل على الجوع وصيامها الطويل عن الغذاء بـكبير الجهاز الهضمي وضخامته، وهو سبب من أسباب صبر الإبل على الجوع، فكبير هذا الجهاز يؤدي إلى بقاء الغذاء فيه فترة زمنية أطول. ويهيئ فرصة كبيرة للكائنات الحية الدقيقة الموجودة في الكرش للقيام بعملية هضم السلولوز Cellulose وهو المكون الرئيس في غذاء الإبل. كما أن الغذاء المكون من ألياف سلولوزية بطيئة الهضم يتطلب هضمه وقتاً طويلاً في الجهاز الهضمي قبل أن يطرح من قبل الحيوان. كذلك فإن غذاء الإبل - عموماً - خشن على الأغلب. ويتألف من الألياف والأشواك القاسية والحادة كـأشواك بعض الشجيرات الرعوية، وهذه المواد تبقى من دون تقطيت لغياب الورقية (في كرش الجمال)، ولهذا فإنه يُشك بوجود مواد ذات فعالية كيميائية مهمة تساهم في عملية هضم الغذاء عند الجمال ذاته. وهكذا فإن الجمال حيوان بارع

العلش الشديد سوف تصيبها بالهزال حتى إنها قد تفقد نحو ربع وزن أجسامها في ذلك الزمن القصير. أما صبر الإبل على الجوع أو صيامها عن الغذاء ففيه أسرار وأسرار: فالجمال تمتاز بقدرتها الكبيرة على تخزين كميات كبيرة من الدهن الاحتياطي (تصل إلى نحو ١٠٠ كغ أو



أكثر). وبخاصة في سنامه. يستخدمها الحيوان في حال نقص الغذاء والماء، وهذه الناحية عناية إلهية كبرى أخرى لهذه المخلوقات. وعلى هذا فإن الجمال الذي يتغذى تغذية جيدة تكون حديثه (سنامه) ثابتة صلبة، غير أنها تتراهل وتنخفض من جهة واحدة إذا مرت بضعة أيام لم يأكل فيها

إلخ. وكذلك بعض الحيوانات الأخرى كالقطط والأرانب، والهمسترات، أما الحيوانات الأخرى وبخاصة الشرسة منها . كالتمور والفهود مثلاً . التي توضع في الأسر وتنتقل بعدها إلى حدائق الحيوانات فلها، وضع آخر فهي الأخرى إن لم يهدأ من روعها وتكيف وتؤقلم بالتدريج على موطنها الجديد وبيئتها الغربية الثانية، وكذلك إذ لم تعط هذه الحيوانات الأمان الكامل ويضفى عليها من الحب والعناية والإطعام بشكل كامل، فإنها قد تبقى أياماً بلا غذاء وشراب (تصوم أياماً)، وربما تنفق في نهاية المطاف من شدة حزنها وكربها على تركها موطنها، ووضعها في المأسر الجديد والبيئة التي هي غير بيئتها الأصلية التي اعتادت عليها .

وبعد: تلکم أمثلة عن الصيام في عالم الحيوان وأنواعه وأنماطه عرضت في أسلوب قريب من الذهن والعقل ولدينا المزيد، ولكن أعتقد أن ذلك يكفي لكل من يرغب معرفة شيء من عجائب عالم الحيوان، وكل من يريد أن يستفيد ويفيد، وذلك هو مبلغ علمنا وفهمنا، فإذا إن المعنى الحقيقي للصيام عند الكائنات الحية يقصر عقلاً عن إدراك طبيعته وماهيته، ولم ولن نفهم . نحن البشر . إلى اليوم جميع جوانبه، وقد عرفنا بعض أسرارها ومعناها وأغازه ومغزاه، ولكنها بحاجة إلى الكثير من الوقت والاطلاع من أجل فهم ومعرفة أشياء أخرى عن أسرارها وخفاياها وغاياتها الفيزيولوجية، والحكمة الإلهية من كل ذلك!!

فانظر . أخي القارئ . كم هي عظيمة قدرة الله، وكم في عالم المخلوقات من أسرار وغرائب وأشياء محيرة، وكم نحن قاصرون عن إدراك وفهم ومعرفة طبيعة وسر كل شيء في هذا الكون دق أو كبر ؟...

وأتركك الآن وفي كل آن مرة أخرى للتفكير والتدبر في يدع صنع الله القادر على كل شيء وفي خلقه وعظمته جلت قدرته .

تماماً . من بين سائر المخلوقات . في تفننه في صيامه، وصبره على الجوع أو العطش بطرائق شتى تبعاً لظروفه المختلفة المعيشية والحياتية المتباينة والمختلفة، وهذا . في حد ذاته . إعجاز إلهي كبير وسر من أسرار خلق الله أودع في هذا الحيوان دون غيره من الكائنات .

وأخيراً، بقيت ملاحظات من الواجب الإشارة إليها في مقالنا عن الصيام في عالم الحيوان، هو أن بعض الحيوانات قد تصوم لفترة من الزمن إذا أصيبت بحمى أو بمرض ما . وهنا يخطر على بالنا مباشرة حيوانات كالخيول والأبقار . على سبيل المثال . من جملة الحيوانات التي قد تصوم كلياً أو جزئياً أياماً أحياناً إذا أصيبت بعلة من العلل أو بحمى كما أن بعض الأحياء تعزف . كلياً أو جزئياً . عن الغذاء والشراب، أو بمعنى آخر تصوم . صوماً كاملاً أو ناقصاً . في دورة الشبق (الدورة النزوية) Estrous Cycle أو الدورة التناسلية التي تأتي إنثى الحيوانات في فصل من فصول السنة، وهي تتباين وتختلف من حيوان لآخر في حدوثها وتكررها، وهي حالة فيزيولوجية تناسلية تشترك فيها معظم الكائنات الحية، ناهيك عما يعتري هذه الأحياء في هذه الفترة بالذات من قلق وهياج وحركة عصبية وأفعال غضب وإثارة وتلهف وشوق للقاء الذكر إبان هذا الوقت . وهذه حكمة إلهية . ونذكر من هذه الحيوانات الأبقار والأفراس والنوق والأرانب ... وغيرها من الأحياء . وإضافة لهذا فقد تصوم ذكور الحيوانات أيضاً في فترة هياجها الجنسي وشبقها وتلهفها للأنثى من أجل السفاد، وكذلك في حال إثارتها وإغضاها . أياماً .. كذلك: فإن الحيوان قد يصوم أياماً عن الغذاء والماء إذا أزجع وأقلق وأثير أو انتاب حياته ما يكدر صفوها، كأن يوضع في قفص من أجل الزينة، وهذا ينطبق على بعض الطيور الجميلة والمفردة والبهنات ... وكذلك الطيور المقترسة اللاحمة كالصقور والنسور ...

المصادر:

- ٢٧٢، دار الهلال جمهورية مصر العربية، رجب ١٣٩٣هـ، أغسطس ١٩٧٣م.
- ٥، حلمي محمد، عبد الحافظ، العلوم البيولوجية في خدمة تفسير القرآن الكريم منهاج وتطبيق، مجلة عالم الفكر - المجلد الثاني عشر - العدد الرابع، يناير/فبراير، مارس - الكويت، ص ٩٣، ١٠٤، ١٩٨٤م.
- ٦، ماضي، لورنس وماتني مارجرني: الحواس في الإنسان والحيوان - ترجمة: الدكتور ثابت هصيجي نشر بالاشتراك مع مؤسسة فرانكفون للطباعة والنشر، بيروت، نيويورك، المؤسسة الوطنية للطباعة والنشر، بيروت ص ٢٢٧، ٢٢٨، ١٩٦٦م.
- ٧، زين الدين، حسين فرج: في عالم الحيوان (الأسماك الغضروفية)، دار الفكر العربي، القاهرة، ص ٥٢، ٥٧، د. ت.
- ٨، زين الدين، حسين فرج: في عالم الحيوان (الأسماك العظمية وأسماك الزينة)، دار الفكر العربي، القاهرة، ص ١٤٨، د. ت.
- ٩، البشعان، منير مصطفي: اقتطف وفن البقاء عن النفس، مجلة الفيصل، المملكة العربية السعودية، العدد ٢٤١، رجب ١٤١٧هـ، نوفمبر/ديسمبر ١٩٩٦م، ص ١٨١٢، ١٩٩٦م.
- ١٠، البشعان، منير مصطفي: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت (١) مجلة الخفجي شركة الزيت العربية المحدودة، مكتب الإعلام، المملكة العربية السعودية، السنة الخامسة والعشرون، العدد الحادي عشر، ص ٢٧، مايو/أيار ١٩٩٦م، ذو الحجة ١٤١٦هـ.
- ١١، البشعان، منير مصطفي: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت (٢) مجلة الخفجي، شركة الزيت العربية المحدودة، مكتب الإعلام، المملكة العربية السعودية، السنة السادسة والعشرون، العدد الثالث، ص ٥٠، ٥٦، ربيع الآخر ١٤١٧هـ، أغسطس/سبتمبر ١٩٩٦م.
- ١٢، موسوعة الحيوان: دار فنية للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق - مؤسسة جوزيف د. الرخيدي للطباعة والنشر، بيروت لبنان، د. ت.
- ١٣ - البعلبكي، منير: المورد (قاموس إنجليزي - عربي)، الطبعة التاسعة عشرة، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ١٩٨٥م.
- ١٤ - معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية (إنجليزي - عربي، مع مسرد عربي - إنجليزي) إعداد: أحمد شفيق الخفج، نواة المادة العربية في المعجم هي من وضع وتحقيق الأمير مصطفي الشهابي، الطبعة الثانية، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان ١٩٨٢م.
- ١٥ - معجم اللغة العربية: المعجم الوسيط، الطبعة الثالثة، القاهرة، ١٩٩٣م.
- ١٦، مجلس وزراء الصحة العرب، اتحاد الأطباء العرب، منظمة الصحة العالمية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، المعجم الطبي الموحد (إنجليزي - عربي، فرنسي)، الطبعة الثالثة (مترجمة ومنقحة)، ميدلفاينت، سويسرا ١٩٨٣م.

- 1- The Hamlyn children's Animal World Encyclopedia in Colour, Thirteenth Impression, The Hamlyn Publishing Group Limited London, New York, Sydney, Toronto, 1981.
- 2- Brun, D.M: The Complete Encyclopedia of The Animal World, First Published, Octopus Books Limited, London. Produced by: Mandarin Publishers Limited, Hong Kong, 1980.
- 3- Dorland's Illustrated Medical Dictionary, Twenty fifth Edition, W. B. Saunders Company, Philadelphia, London, Toronto, 1976.
- 4- Blow, c: World of Colour Animal Encyclopedia, First Published, Octopus Books Limited, London, 1980.
- 5- Wood, G.J.: The Guinness Book of Animal Facts and Feats, Second Edition, Guinness Superlatives Limited, Published in Great Britain 1976.
- 6- Attmore, S: Animal Encyclopaedia, Checkerboard Press, New York 1989.
- 7- Schmidt - Nielsen, K: Animal Physiology- Adaptation and Environment, Cambridge University Press, London, 1975.
- 8- Rathove, G.S: Camels and their Management, First Printed, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi, 1986.
- 9- Wilson, R.T: The Camel, Second Impression, Longman Group UK Limited, London and New York, 1988.
- 10 - Bond, C. E: Biology of Fishes, W. B. Saunders Company Philadelphia, London, Toronto, 1979.

المراجع العربية:

- ١، بركون، مورييس: الموسوعة العلمية الحديثة (٦). الحيوانات، الجزء الأول، الأهلية للنشر والتوزيع (رسوم إدوارد أوزموند)، بيروت، ١٩٨١م.
- ٢، بركون، مورييس: الموسوعة العلمية الحديثة (٧). الحيوانات، الجزء الثاني، الأهلية للنشر والتوزيع (رسوم شيلاهولينز، اسميه إيف، أنابولين)، بيروت، ١٩٨١م.
- ٣، الحلواني، وأصل: الصوم وأثره في الصحة والوقاية والعلاج، تقديم الأستاذ علي المنطاطي، والطبيب محمد سالم منشورات الرواد (مؤسسة للتأليف والترجمة والنشر)، ص (١٢، ١٤)، د. ت.
- ٤، تكل، ميشيل: رحلة في عالم الحيوان والطير (كتاب الهلال)، العدد

نجاح إطلاق أول أقمار الأرصاد الجوية الأوروبية الجديدة

سليمان قيس القرطاس



للاتصالات الفضائية (يوتلسات).
أما القمر الثاني فهو أول أقمار الجيل
الجديد من الأقمار الصناعية الأوروبية للأرصاد
الجوية ذات المدار المتزامن.
القمر الجديد الذي أطلق عليه اسم MSG-1
أكمل المناورات المدارية وبلغ المدار المتزامن
باستخدام نظام الدفع فيه.
وفي نهاية شهر سبتمبر ٢٠٠٢م تم نقل
مسؤولية التحكم في القمر الصناعي إلى المنظمة

تم بنجاح في ليلة ٢٨.٢٩ أغسطس ٢٠٠٢م
إطلاق الصاروخ الأوروبي العملاق آريان-٥ من
مركز كورو الفضائي في غيانا الفرنسية.
وحمل هذا الصاروخ قمرين صناعيين تم
إرسالهما إلى المدار العابر إلى المدار المتزامن، أول
هذين القمرين وأكبرهما حجماً هو قمر الاتصالات
الأوروبي أتلانتك بيرد ١، الذي يزن حوالي ٢٧٠٠
كيلوجرام وهو مزود بـ ٢٤ متلقياً مستجيباً وصنع
من قبل شركة أنيا سبيزو لحساب المنظمة الأوروبية



القمر الصناعي السابق وهو ميتيوسات ٧. لكن القمر الجديد يبلغ حجمه مرتين ونصف حجم القمر السابق فالقمر الجديد يبلغ ارتفاعه ٣,٢٢ متر وقطره ٣,٧٤ متر، ويزن طنين ما يقرب نصفها هو وزن الوقود الدافع المطلوب لإيصال القمر الصناعي إلى مداره النهائي والمحافظة على وضعه واستقراره في المدار خلال عمره الافتراضي البالغ ٧ سنوات. ويذكر أن هذا القمر الصناعي كان من المقرر

الأوربية لاستثمار أقمار الأرصاد الجوية المعروفة اختصاراً باسم EUMETSAT التي ستتولى إجراء عمليات الفحص للأنظمة والأجهزة العلمية في المدار قبل تشغيل القمر الصناعي بصورة عملية. ويستقر القمر الجديد حالياً في الموقع المداري على ارتفاع ٣٦٠٠٠ كيلومتر متعامد على خط الاستواء وعلى خط طول ١٠,٥ درجة غرباً لحين اكتمال الفحص المداري ليتم عند ذلك انتقاله إلى الموقع المداري الثابت عند خط طول صفر مع



إطلاق صواريخ أيرbus (Ariane 5) من مركز الفضاء الأوروبي (ESA) في فرنسا

للأرصاد الجوية ذات المدار المتزامن المعروف اختصاراً باسم ميتيوسات إلى عام ١٩٧٧م عندما أطلق أول قمر صناعي من هذا النوع أطلق عليه اسم ميتيوسات-١. ومن عام ١٩٧٧م إلى عام ١٩٩٧م أطلقت سبعة أقمار صناعية من نوع ميتيوسات كان آخرها ميتيوسات-٧ الذي أطلق في ٢ سبتمبر ١٩٩٧م.

إطلاقه في نهاية عام ٢٠٠٠م إلا أن عملية الإطلاق قد تم تأجيلها بسبب مشكلات رافقت عملية تطوير أنظمة معالجة الصور في المحطة الأرضية الرئيسة في دارمشتات (ألمانيا).

برنامج ميتيوسات يعود برنامج الأقمار الصناعية الأوروبية

برنامج ميتيوسات

وبدأ ذلك في أمريكا، وتم فيه تطوير الجيل الجديد من الأقمار الصناعية المتزامنة للأرصاد الجوية التي تحول فيها التصميم من النموذج الأسطواناني ذي الاستقرار الدوار إلى النموذج المستقر على المحاور الثلاثة، التي أطلق أولها في عام ١٩٩٤م بعد أن تأخرت عملية التطوير لثلاث سنوات نتيجة مشكلات تقنية في تطوير جهاز الاستشعار الرئيس.

أما اليابان فقد قررت أن تمنح عقد تصنيع الجيل الجديد من الأقمار الصناعية اليابانية للأرصاد الجوية للشركة الأمريكية ذاتها التي صنعت الجيل الجديد من أقمار الأرصاد الجوية الأمريكية. أما في أوروبا: فقد شكلت وكالة الفضاء الأوروبية ESA والمنظمة الأوروبية لاستثمار أقمار الأرصاد الجوية EU-METSAT في منتصف الثمانينات فريق عمل لوضع التصميم الأساسية للجيل الجديد للأقمار الأوروبية للأرصاد الجوية.

كان من ضمن ما درسه فريق العمل اختيار تصميم القمر الصناعي الجديد بين إبقاء التصميم الأسطواناني الشكل ذي الاستقرار الدوار أو التحول إلى تصميم القمر الصناعي المستقر على المحاور الثلاثة بالإضافة إلى الأجهزة العلمية التي يتم تركيبها في القمر الصناعي الجديد.

وأوصى فريق العمل على الإبقاء على التصميم الأسطواناني ذي الاستقرار الدوار، لإمكانية التقاط الصور في جهاز قياس الطاقة الإشعاعية بالأسلوب نفسه المستخدم في أقمار ميثيوسات في ذلك الوقت مع زيادة حجم الجهاز لتحقيق المزايا الإضافية الجديدة فيه.

وصرف فريق العمل النظر عن تطوير القمر الصناعي ليكون من النوع المستقر على المحاور الثلاثة نظراً للحاجة إلى تطوير جهاز قياس كثافة الطاقة الإشعاعية وما يتطلبه تطوير هذا الجهاز من عملية التحكم بمزايا عملية المسح، وما يتطلبه تطوير جهاز جديد

وجميع أقمار ميثيوسات هذه ذات شكل أسطواناني وذات استقرار دوار، والسطح الأسطواناني للقمر الصناعي مكسو بالخلايا الشمسية التي تمد القمر الصناعي بالطاقة الكهربائية، وكان ميثيوسات ٧. بارتفاع ٣ أمتار ويطير ٢.١ متر، وتمده الخلايا الشمسية بطاقة تصل إلى ٢٠٠ وات.

مهمة نظام ميثيوسات

الجيل الأول: وتتضمن ثلاث مهمات رئيسية هي:
- التقاط الصور: يلتقط القمر الصناعي ميثيوسات صوراً بواسطة جهاز لقياس كثافة الطاقة الإشعاعية بمدين تردينين، الأول هو المدى المرئي ويمكن من خلال صورته تمييز أبعاد بطول ٢.٥ متر على الأرض والثاني بمدى الأشعة تحت الحمراء ويمكن من خلال صورته تمييز أبعاد بطول ٥ كيلومترات.
- الاتصالات: تعمل أقمار ميثيوسات كوسيلة اتصال لنقل معلومات الأرصاد الجوية من مراكز أرصاد أومصنات بحرية في مناطق نائية.
- بث الصور الجوية المعالجة: تحمل أقمار ميثيوسات قنوات اتصال أخرى لإعادة بث الصور الجوية بعد معالجة وتصحيح الأخطاء فيها.
ويتم استقبال معلومات أقمار ميثيوسات من خلال عدد كبير من المحطات الأرضية في أوروبا وأفريقيا وآسيا والأمريكتين لكن أهم مجموعة من المحطات هي تلك الخاصة بهيئات الأرصاد الجوية في ٧٥ بلداً، والمسجلة لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التي يقع مقرها في جنيف المدينة السويسرية.
أما عند حساب المحطات لدى الجهات الأخرى فإنها تصل إلى الآلاف.

تطور الأقمار الصناعية للأرصاد الجوية في منتصف الثمانينات كان هناك اتجاه دولي لتطوير الأقمار الصناعية للأرصاد الجوية التي تستخدم المدار المتزامن.



من هذا النوع من تكلفة ومخاطرة في مجال الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى الحاجة إلى مستوى عالٍ من الاستقرار لتحقيق الجودة المطلوبة في الصور.

تصميم القمر الصناعي

القمر الصناعي MSG-1 ذو شكل أسطواني قطره ٣,٧٤ أمتار وبارتفاع ٣,٢٢ أمتار ويمكن تقسيمه إلى ثلاثة أجزاء :

أ. الجزء الأعلى، ويتكون من قاعدة رُكِب عليها هوائيات الاتصال ونقل المعلومات واستقبال إشارات التحكم والأنظمة المرتبطة بها.

ب. الجزء المركزي، ويحتوي على جهاز الاستشعار الرئيس SEVIRI.

ج. الجزء الأسفل، ويحمل أنظمة الدفع والتحكم بالوضع والمدار والأنظمة المساندة (نظام الطاقة الكهربائية والتحكم بدرجة الحرارة).

الأجهزة العلمية

١. جهاز الاستشعار الرئيس SEVIRI: ويعمل هذا الجهاز بتوجيه الضوء وتجميعه باتجاه وحدات الاستشعار، وتبدأ هذه العملية من مقراب Telescope تليه معالجة إلكترونية للإشارات التي توفرها وحدات الاستشعار ، ويمكن وصف عمل الجهاز كما يلي:

التلسكوب : أول ما يتبادر إلى ذهن عن التلسكوب أنه نظام لتركيز الضوء لكن لهذا الجزء من الجهاز يعمل على مهمة أخرى إضافة إلى تركيز الضوء، وهي عملية المسح ، فعند دخول الضوء إلى هذا الجهاز يواجه مرآة مستوية تعمل على مسح الصور المواجهة لها على شكل أشرطة أفقية بفضل دوران القمر الصناعي حول نفسه، وعند اكتمال القمر الصناعي لدورة واحدة تتحرك المرآة بحركة ميل لمسح الشريط الذي يليه من الصورة لحين اكتمال الصورة تماماً.

وعند تركيز الضوء تتولى مجموعة من


المرشحات الضوئية فرزها إلى حزم مختلفة في مدى الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء، لتتولى وحدات الاستشعار تحويل الضوء إلى إشارات كهربائية. أما وحدات الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء فهي محفوظة بدرجة حرارة منخفضة



الطهر الصناعي - خلال التجميع - القمر الصناعى

حزم في الجهاز السابق، ويمكن من خلال صورته بالطفيف المرئي تمييز أبعاد بطول كيلومتر واحد بدلاً من ٢,٥ كيلومتر بالجهاز السابق أما في الأطياف بالأشعة تحت الحمراء فيمكن تمييز أبعاد بطول ٣ كيلومترات من صورته بدلاً من ٥

جداً (١٨٨ -) من خلال دائرة تبريد .
والجهاز الجديد قادر على توفير صور لوجه الكرة الأرضية خلال فترة ١٥ دقيقة بدلاً من ٣٠ دقيقة بالنسبة للجهاز الذي يحمله ميثيوسات-٧، ويتم التقاط الصور بـ ١٢ حزمة طيفية بدلاً من ٣



رسم لبحر علم المحيطات (1) - مقدمة (1) - مقدمة (1) - مقدمة (1)

جهاز SEVIRI في رسم صورة لوجه الكرة الأرضية في إجراء قياسات للإشعاع القادم من الشمس والمنعكس.

ويدخل تركيب هذا الجهاز في هذا القمر الصناعي في إطار الأبحاث ، حيث يؤمل

كيلومترات بالجهاز السابق.

وجهاز SEVIRI يستشعر ١٢ حزمة طيفية منها أربع حزم بالمدى المرئي وثماني حزم طيفية بمدى الأشعة تحت الحمراء، توفر العديد من المعلومات منها درجة حرارة السحب وسطح الأرض كما أن هذه الحزم الطيفية حساسة للأوزون وبخار الماء وثاني أكسيد الكربون.

ويتيح استخدام هذه الحزم الطيفية للمختصين المستفيدين من معلومات هذا القمر الصناعي الحصول على معلومات تمكنهم من تحليل خواص نسب المكونات الغازية في الجو مما يسمح بوضع تصور ثلاثي الأبعاد للغلاف الجوي بالإضافة إلى الإمكانيات الحالية التي توفرها أقمار ميتيوسات.

وتوفر هذه الدقة في التصوير الطيفي إسهاماً مهماً في عملية الرصد من خلال تحسين إجراء النماذج الجوية الرقمية، أما توفير المعلومات خلال ١٥ دقيقة فإنه سيقدم معلومات أفضل للمختصين للكشف عن التغيرات المفاجئة في الطقس مثل سقوط الثلج والعواصف الرعدية والاضباب، وفي المجال نفسه تأتي الزيادة في تمييز الصور إلى دقة أكبر في رصد الظواهر الجوية المحلية التي تجعله قادراً على توقع تشكل الضباب في الموانئ، أو خطوط الملاحة، أو الطرق الرئيسية، أو تحديد السحب عالية البرودة الواعدة بسقوط الجليد، أو تحديد تأثير الانفجارات البركانية على خطوط الملاحة الجوية.

٢. GERB: وهو جهاز تم تطويره من قبل معاهد بحوث في بريطانيا وبلجيكا وإيطاليا، وتم تمويل تطويره من هذه الجهات ووافقت EUMET-SAT على أن يركب في أقمار MSG، والجهاز عبارة عن مقياس لكثافة الطاقة الإشعاعية لتحديد الفرق بين الإشعاع القادم من الشمس والإشعاع المرتد من الأرض إلى الفضاء ويؤدي دوراً مهماً في التغيرات المناخية، ويستفيد هذا الجهاز من التقنية المعتمدة في

١١٩


ولم يسبق تركيب جهاز من هذا النوع في الأقمار الصناعية ذات المدار المتزامن، بل تم تركيبه في الأقمار ذات المدار القطبي، ولم يوفر نتائج جيدة نظراً لطبيعة المدار القطبي التي تجعل من عودة القمر الصناعي لتغطية المنطقة نفسها تستغرق عدة أيام.

الأجهزة الأخرى: يحمل القمر الصناعي MSG-1 شأنه شأن الأقمار الصناعية الأوروبية السابقة للأرصاد الجوية جهاز مكرر لاسلكي لاستقبال وإعادة إرسال البيانات من محطات أرصاد جوية من بقاع نائية في المحيطات أو اليابسة، بالإضافة إلى قناة لبث الصور بعد معالجتها.

إلا أن سعة الجهاز الجديد لنقل البيانات هي ٢، ٣ ميجابت/ثانية أي بسرعة تصل إلى عشرة أضعاف الجهاز الذي يحمله القمر السابق. أما قناة بث الصور فهي بسعة ١ ميجابت/ثانية أي بسعة تصل إلى ستة أضعاف سعة الجهاز الذي يحمله القمر السابق.

كما يحمل جهازاً جديداً يعمل مع نظام كوسباس - سارسات العالمي لليحث والإنقاذ، يعمل كمكرر لاسلكي لإشارات الاستغاثة من السفن والطائرات المنكوبة والمزودة بأجهزة استغاثة تعمل وفق هذا النظام.

وضع الأقمار الصناعية الأوروبية للأرصاد الجوية حالياً بقي القمر الصناعي ميتيوسات ٧ عاملاً بمهمة القمر الرئيس في الموقع المداري على خط طول صفر. بينما بقي القمر الصناعي ميتيوسات ٦ كقمر احتياط في الموقع المداري على خط طول ٩ درجات غرباً حتى تمسك التشغيل العملي للقمر الصناعي MSG-1 في منتصف عام ٢٠٠٣م. أما القمر الصناعي ميتيوسات ٥ فيستمر في عمله لتغطية أفضل للمنطقة بين القمر الصناعي ميتيوسات ٧ والقمر الصناعي الياباني GMS-5 في الموقع المداري على خط طول ٦٣ درجة شرقاً.



استخدام هذا الجهاز في التعرف على تأثير الأمطار الاستوائية وسطح البحر وأنواع الغطاء النباتي على الإشعاع المرتد إلى الفضاء. بينما يؤمل استخدام الجهاز لأغراض عملية في القمر القادم من هذا النوع.



خزائنها السفلية من كهوف مدببة بتكوينات بديعة وتراكيب دقيقة ربما تفوق في أحيان كثيرة ما قد يناظرها من ظواهر سطحية ..
الكهوف أو المتاحف الجيولوجية السفلية .
كما يحلو لنا دائماً وصفها . تنفرد بخصائص وتكوينات نادرة استغرق تكوينها وتزيينها آلاف السنين، وهذا ما حدا بنا إلى لفت الأنظار إليها لكونها كنوزاً يتوجب صونها وعدّها جزءاً مهماً من التراث الطبيعي والبيئي.

الجبال .. هذه (الكائنات) الصخرية الشامخة التي تطل علينا بهيبته فتمنعنا الثبات والمتعة، ليست سماء مصمتة قاسية كما يعتقد الكثيرون .
الجبال .. أمكنة ورموز ومهابط للوحي ومسارح لحضارات كثيرة .. وهي أيضاً متنفسات يهرع إليها الإنسان هرباً من عناءات يومه المضني .
حتى وقت قريب .. وعلى الرغم مما نعرفه عن علاقة الإنسان الأول بالكهف، لم يتخيل الكثيرون ما يمكن أن تكنه هذه الجبال في



ما هي الكهوف؟

عرفت الكهوف منذ القدم بأنها الملاجئ والملاذات الأولى للإنسان الأول الذي كان يؤوب إلى كنفها لتقيه البرد، ولتحميه من الطوارق الليل وآفاته.. ولعل الرسوم والنقوش الفطرية التي سجلها ذلك الإنسان على جدران تلك الكهوف التي تعود إلى آلاف السنين حسب ما توصل إليه علماء الآثار أو الأحافير (الأركيولوجيا) علامة بارزة توضح علاقة الإنسان بهذا الجزء المهم من الطبيعة. والتعريف

الشائع للكهف هو أي فجوة ذات فتحة تسمح بدخول الإنسان إليها، أما التعريف العلمي فهو أي فتحة في الصخر يزيد قطرها على ٥ - ١٥ ملم.

تتكون الكهوف نتيجة ذوبان الصخور بواسطة المياه الجوفية التي تتجمع بعد سقوط الأمطار مكونة أودية وأنهاراً تعدّ النظير تحت الأرضي لما نراه على السطح من شبكات الأودية والمجاري المائية. وتتفاوت أحجام الفجوات والغرف الكهفية ويكون بعضها متصلاً بالآخر، وبعضها على هيئة

غرف منفصلة.

ولعل أبرز أمثلة الغرف الكهفية (Chamber) الكبيرة في العالم كهف خشلة مقننلي (أو ما يطلق عليه مجلس الجن) الواقع بهضبة سلمى في سلطنة عُمان حيث يبلغ حجمه نحو ٤ ملايين متر مكعب. وتوجد الكهوف عادة في صخور الحجر الجيري الذي يمثل نحو ١٥٪ من الصخور الموجودة على سطح الكرة الأرضية، تعرف المناطق ذات الصخور المتعرضة لعمليات الإذابة باسم المناطق الكارستية (Karst) وهو اسم مأخوذ من المنطقة التي تعرف حالياً بسلوفينيا (Slovenia) وكرواتيا (Croatia) وذلك لاشتهارها عالمياً بوجود عدد كبير من الكهوف بها.

حركة المياه وأثرها في ذوبان الصخور:

تبدأ عملية تكوين الكهوف بواسطة إذابة صخور الحجر الجيري بمياه الأمطار التي تتكون



شكل دائري خيمه كالتشعب من لغار الحجر





نوع عشالي لما يسمى طويلا خضاعة

تعرف هذه الأشكال علمياً باسم *Spek othems* باختصار الكهوف نواتج لعمليات تبدأ بالذوبان ثم الترسيب وتنتهي أخيراً بالتزيين.

الأشكال والتكوينات الكهفية:

على الرغم من أن تكون الكهف يتم بواسطة ذوبان الصخور، وهي مغمورة تحت مستوى سطح المياه الجوفية إلا أن مرحلة تزيينه بالهوابط والصواعد والستائر ومختلف الأشكال الأخرى لا تبدأ إلا بعد أن ينخفض مستوى هذه المياه، أي عندما يصبح الكهف فارغاً من المياه ومملوئاً بالهواء. فخلال الفترات المطيرة تتسرب مياه الأمطار وتتغلغل في الشقوق حتى تصل إلى سقف الكهف المفرغ ثم تبدأ هذه المياه في «التنقيط» قطرة قطرة من السقف وبصورة بطيئة جداً. عند تعرض القطرات

على هيئة محلول حمضي مخفف ذاب فيه ثاني أكسيد الكربون (CO_2) من الجو أو من التربة. يتغلغل هذا الماء في شقوق الصخور فيذيبها مكوناً فجوات فيما بين مفاصل الصخور.

تلي عملية الذوبان هذه عملية أخرى، لكنها عكسية، إذ ينخفض مستوى سطح المياه الجوفية ليصبح الكهف فارغاً (مملوئاً بالهواء بدلاً من الماء). في الجانب الآخر يتابع الماء سريانه وتخلله لتشققات الصخر ليصل إلى سقف الكهف الداخلي على هيئة نقط أو قطرات مائية تندى بها تلك السقوف لتبدأ بذلك عملية الترسيب أو المعروفة بعملية التزيين الطبيعية للكهوف (*Natural Decoration*) بترسيب مختلف الأشكال الكهفية كالصواعد والهوابط والستائر الكهفية والصخور المنسابة على حيطان الكهوف.



نوع شتالي لما تعرف به الكهيف على أنها النظير لث الأرضي
لما عرف على المصطلح من أوريد وجمار مائية




صورة بملصقية لأحد التراكيب الجيولوجية والنازلة بأحد
الكهيف

إلى شكل آخر سميك ومدبب Tapered. أما الصواعد فتتكون عندما تسقط قطرات الماء المتدلية من السقف إلى أرضية الكهف (فتتطرحش) وتتبعثر Splashed وتتوزع على مساحة أكبر نسبياً من تلك التي ترسبت عليها نظيراتها في السقف، وبمرور الوقت يزداد سقوط القطرات ويزداد تراكم الرواسب الجيرية، وهذا ما يؤدي في النهاية إلى تكوين تركيب تصاعدي يعرف بالصواعد Stalagmite. يحدث أحياناً أن تتقابل الصواعد والهوابط في نقطة واحدة لتكوّن معاً ما يعرف بالأعمدة Col-umns. أما إذا انسابت المياه على جدران الكهف فإن ذلك ينجم عنه ترسب المادة الجيرية على أسطح

المائية البطيئة الحركة لهواء الكهف الغني بثاني أكسيد الكربون يتم تركيز مادة الكالسايت (كربونات الكالسيوم . $CaCO_3$) فيها حيث تتركز هذه المادة الجيرية على هيئة حلقة تحيط بحواف القطرة المائية، ثم تنمو تلك الحلقة شيئاً فشيئاً فيزداد حجمها وطولها لتكوّن في النهاية ما يعرف باسم الماصة (Straw).

هذه الماصة الحجرية المصنوعة من الكالسايت كما أسلفنا تنمو مدلاة من سقف الكهف ولا يتوقف نموها الطولي إلا إذا انسدت الفتحة الأمامية بها، عندما تتسرب المياه من جدران الماصة الخارجية مما يتسبب في ازدياد سمكها، ومن ثم يتغير شكلها الأنبوبي النحيف

١٢٥



بعض التراكيب بأحد الكهوف وأعميقها الخلفيات على
توازن الحشرات بالنسبة



تركيب وأشكال جميلة ونادرة وجدت بأحد الكهوف جنوب
الجزيرة العربية

كالتراكيب الشعرية أو الخيطية التي تسمى شعيرات الجبس (Gypsum Hair)، والتراكيب الكتلية التي تنمو عليها بلورات الكالسايت المدببة والشبيهة بـ «أسنان الكلاب Dog Tooth» كما هي معروفة علمياً.

تلك الجدران وصولاً بعد ذلك إلى أرضية الكهف لتكوّن أشكالاً تعرف بالصخور الانسيابية Flow Stones في حين أن الترسبات التي تقع فيما بين السقف والجدران تعرف بالسائتر الكهفية Cur-tains، وهناك أيضاً تكوينات مهمة تنشأ بسبب احتجاز المياه وقت انسيابها سواء على جدران الكهف أو على أرضيته، وهذه التكوينات تدعى بالأحواض عادة وهي تراكيب مختلفة تتوقف نوعياتها وأشكالها على نوعية المياه ودرجة حرارتها، ولعل أبرز تلك التراكيب الجميلة والنادرة أنواع تعرف بالتراكيب الغريبة (Eccentric) وهذه عادة توجد في الكهوف الغنية جداً بالأشكال الكهفية. وهناك عدد كبير ومتنوع من تلك الأشكال

المراجع

- ١- يوسف حنا وآخرون، كهوف عمان، جامعة السلطان قابوس مسقط.
- ٢- حنان إبراهيم عبد الهادي، ١٤١٧هـ، الكهوف عالم مجهول تحت الأرض، الرياض، مجلة الوعي الإسلامي.
- ٣- الكهوف الصحراوية في السعودية، ٢٠٠٠م، مجلة عالم راسكو.

كوزمولوجيا الحياة والعقل «علم كونيّات الحياة والعقل»

تأليف: جورج والد
ترجمة: عبدالله نعمان الحاج



كون تاريخي فليست الأعضاء الحية فقط هي التي تولد وتنمو وتشيخ ومن ثم تموت، ولكن النجوم والمجرات تفعل ذلك أيضاً، وهناك سبب وجيه للاعتقاد بأن الكون يتداخل مع الحياة. الكون هو المكان الذي نشأت فيه الحياة، وقد مكن من ذلك وجود الشروط المناسبة والزمن الكافي في جعلها ممكنة، فكم هي أعداد الكون الموجودة ؟ أنا معجب بالقول المأثور عن آرثر إدينجتون

أواجه وقد وصلت إلى نهاية حياتي بوصفي عالماً، معضلتين كبيرتين لهما جذور في تاريخ العلم، وقد حاولت التعامل معهما كما يفعل أي عالم، علماً بأنني أعتقد أن كلتا المشكلتين لا تتشابهان مطلقاً. وهذا ليس غريباً؛ لأن الأولى تتعلق بعلم الكون والأخرى بالوعي (العقل)، وسوف أبدأ بشرح المعضلة الأولى (علم الكون).

المعضلة الأولى :

لقد أصبحنا ندرك منذ زمن بأننا نعيش في



ولكن الأمر أوسع من ذلك بكثير، فمجرة طريق
التبانة هي مجرد بقعة صغيرة في الكون الذي
نعرفه، وأقل التقديرات المعقولة لنسبة النجوم
التي تحتوي على كواكب قد توجد فيها فرص
وجود حياة في مجرة طريق التبانة هي نسبة ١٪
أي نحو بليون موقع فقط في مجرة طريق التبانة
وحدها. وإذا أخذنا في الحسبان أن هناك بليون
مجرة نستطيع رصدها بواسطة التلسكوب، فإن
أقل التقديرات لعدد العوالم في الكون الذي

بأن ١١ ١٠٠ (مئة بليون) نجم يكون مجرة و ١٠
١١ مجرة تصنع كوناً، فمجرتنا . طريق التبانة .
تحتوي على ١٠١١ نجماً، ففي حين أن عدد سكان
الكرة الأرضية يبلغ نحو خمسة بلايين نسمة
والكثير منا يشعرون بالضيق من الزحام، فإن
مجرة طريق التبانة تحتوي على مئة بليون نجم.
إنها شديدة الاتساع. فالضوء الذي يقطع
١٨٦٠٠٠ ميل في كل ثانية يحتاج إلى ١٠٠٠٠٠
سنة ليقطعها من طرفها إلى الطرف الآخر منها.

استبعدت النيوترونات، الذي يتفاعل بشكل ضئيل مع المادة، واستبعدت أيضاً مئات الجسيمات التي تنتج عن التفاعلات الذرية بواسطة الأجهزة ذات الطاقة العالية».

وتوجد العناصر الثلاثة الأولى، البروتون، والنيوترون، والإلكترون، ليس فقط كجسيمات بل وأيضاً كأضداد الجسيمات، فالجسيمات تحتوي على مادة وأضداد الجسيمات تحتوي على أضداد المادة. وإذا نظر أحدهما إلى أهداف بعيدة جداً في الكون فلن يستطيع التأكد ما إذا كانت مكونة من مادة أو أضداد المادة، فجميع معلوماتنا تأتي من طريق الإشعاع، والفوتونات لا تفرق بين المادة وضدها.

ولكن لماذا لدينا عالم مكون من مادة وليس من أضداد المادة؟ فقط في عام ١٩٥٢م كنت ألقى محاضرات «فانيو إكسام» في جامعة برنستون عن أصل الحياة والتطور البيولوجي الكيميائي.

سألت ألبرت أينشتاين قبل المحاضرة الأولى ونحن نسير معاً «لماذا نعتقد أن الأحماض الأمينية الطبيعية جميعها عسراء».

وكما تعرف: فإن جميع الأحماض الأمينية باستثناء أبسطها - القلايسين، توجد على شكلين هندسيين متناظرين كل منهما صورة في المرآة للآخر مثل اليد اليمنى واليد اليسرى. ولكن وجد أن جميع الأحماض الأمينية الطبيعية عسراء ؟


وأكمل أينشتاين الكلام بقوله: «لقد تساءلت لسنوات، كيف أصبح الإلكترون سالباً؟

فالسالب والموجب هما أساس التناظر المثالي في الفيزياء فلماذا كان الإلكترون سالباً ؟

كل ما استطعت التفكير فيه هو أن الإلكترون كسب الجولة «قلت له وهذا هو ما أعتقد أنه حصل للأحماض الأمينية العسراء. لقد كسبت المعركة، ولكنه كان يتحدث عن معارك أخرى -معركة بين المادة وضد المادة (أو المادة وضديدها). وكما قال هذه الأنواع من المادة هي



عند الانحجار العظيم كان من المتوقع حصول غاشقة نارية هوجاء



تداخل الكون والخيال

نعرفه تبلغ نحو بليون أو ١٠ ١٨.

وأطروحتي الأساسية هنا، هي إذا اختلفت أي من الخصائص الفيزيائية الكبيرة والتي تزداد معرفتنا بها في الكون عما هي عليه الآن، فإن الحياة والتي يبدو أنها المسيطرة سوف تكون مستحيلة سواء كان ذلك هنا أو في أي مكان آخر. وسوف أوضح العناصر الأساسية لحجتي عن طريق الصعود في سلم حالات تنظيم المادة، ولذلك سوف أبدأ من العناصر الأولية.

يتكون عالمنا في أغلب أجزائه، من أربعة أنواع من العناصر، نيوترونات، بروتونات، إلكترونات، وجزء إشعاعي وهو الفوتونات «لقد



هذا هو الشكل الذي كان يبدو عليه الكون في لحظة الانفجار العظيم، حيث كانت المادة متساوية في الكثافة.

من أرنو بنزياس وريچرت ويلسون من معامل بل للخلفية الإشعاعية ذات الموجات الدقيقة (إشعاع ميكرويفي) التي تملأ فضاء الكون والتي تصدر بشكل متساوٍ من جميع الجهات، والتي يعتقد بأنها من بقايا العاصفة النارية للانفجار العظيم. ويتطابق الإشعاع الذي يصدر عن جسم أسود مثل قطعة حديد سوداء، تحت درجة حرارة منخفضة جداً تبلغ ٢.٨ كلفن فوق الصفر المطلق، أي نحو ٢.٧ كلفن. ولهذا فنحن نعرف الآن أن هناك من الفوتونات الصادرة من الإشعاع الخلفي والتي تجوب أنحاء الكون ما يقارب بليون مرة أكثر من الجسيمات ذات الكتلة، ولهذا يجب

مثالية التناظر. ولهذا، فإن الرأي الدقيق في ماذا حدث داخل الانفجار العظيم (Big Bang) عند تكون كوننا الذي نعرفه، هو أن كمية متساوية من المادة وضدها خلقت في ذلك الوقت.

وفي المراحل الأولى من الانفجار العظيم، وعند حالة الانضغاط المهول، كان من المفترض حصول عاصفة نارية هوجاء. فعند اتصال جسيم من المادة مع نقيضه يتلاشى كلاهما وتتحوّل كتلتهما إلى إشعاع. ولهذا فعند نهاية الانفجار العظيم كان من المفترض وجود كون إشعاعي لا توجد فيه مادة أو نقيضها.

وقد جاء الإثبات عن طريق اكتشاف كل

خواص العناصر الأولية أولاً وهما: كتلتها وشحنتها الكهربائية.

تتكون نواة الذرة من بروتونات ونيوترونات، وكلاهما جسيمات ثقيلة كتلة كل منهما تعادل تقريباً ألفي مرة كتلة الإلكترون. وكنتيجة لذلك: فإن الكتلة الكلية للذرة تتركز في النواة التي تحافظ على موقعها غير عابثة بالإلكترونات التي تطوف حول محيطها.

وهذه الحقيقة مهمة جداً؛ لأنها سبب ثبات أي شيء في هذا الكون.

فماذا سوف يكون شكل الكون إذا كانت كتلة الجسيمات الذرية والإلكترونات متساوية تقريباً؟ عند ذلك سوف يؤدي تحرك أي جسيم إلى حركة متبادلة مع الجسيمات الأخرى، وسوف يدورون حول بعضهم بعضاً، وتصبح جميع المواد سائلة ولا شيء صلب، فهل تستطيع مثل هذه الذرات تشكيل روابط قوية؟ سوف لن تجد جزيئاً واحداً مكوناً للإنسان تستطيع معرفة شكله بكثير من الثقة. وهذه حقيقة مهمة جداً لأن شكل الجزيء، الطريقة التي يتصل بها مع جزيء آخر، تعني كل شيء للكائنات الحية.

لننظر الآن إلى حالة أخرى غير عادية. فعلى الرغم من أن هناك فرقاً شاسعاً بين كتلة البروتون وكتلة الإلكترون التي تبلغ نحو ١٨٤٠ مرة. فإن مقدار شحنتيهما متساو تماماً. فلماذا البروتون والإلكترون والذاتان يختلفان في كل شيء تقريباً، لديهما المقدار نفسه من الشحنة؟ هل يبدو هذا السؤال علمياً أو منطقياً؟

في عام ١٩٥٩م نشر عالمان مرموقان في مجال الفيزياء الفضائية وهما د. أ. بي لتون وهرمان بوندي، بحثاً مطولاً في «مدونات الجمعية الملكية اللندنية» اقترحا فيه أن البروتون والإلكترون يختلفان في الشحنة بمقدار لا متناه في الصغر. نحو $10 \times 10^{-18} e$ حيث e شحنة ضئيلة في كل جسيم، ولأول وهلة سوف نقول من ذا الذي يهتم بجزيء من بليون بليون جزء، ولكن

علينا أن نطور رأينا السابق لنضم إليه اختلافاً أو خطئاً طفيفاً. إذا صح القول. فلكل بليون جزء من ضد المادة كان هناك بليون واحد من المادة، عند حدوث الانفجار العظيم ونتيجة لذلك فعند استنفاد العاصفة النارية الناتجة من التلاشي المشترك وخمودها، فإن جزءاً واحداً من البليون من المادة هو كل ما تبقى. وما تبقى هو مادة كوننا، المجرات، والنجوم، والكواكب وأيضاً نحن بني الإنسان.

وهذا الخطأ الطفيف الذي يقدر بالواحد من البليون هو العنصر الأول من قصتي ونتساءل الآن كيف وجدنا أنفسنا في كون مليء بالبروتونات، والإلكترونات، وأيضاً بالنيوترونات؟ ويعود السبب في ذلك إلى أن النيوترون الحر. وهو وبروتون خارج نواة الذرة وخارج النجوم ذات الكثافة النيوترونية العالية. يتحلل بعمر يبلغ ١٠,٦ دقائق إلى إلكترون دبروتون وإشعاع. فإذا بدأت بمجموعة من النيوترونات الحرة، سوف نلاحظ بعد عشر دقائق أن نصفها مازال نيوترونات والنصف الآخر تحول إلى ما نحتاج إليه لنصنع كوناً يشبه كوننا.

لماذا يأخذ التفاعل ذلك الشكل؟ ويعود السبب في ذلك إلى أن النيوترون أثقل بنسبة طفيفة جداً من البروتون زائداً الإلكترون. ومثل هذا التفاعل يجب أن يتجه إلى إنتاج كتلة أقل. ولكن فقدان الكتلة في هذه الحالة تبلغ أقل من جزء من الألف، وبدقة أكبر هي ٨ أجزاء لكل عشرة آلاف جزء. ولكن ماذا يحدث إذا اتجه التفاعل إلى الاتجاه الآخر؟

إذا حصل ذلك فسوف يكون كوناً نيوترونياً، وتكون النيوترونات قد ابتلعت البروتونات، والإلكترونات منذ زمن طويل، ولن توجد العناصر الكيميائية، والجزيئية ولن تصدر إشعاعات جديدة، وبالطبع لن توجد حياة. اختلاف طفيف آخر ولكنه مهلك، إضافة إلى ما تقدم، فإن من الضروري الأخذ في الحسبان خاصيتين من





الفرق الشحنة (الجزء الثاني)

كافياً للتغلب تماماً على قوة الجاذبية التي تجذب المادة بعضها إلى بعض، والتي من دونها (من دون فرق الشحنات) لما وجدت المجرات، والنجوم، والكواكب. وقبل أن يجف مداد ذلك البحث، بدأ جون كينغ ومجموعته في معهد ماساشوستس للتقنية

بي تلتون وبوندي شرحاً ذلك بقولهما إن هذا الفرق المشاهي في الصغر سوف يؤدي إلى شحنة خالصة «نقية» في كل الجسيمات، وهذا يفسر وجود تناظر بين جميع المواد في الكون، وتفسر نظريتهما، أيضاً، التوسع الملحوظ في الكون. مثل هذا الفرق الضئيل في الشحنة كان



أسهل على الفهم.

❖ يعدّ الإلكترون جسيماً أساسياً لا ينقسم، في حين أن البروتون يتكون من ثلاثة كواركات، اثنين منها يدوران للأعلى وللأسفل، وهذا أيضاً غريب إلى حد ما أن تكون محصلة شحنات الكوارك تساوي تماماً شحنة الإلكترون.

روابط ثنائية. هذه الروابط المتعددة تشبع تماماً الرغبة في الاتحاد للذرات الثلاث. ولذلك، فإن ثاني أكسيد الكربون يستطيع الطفو في الهواء كجزيء سعيد حر ومن ثم يذوب في مياه الأرض، وهذه هي الأماكن التي وجدت فيها الكائنات الحية ما تحتاج إليه من كربون.

في حين أن ثاني أكسيد السليكون لا يستطيع تكوين روابط ثنائية. ولهذا؛ فإن كل ذرة سليكون ترتبط مع كل ذرة أكسجين بروابط فردية. محدثة أربعة أنصاف روابط غير مكتملة أو عدداً من الإلكترونات المفردة، اثنين من ذرة السليكون والإلكترون واحد لكل أكسجين. وهذه الإلكترونات تكون تواقعة إلى الالتحام مع أي شيء ولكن مع من؟ كل جزيء من ثاني أكسيد السليكون يرتبط مع جاره إلى أن يتكون جزيء عظيم ضخمة وهذه هي الحقيقة - الصخور.

ويكمن السبب في صعوبة تحطيم الكوارتز لأننا نحتاج إلى تحطيم الكثير من الروابط الكيميائية. ولهذا السبب؛ فإن السليكون مناسب جداً لتكوين الصخور في حين أن، الكربون مناسب جداً لتكوين الحياة العضوية. وبإستطاعة أي منا استخدام الحجج نفسها لعنصري الأكسجين والنيتروجين.

والآن لنرتفع إلى مرتبة عليا أخرى ونختبر التكوين الجزيء؛ يعد الماء أحد أهم الجزيئات للكائنات الحية من دون منازع. ولكن الماء هو الجزيء الأكثر غرابية في كل ما نعرفه من الكيمياء، والعنصر الأكثر غرابية فيه هو الطفو عندما يصبح ثلجاً. فإنا لا نرى إمكانية وجود حياة، إذا كان الثلج لا يطفو. كل شيء ينكمش بالبرودة حتى الماء إلى ٤ درجات مئوية، ولكن بين ٤ درجات ودرجة التجمد أي عند درجة الصفر، فإن الماء يتمدد بشكل سريع مما يجعل الثلج أقل كثافة من الماء السائل ولهذا يطفو.

لنفترض أن الماء يتقلص كلما برد مثل أي شيء آخر. عندئذٍ، فالماء البارد سوف يكون أثقل،

لنرتفع الآن درجة في التنظيم ونتكلم عن العناصر. من ٩٢ عنصراً الموجودة في الطبيعة تتكون ٩٩% من المواد الحية، من أربعة عناصر فقط وهي، الهيدروجين، والأكسجين، والنيتروجين، والكربون. وأنا أعتقد أن جميع أنواع الحياة الموجودة في العوالم الأخرى يجب أن تكون على هذه الصورة، لأن العناصر الأربعة تملك خصائص مميزة تؤدي دوراً خطيراً في وجود الحياة. ولا توجد أي عناصر أخرى تماثلها في الجدول الدوري للعناصر.

وعلى الرغم من أنني درست الكيمياء منذ زمن بعيد، إلا أنني أعتقد أن بعض المعلومات الغبية مازالت تدرس إلى الآن. فقد قيل لنا إننا إذا تحركنا بشكل أفقي إلى الأسفل في الجدول الدوري فإننا سنجد أن جميع تلك العناصر لها الخصائص نفسها. ولكن أي طفل يملك مجموعة مواد كيميائية يعرف أفضل من ذلك. فتحت الأكسجين يأتي عنصر الفضة، حاول أن تستشق غاز الفضة مرة؛ وتحت النيتروجين يأتي عنصر الفوسفور وهو عنصر لا يوجد في مجموعة الكيمياء الصغير، وذلك لأن عنصر الفوسفور خطر جداً فهو يتحول إلى لهب مباشرة عند ملامسته الهواء؛ وتحت عنصر الكربون يأتي عنصر السليكون، ويوجد من السليكون في القشرة الأرضية ما يقارب ١٢٠ مرة أكثر من الكربون، فلماذا خلق الإنسان من الكربون ؟

والصفة الغريبة الحاسمة في خصائص العناصر الأربعة هي أن الكربون، والنيتروجين، والأكسجين والهيدروجين هي العناصر الوحيدة التي تكون روابط ثنائية وثلاثية كيميائية حقيقية فما أهمية ذلك للحياة ؟ حسناً قارن فقط بين جزأين يجب أن يكونا متشابهين. اعتماداً على موقعهما في جدول العناصر الدوري. وهما ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد السليكون. فثاني أكسيد الكربون جزيء متناظر، حيث إن ذرة الكربون ترتبط بذرتين من الأكسجين بواسطة



لماذا تتم عملية تحول الهيدروجين إلى ديوتريوم ببطء شديد؟ نواة ذرة الهيدروجين هي ببساطة عبارة عن بروتون ذي شحنة موجبة، وحتى عند درجات حرارة نجوم التابع الرئيسية - main se- (quance stars) والتي قد تصل درجة الحرارة فيها إلى ٥ ملايين درجة مئوية، فإن اصطدام بروتون بآخر سوف ينتج عنه فقط نواتج الذرتين حول بعضهما، والحادثة النادرة التي يجب أن تحصل عند إنتاج ديوتريوم هي تحليل أحد البروتونات وتحوله إلى نيوترون يتحد مع بروتون آخر، وهذه حادثة نادرة الاحتمال.

ولكن نجوم التابع الرئيسية تُعمر طويلاً، وتستمر بشكل بطيء في تحويل مجموعات مكونة من أربع نوى هيدروجينية إلى أزواج من نوى الديوتريوم، ومن ثم تحويلها إلى نواة الهيليوم. والفقدان الطفيف لمقدار الكتلة خلال عملية التفاعل تتحول إلى إشعاع، وهي هنا أشعة الشمس التي تصلنا.

كيف تحصل على الكربون إذن؟ الجواب لأول وهلة هو الاستمرار في إضافة بروتونات. ولكن هذه الطريقة غير مجدية، وذلك لأن إضافة بروتون واحد إلى الهيليوم سوف ينتج عنها نظير خماسي الكتلة. وليس هناك نواة ذرية لها كتلة خماسية. فما الوسيلة للالتفاف حول هذا العائق؟ حسناً، البديل الوحيد هو دمج نواة الهيليوم، ولكن هذا التفاعل يتطلب درجات حرارة عالية جداً، تبلغ نحو مئة مليون درجة مئوية، ولن تصل إلى تلك الدرجة إلا عند احتضار النجم، التوهج الأعظم (red giant) وعندما تصل حرارة لب المتوهج الأعظم إلى تلك الدرجة؛ فإن نواة الهيليوم سوف تبدأ في الاندماج.

عند هذه النقطة فالمسألة أصبحت عملية حسابية بسيطة ولكن هناك عائق آخر. فعند اندماج اثنين من نوى الهيليوم، سوف نحصل على نظير البريليوم الثماني الكتلة، وهو أحد أكثر الذرات الموجودة في عدم الاستقرار. فهو يتحلل

ولذلك سوف يهبط إلى الأسفل. فتكون الثلج عندئذٍ سوف يبدأ ليس من سطح البحيرة أو المحيط بل من القاع. وفي النهاية سوف يتحول الماء إلى كتلة صلبة متجمدة وهي كارثة لجميع أنواع الحياة تحت الماء. والمشكلة الأخرى التي تنشأ إذا تجمدت كتلة المياه الضخمة؛ فإن الجزء الأكبر من الجليد لن يذوب أبداً. فالجزء الرقيق نسبياً من الجليد الذي يغطي البحيرات الآن، يذوب مع أول تباشير الربيع ودفء الجو، ويعم الفرح من جديد.

النجوم:

سوف أقفز الآن قفزة كبرى إلى النجوم ودخول النجوم في مملكة السماء هو من السهولة مثل دخول الجمل في سم الخياط وسم الخياط (عين الإبرة) هنا الخطوة الأولى لاندماج الهيدروجين في الهيليوم. وقد نقلت جريدة نيويورك تايمز كلمة قالها فيزيائي من أوكرج في وقت مشروع مانهاتن الذي أصبح فيما بعد إدارياً ومن ثم قسيساً قال: «يبدو أن الله يحب قنابل الهيدروجين وذلك لأنه خلق الكثير منها على شكل نجوم».

وكان يجب أن يكون الرجل أكثر وعياً من ذلك لكونه فيزيائياً وقسيساً وذلك لأن من الممكن صنع النجوم من الهيدروجين، ولكن ليس في الاستطاعة صنع قنبلة هيدروجينية من الهيدروجين فقط. فهي تحتاج إلى خليط من الديوتريوم والترتيوم مناصفة لصنعها، وتحويل الهيدروجين العادي إلى ديوتريوم قد يكون أبطأ تفاعل إلى الآن. فهو يحتاج إلى نحو مئة بليون سنة، وهذا هو السبب الوحيد لطول عمر النجوم، فهي ليست قنابل هيدروجينية، علماً بأنه في اللحظة التي نحصل فيها على ديوتريوم حتى النجوم، قد تنفجر، ونتيجة لذلك فإن النجوم تُعمر طويلاً. وهناك فرصة لبداية نشوء حياة في تلك التي تملك الكواكب المناسبة..

النيوتروجين . الأكسجين . ، والتي تبدأ بواسطة اندماج الكربون مع اثنين من البروتونات لإنتاج نيوتروجين . ١٤ ، ثم التقاط اثنين إضافيين من البروتونات للحصول على أكسجين . ١٦ ، ومن ثم انقسام الأكسجين إلى ذرتي هليوم وكربون . فالمحصلة النهائية لكلتا الطريقتين متساوية تماماً : أربع ذرات من الهيدروجين تحولت إلى هليوم .

فالعناصر الأربعة : الكربون ، والنيوتروجين ، والأكسجين ، والهيدروجين هي العناصر الرئيسية المكونة للحياة على الأرض ، بالإضافة إلى أنها وبالأهمية نفسها تعدّ مصدراً للطاقة التي تساعد على استمرار تلك الحياة . فهذه العناصر الأربعة إضافة إلى الهليوم هي أكثر العناصر أهمية في الكون .

وأخر عنصر كوني في قصتي هو أيضاً يساوي في غرابته ما سبق ، لكنه شرح بواسطة أحد أعظم وألع الفيزيائيين المعاصرين ألا وهو ستيفن هوكينج .

• قوى الكون :

توجد في الكون قوتان عظيمتان ، الأولى قوة التباعد والانتساع ، ويؤثر عليها تواجيع الانفجار العظيم ؛ والقوة الأخرى هي قوة جذب وربط ، وتؤثر فيها الجاذبية ، وكلتا القوتين بالغة الغرابة ، وذلك لأنهما متساويتان تماماً وفي حالة اتزان مدهش . قد نعتقد أن نسبة القوتين قد تكون شيئاً تقريبياً ولكنهما في الحقيقة متساويتان تماماً .

فتنح إذن في كون مُحير جداً ، فهو بشكل عام يزداد اتساعاً ، ولكن هناك أيضاً أماكن هنا وهناك داخل هذا الكون ، حيث الجاذبية تربط الكون بعضه ببعض ، فمثلاً مجرتنا . طريق التبانة . هي مجرد تجمع عنقودي صغير داخل مجرة أندروميديا ومجرات أخرى أصغر وداخل تجمعنا العنقودي الصغير لا أثر لتوسع الكون . وتأتي معرفتنا بتوسع الكون بالطبع من قياس الانزياحات


من ١٠ . ١٦ ثائية ومن حسن الحظ أيضاً : فإن ذرة الكربون . ١٢ عندما تكون في وضع التهيج ؛ فإنها تصدر طاقة تساوي طاقة ذرة البريليوم . ٨ مضافاً إليها ذرة الهليوم . ٤ ومضافاً إليها الطاقة الكامنة عند درجة الحرارة التي تمكن هذه الذرات من الاتحاد . هذه المصادفة الشاذة هي رنين الطاقة السعيدة التي حولت تفاعلاً غير محتمل الحدوث إلى تفاعل عالي الكفاءة ، إذن بريليوم . ٨ يندمج مع هليوم . ٤ لإنتاج كربون . ١٢ والنقطة المهمة هنا ، أن هناك . حسب رؤيتنا البشرية . الكثير من العوائق في عملية تركيب العناصر وتآليفها ، ولكن كان يتم التغلب على كل عائق بطريقة بديعة .

وعندما يتم تكوين الكربون داخل المتوهج الأعظم ، وعن طريق إضافة اثنين من البروتونات إلى ذرة كربون . ١٢ لتعطي كتلة تساوي ١٤ ، مما يدخل النيوتروجين إلى الكون ، وعند إضافة الهليوم . ٤ إلى كربون . ١٢ سوف نحصل على كتلة ١٦ مما يدخل الأكسجين إلى الكون ، وهكذا تستمر القصة إلى ما لا نهاية ، وفي النهاية سوف تصل هذه النجوم إلى مرحلة عدم الثبات ومن ثم تنفجر ، مرسلة مكوناتها إلى الفضاء لتكوّن في نهاية الأمر هذه العناصر الشمس والكواكب التي من حولنا .

لنقف لحظة ونفكر في الحياة ونشأتها ، فقد كان عليها في أي مكان بدأت فيه من هذا الكون اختراع طريقة لاستمرارها ، وهذه الطريقة يجب أن تعتمد على الطاقة التي يطلقها . يرسلها . أقرب نجم ، وكما نعرف ؛ فإن الحياة على الأرض تعتمد في استمرارها على أشعة الشمس من خلال عمليات التمثيل الضوئي ، فكيف نحصل على أشعة الشمس ؟ نحصل عليها من تفاعلات متعددة لعناصر مكونة لحياتنا نفسها ، فالطريقة الأولى هي اندماج الهيدروجين في الهليوم (سلسلة بروتون- بروتون) ؛ والأخرى هي باستخدام عمليات محفزة . ذرة الكربون .

ولكن ماذا لو أن القوتين ليستا في حالة توازن أو تعادل، وبعوضاً عن ذلك كانت قوة الجاذبية هي القوة المسيطرة؟ سوف يبدأ كوننا أيضاً بواسطة الانفجار الأعظم، ولكن الجاذبية سوف تبطل من التمدد إلى أن يصل الكون إلى حد معين، ومن ثم

دويلر للضوء الآتي من مصدر بعيد في الفضاء. وبشكل عام؛ فكلما نظرنا إلى الأبعد كان الانزياح أكثر إحمراراً كمؤشر على التوسع المستمر علماً أن أول انزياح طيفي شوهد بواسطة الفلكي الأمريكي سلفر باك عام ١٩١٢م لم يكن انزياحاً



صورة من فلكي الفضاء (١) وفلكي الفضاء (٢) والفلكي (٣)

يحدث تقلص ضخم يؤدي إلى عدم إعطاء فرصة كافية للحياة، لكي تبدأ وتتطور أو إلى تدمير سريع لها. ولكن ماذا لو كانت قوة التمدد هي القوة المسيطرة؟ سوف تندفع المادة وتتطاير ولن يحدث ترابط بينها، ومن ثم لن تتكون النجوم أو الكواكب، وأيضاً لن يكون هناك مكان للحياة بالطبع. ولحسن حظنا؛ فإن القوتين في حالة تعادل عام.

أحمر، فقد كان يراقب مجرة أندروميديا هي مجمعنا العنقودي، ولاحظ انزياحاً أزرق، وذلك لأن مجرة أندروميديا تتحرك باتجاهنا، وتقترّب منا بسرعة ١٢٥ كيلو متراً في الثانية، ولرؤية انزياح أحمر من الأرض، يجب علينا أن ننظر إلى أبعد من تجمعنا العنقودي، بعيداً حيث تبلغ مسافة نصف القطر نحو مليوني سنة ضوئية، هناك حيث كل شيء خاضع للتمدد.

كامنة في الظل. كنت منشغلاً آنذاك بأسئلة أكثر سهولة، لكن هذه المسألة ظهرت الآن إلى النور. دعوني أخبركم بما أستطيع حول هذه المسألة.

على الرغم من أنني لا أستطيع عمل أي شيء بصفتي عالماً في تحديد ما إذا كان الوعي موجوداً أم لا ؟ إلا أنني متيقن جداً عندما أتعامل مع شخص آخر بأنه يعي، وذلك لأنه يملك الكثير من الشبه بي.

لقد أجريت بحثاً على أعين المحار المروحي ذي الألوان القزحية الجميلة، الذي لديه ثمانية أعين، والتي ربما تعدّ من أكثر العيون تعقيداً من الناحية التشريحية في عالم الحيوان، وهي رائعة الجمال، ولكني لم أر أي بادرة تدل على أن المحار يستخدم عيونه. كما درست عيون ديدان جُلبت من شواطئ «نيلس» وهذه الديدان التي تعيش في البحار الدافئة، ذات عيون بارزة مدهشة، وفيها كل ما تتمناه في العين، وهنا أيضاً لا أثر يدل على أنها ترى أي شيء: لا يوجد أي رد فعل سلوكي على الضوء بتاتاً.

وعلى الرغم من أنني قد أعدّ كليتي لديه «وعي» بصفتي عالماً، لا أستطيع عمل أي شيء لأدعم مثل هذا الافتراض وأرفعه إلى مرتبة الإثبات. وماذا عن باب الكراخ : هل يتمتع الباب لفتحه عندما أرسل إليه الإشارة ؟ بالطبع كلا !!! هل يشعر الكمبيوتر بالفخر والكبرياء لهزيمة لاعب شطرنج بشري في لعبة الشطرنج، وأيضاً لا أعتقد ذلك.

ولكن حتى هنا لا أستطيع أن أعمل أي شيء للحصول على إثباتات لأجوبيتي تلك. فالوعي لا يعطينا أي إشارة لوجوده مطلقاً، ولذلك فلنتجاوز عن معرفة ماهيته ؟ وهذه هي المشكلة.

والآن، ولأن الوعي لا يعطي أي دليل أو إشارة، فهو يحرج العلماء، وعلماء الأحياء بشكل خاص. فقد وُضع علماء الأحياء في موقف محرج بسبب هذا الموضوع، لأنهم يعتقدون. وأنا منهم.

دعوني الآن أخصّص المعضلة الأولى : وجدنا أنفسنا في كون خصب، وحياة غنية ولكن الطريقة الوحيدة لإمكانية ذلك هو أن يكون كوناً فريداً جداً.

يستطيع أي عبثري واسع الخيال أن يحلم بأكثر من كون بديل، وقد يكون كل منها جميلاً وملائماً، ولكنه سوف يكون كوناً بلا حياة.

كوننا الحي هو كون مميز جداً، وكلما تعمقنا في معرفة طبيعته (فيزياته) أدركنا كيف تم توازنه، وكيف نسجت خيوطه المعقدة كما لو أنها خلقت لإنشاء حياة.

والحقيقة أن هناك الكثير من العوائق والمشكلات قد حلت بدقة تبدو غريبة جداً. وبالطبع ومن وجهة نظرنا الذاتية كانت هذه الحلول تمثل أفضل الطرق لخلق الكون. ولكن ما أريد معرفته كيف وعى الكون بذلك ؟ وهذا يأخذني إلى معضلتي الثانية ألا وهي «الوعي».

المعضلة الثانية. مشكلة الوعي :

لم يكن بإمكانني غض الطرف عن مشكلة الوعي (العقل)، وذلك لأنني أمضيت حياتي العلمية أعمل في مجال البصر (الرؤية). لقد تدرّبت في مجال عملي على شبكية عين الضفدع. وإذا ما فحصت كل ما يمكن دراسته في شبكية عين الضفدع وقارنتها بشبكية عين الإنسان، فسوف تلاحظ أنهما متشابهتان بشكل مدهش.

ولكن أنا أعرف بأنني أبصر فهل يعرف الضفدع أنه يبصر ؟ هو يتأثر بالضوء ولكن باب الكراخ يُفتح أيضاً متأثراً بالكهرباء الضوئية. هل الضفدع يعرف أنه يتأثر ؟ هل هو يعي ذاته ؟ ليس في مقدوري بصفتي عالماً عمل أي شيء للإجابة عن مثل هذه الأسئلة. لاشي على الإطلاق.

ولذلك وخلال الوقت الذي اشتغلت فيه على عيون شتى أنواع الحيوانات، كانت هذه المشكلة

والعلم في عالم عام، ولهذا فالوعي لا يستطيع الدخول إلى عالم العلم، وبإمكاننا نسيانه. ولكن المشكلة أنه إذا لم يوجد الوعي، فلن يوجد علم ولن يوجد واقع، فهو ليس ظاهرة مشكوكاً فيها ونحن نستطنها على الواقع.

بأن الوعي صفة مميزة للكائن الحي الراقي، ولهذا فيجب أن يعرفوا شيئاً عنه، وإن باستطاعتهم شرح جزء ولو يسير منه على الأقل للعلماء الآخرين. ولكن ليس لديهم أي شيء يقولونه. وهو أمر بالغ الحرج لهم. وقد يكون



صورة التقطت من الفضاء بواسطة تلسكوب هابل الفضائي

ولكنها في القواعد في الأسس. والآن أريد أن أسأل سؤالاً غريباً، إذا كان الوعي غير قابل للتحديد ولا يعطينا أي إشارات أو دلائل فآين يوجد؟

لقد كان لجراح الدماغ المشهور وايلدر بن فيلد من جامعة ماغيل من مونتريال فرصة رائعة وفريدة من نوعها لدراسة دماغ مكشوف لمريض غير مخدر. علماً أن المريض المكشوف الدماغ لا

المخرج الوحيد لهم من ذلك هو التصريح بأن لا وجود لشيء اسمه «وعي»، وكمثال على ذلك فعندما قال ب. د بليو، بريدج: إن الوعي عبارة عن طريقة الكلام. كان يؤمن بأن أي شيء حقيقي يجب أن يكون له تعريف عملي، وليس هناك عمليات تحدد الوعي.

وفي الموضوع نفسه، وضع عالم النفس السلوكي ب. ف. سكينز، الوعي في عالم خاص،

١٣٩

وهذا الجزء من المخ هو مركز الإثارة ولبعض الوقت كان المهتمون يظنون بأن هذا هو مركز «الوعي». وبالنسبة؛ فإن التشكيل المعقد يقع أسفل جذع المخ ويأتي تحته في الجهاز العصبي الحبل الشوكي.

يشعر بالألم، وقد قال لي وايلدر في إحدى المناسبات، عند كشف الدماغ يستطيع أن يعمل العملية بملعقة. كان وايلدر يستكشف دماغ الإنسان لأغراض علاجية ودائماً لمصلحة المريض، ولكن وضمن



الجزء من المخ (الأسفل) عبارة عن غلاف شبيهة من التشكيل

والمشكلة في كل ما تقدم من فرضيات أنها تشبه إخراج ترانزستور واحد من جهاز التلفزيون، ومن ثم تقول: «إن هذا الترانزستور هو مصدر البرنامج، لأن البرنامج توقف عند إخراجه»، ولكن في الواقع فإن العمليات تحتاج إلى الكثير من الآلات ومن الصعب معرفة ما إذا كنت تتعامل مع آلات متعددة أو أنك تتعامل مع المصدر الأساسي، ولكن المشكلة أعمق من مجرد أن لدينا مصاعب

عدة أشياء، كان يبحث عن مركز الوعي. وفي خلال إحدى مناقشاتي معه، سألته لماذا يظن أن الوعي يقع في الدماغ؟ ضحك وقال «سوف أظل أحاول» وبعد عدة سنوات قابلته مرة أخرى وقال «سوف أقول لك شيئاً واحداً.. الوعي ليس موجوداً في قشرة المخ».

وبعد زمن لاحق أصبح الكثيرون مهتمين بالتشكيل المعقد الموجود في جذع مخ الثدييات.

جنوب الأطلسي قريبة من جزيرة برمودا. وهي مناطق تعدّ الأعماق والأكثر ملوحة في المحيط. وفي هذه المناطق التي يهاجر إليها سمك الأنقليس، يضع بيضه على أعماق كبيرة أو بعيدة، ومن ثم تموت جميعها ولكن يرقاتها تعود وحدها إلى مواطنها النهرية. يأخذ سمك الأنقليس الأمريكي نحو ١٥ شهراً للوصول إلى سواحلنا، ومن ثم الصعود إلى الأنهار في حين أن سمك الأنقليس الأوروبي يحتاج إلى ثلاث سنوات للوصول إلى موطنه، وإلى الآن لم تسجل أي حالة تشوش لتلك الأسماك وأنها أضاعت مواطنها واتجهت إلى المكان الخطأ». أخبرني بوهر بهذه القصة، ومن ثم أضاف شيئاً رائعاً: «لأنها فقط لا تعرف إلى أين تتجه، تفعلها دائماً بشكل مثالي كامل».

وكما ترون الآن، فأنا أشعر الآن بأن تراكم معرفتنا العلمية سواء كان ذلك حركة الجزيئات الأولية أو تصرف سمك الأنقليس، يقودنا دون جدال إلى الرأي القائل بوجود عقل كلي يتداخل وغير منفصل عن مادة الكون.

قد تبدو هذه الفكرة من الجنون بمكان، ولكن هذه الفكرة لا يبلغ عمرها أكثر من ألف عام وظهّرت في الفلسفات الشرقية فقط، ولكنها ظهرت أيضاً ولمرات كثيرة بين جيل عظماء الفيزياء في النصف الأول من هذا القرن (العشرين).

فقد قال أدنجتون في عام ١٩٢٨م: «مادة العالم هي مادة العقل، مادة العقل لا تنتشر في الفضاء أو في الزمن، وهي شيء ليس بإمكان العلم معرفته... أخذاً في الحسبان أن العالم المادي هو عالم تجريدي كلي، وأن حقيقته غير مرتبطة بالوعي، فإننا نعيد الوعي إلى موقعه الأساسي» كان أدنجتون فيزيائياً مرموقاً في زمنه.

وقد قال فون فايز ساكر عن افتراضية التطابق التي دعا إليها، والتي كان يعتقد بأنها

هي إيجاد مركز الوعي. كيف يمكننا الحديث عن موقع شيء لا نعرف له إشارات مادية محددة؟ هذا غير معقول. الوعي لا موقع له. خطر لي قبل عدة سنوات أن تلك العضلاتين، الكون. ونشوء الحياة بواسطة التغلب على المعوقات عن طريق الكثير من الحيل الخاصة. والوعي الذي لا مكان له بالإمكان جمعهما معاً، وفي الوقت ذاته الذي كنت فخوراً بنفسي كنت أيضاً خجلاً منها.

كنت خجلاً لأن الفكرة بدت غريبة لي بوصفي عالماً، ولكني كنت فخوراً لأنني تعلمت. بصفتي باحثاً تجريبياً. أنه إذا أعطتك التجربة نتائج مبهرة، فعليك الاستمتاع بها. فإله وحده يعلم ما إذا كانت مثل هذه النتائج سوف تحدث مرة أخرى. ولكن وبعد عدة أسابيع اكتشفت أنني بصحبة أفضل رفيق. ولكن ماذا كانت تلك الفكرة؟ كنت أعتقد في السابق بأن فكرة الوعي أو العقل شيء يحتاج إلى جهاز عصبي مركزي معقد خاص، ويوجد فقط في الكائنات الحية الراقية، وفكرتي الحالية أن العقل كان موجوداً دائماً والسبب في ذلك أن هذا هو كون نشأت الحياة فيه، فكان لا بد من وجود عقل مدير وشامل لقيادته في طريق الحياة.

وفي إحدى المرات كنت أتحدث مع «بوهر» ولدهشتي حكى لي قصة حياة سمك الأنقليس، التي قد تساعد على توضيح ما أحاول شرحه. كان والد بوهر - كريستن بوهر - عالماً ممتازاً في علم وظائف الأعضاء، وكان لدى بوهر شغف كبير بعلم الأحياء، قال: «يوجد ما يسمى بسمك الأنقليس النهري الذي يعيش وينمو بين ٥ إلى ١٥ سنة في مياه الأنهار، ولكن عندما يصل إلى سن النضوج الجنسي يغادر النهر ويهاجر إلى المحيط عند هذا العمر تتوقف الأسماك عن الأكل تماماً. وهناك نوعان من الأسماك في المحيط الأطلسي، هذا الذي يأتي من السواحل الأوروبية والآخر الذي يأتي من السواحل الأمريكية، ويهاجر كلا النوعين إلى مناطق في

ما يسمى بالاختيار الطبيعي. وتضم هذه التركيبة ثلاثة عناصر:

الإنتاج المتواصل للتغيرات، بشقيه الإيجابي والسلبي؛ وميكانيكية الوراثة، وأخيراً عنصر التنافس.

ونتيجة لذلك؛ فإن الانحراف الذي يثبت أنه الأفضل هو الذي يستمر، والانحراف «أو التغير» الذي يكون أقل جودة يهمل. يجب أن توجد مخلوقات أخرى تشبهنا في أماكن كثيرة من هذا الكون، وأنا لا أعني هنا أنهم يشبهوننا تماماً. فالمخلوقات التي عاشت في الأرض في السابق، تختلف عما هي عليه الآن، وما أعنيه أنهم يشبهوننا في إنتاج الفنون والعلوم والتقنية، وقد يكونون متفوقين علينا، ومن الممكن أيضاً أنهم تجاوزونا بمراحل. ومن ثم، فماذا يعني ملايين من السنين في عمر الكون؟ تمثل تلك المخلوقات تنشئ مجتمعات، وتختار لغات، وطرق كتابة لهذه اللغات التي تشكل بدورها آلية الإرث الثقافي. هذه المخلوقات تؤسس ثقافات بدورها تمون بشكل مستمر الاختلافات، الإيجابية والسلبية، ومع وجود المكتبات وأنظمة التعليم، فليس من الضروري لكل جيل أن يبدأ من نقطة الصفر الثقافية التي تختص به. كما أن هناك تنافساً بين الثقافات، بعضها يصعد ويلعب ومن ثم يحتضر على الرغم من أن مظاهر كثيرة في هذه الثقافات تستمر لأنها أثبتت جدواها.

ولهذا نحن لدينا نوع جديد من الاختيار الطبيعي وآلية جديدة للتطور لاستبعاد، ولكنها تضيق إلى التطور الفسيولوجي والتشريحي، وهذه المرحلة الجديدة للتطور تضم الآن بطريقة ما تطوراً منفصلاً لفكرة الوعي.


فالمأمول من الوصول إلى فكرة العقل الكلي الأزلي، هو أن يعطي لنوعنا قيمة متعالية وسمواً يدلنا على موقعنا في هذا الكون. ألا وهو أن نعرف، وأن نبذل، وأن نحاول أن نفهم. فنحن الوحيدون الذين يستطيعون ذلك تحت شمسنا.

التفسير الأعلى والفريد لنظرية الكوانتم، قال: «إن الوعي والمادة مظهران مختلفان لواقع واحد». ولكن الاقتباس الذي أفضله هو ما قاله د. باولي ولفجانج: «بالنسبة إلينا فالرأي الوحيد الذي يبدو أنه يأخذ في الحسبان جانبي الواقع - الكمي والتوحيدي، المادي والعقلي، هو أنهما منسجمان مع بعضهما، وبالإمكان تقبلهما معاً في آن واحد. ومن الأفضل عدّ الطبيعة والعقل (أي المادة والعقل) مظهرين متكاملين لواقع واحد».

وعلى الرغم من أن طبيعة العقل هذه تخرج علماء الأحياء إلا أن من السهولة مخاطبة الفيزيائيين بذلك؛ لأنهم يميلون إلى التعامل مع العقل بشكل يومي.

كان علماء القرن التاسع عشر يعزفون على وتر فكرة أن بالإمكان مراقبة العالم الخارجي دون التأثير فيه. كان ذلك عالماً موضوعياً جداً. غير ذاتي. بمعنى أن بالإمكان عمل التجربة دون التأثير أو الدخول في العالم الخاص المراد مراقبته ولكن لب الفيزياء الحديثة هو التحقق من عدم فصل الذات عن التجربة، أي أن كل الرصد العلمي في الحقيقة، هو في النهاية ذاتي. غير موضوعي. وهناك مثال بسيط على دخول الوعي في التجارب الفيزيائية، فعند إجراء أي تجربة فيزيائية تتعلق بالإشعاع أو بالجسيمات الأولية للمادة، يجب أن نقرر منذ البداية أيًا من الخصائص نريد معرفته. الخصائص الموجبة أو الخصائص الجسيمية. فإذا أجريت التجربة الموجبة، فإنك تحصل على أجوبة لها علاقة بالخصائص الموجبة، وإذا أجريت التجربة الجسيمية فإننا نحصل على أجوبة لها علاقة بالخصائص الجسيمية. ولا نستطيع الحصول على الجوابين معاً في تجربة واحدة.

أنا أعتقد أننا نعيش في عالم المصادفة. فبغير المصادفة لا وجود للظواهر. وليس في عالم الحدث، فالكون له تركيبة عجيبة. طبقاً لتشارلز داروين، بأن المحرك الأساسي للتطور هو



من الشبكة العنكبوتية

جديد العلوم



الحواسيب القديمة خطر على البيئة

سيارة أو حيوان وحيد القرن،
وأوضح أحد معدي الدراسة أن صناعة المعالجات
الصغيرة من الأسباب التي تؤدي إلى هذا الفارق
بسبب وزنها الخفيف جداً موازنة مع كمية الطاقة
والمواد الكيميائية الضخمة الضرورية لصناعتها.
واعتمدت ١٢ دولة غالبيتها من القارة الأوروبية
قانوناً ينص على فرض إعادة معالجة الحواسيب، في
حين شدد واضعو الدراسة على أن الولايات المتحدة -
أكبر منتج ومستهلك للحواسيب الشخصية- لم تبدأ
في دراسة إمكانية وضع أطر ملائمة لعملية إعادة
المعالجة، والتخلص من الأجهزة القديمة لتجنب
حصول تلوث من بعض مكوناتها

دعت دراسة أصدرتها الأمم المتحدة مؤخراً
الحكومات إلى اتخاذ إجراءات تسمح بإعادة معالجة
الحواسيب القديمة بسبب التأثير السيء للمكونات
المستخدمة في هذه الأجهزة على البيئة.
وأوضح الباحثون الذين أعدوا الدراسة أن إنتاج
حاسوب زنته ٢٤ كجم يتطلب كمية من الوقود والمواد
الكيميائية أكبر بعشر مرات على الأقل من وزنه.
ورأى الباحثون أن إنتاج حاسوب وشاشته يحتاج
إلى ٢٤٠ كجم على الأقل من الوقود و٢٢ كجم من
المواد الكيميائية و١,٥ طن من المياه أي ما يوازي وزن

إيكسميستين، حيث عاد المرض في غضون ثلاث سنوات عند ثلاث نساء فقط من بين كل ١٠٠ سيدة استعملت العقار.

أما المرضى اللائي تم إعطاؤهن عقار تاموكسيفين فعاد المرض في غضون ثلاث سنوات عند ١٣٪ من كل ١٠٠ سيدة منهن. وقال جوديث بليس من مركز أبحاث السرطان بالمملكة المتحدة: "على الرغم من أن عودة سرطان الثدي تقل بالفضل عند المرضى الذين يستخدمون عقار تاموكسيفين، إلا أن نتائج الدراسة أوضحت أن التحول إلى عقار إيكسميستين يمكن أن يقلل فرص عودة المرض إلى الثلث".

كما وجد الأطباء أيضا أن استعمال عقار إيكسميستين يقلص أيضا من تطور السرطان في الثدي الآخر أو في الرحم.

وقال البروفيسور تشارلز كومبس من جامعة إمبيريال كوليدج بلندن والذي قاد فريق البحث في الدراسة: "تقل فرص إصابة السيدات اللائي يتناولن عقار إيكسميستين بالسرطان في الثدي الآخر، وهو ما يدل على أن أخذ العقار بعد فترة من أخذ عقار تاموكسيفين يعد السبيل الأفضل لمنع سرطان الثدي".

وقال الأطباء إن التحول إلى عقار إيكسميستين قد يساعد على تجنب هذه المشكلات المحتملة.

غير أنهم أكدوا على ضرورة إجراء مزيد من الأبحاث في المستقبل لتحديد الوقت الذي ينبغي أن تتحول في السيدة من عقار تاموكسيفين إلى إيكسميستين، فضلا عن الحاجة إلى بحث الأعراض الجانبية طويلة المدى.

وقال البروفيسور روبرت سوهامي مدير قسم الشؤون العيادية والخارجية في معهد أبحاث السرطان: "في الوقت الذي تعد فيه هذه الأنباء طيبة، من الهام أن نتذكر أن تلك النتائج تظهر فقط ما يحدث على المدى القصير. ومن الضروري أن نواصل دراسة العقار للتأكد من أنه لا يعرض المرضى لأي مخاطر غير متوقعة في المستقبل".

عقار يقهر سرطان الثدي

أفادت دراسة جديدة أن كثيرا من النساء اللائي يتلقين علاجاً لمرض سرطان الثدي قد يستقدن من عقار جديد.

يذكر أن معظم السيدات المصابات بسرطان الثدي يأخذن عقارا يدعى "تاموكسيفين" لنحو خمس سنوات بهدف الحد من مخاطر عودة المرض من جديد.

غير أن دراسة تم إجراؤها على ٤٧٤٢ سيدة أوضحت أن تلقي هؤلاء السيدات لعقار آخر يدعى "إيكسميستين" بعد عامين أو ثلاثة أعوام قد يحول دون عودة المرض من جديد.

وقال الأطباء الذين نشرت دراستهم في دورية "نيو إنجلاند جورنال" أن العقار الجديد يقلص فرص عودة المرض إلى الثلث.

ويفضل كثير من السيدات اللائي أصبن بمرض سرطان الثدي استخدام عقار تاموكسيفين، حيث أوضحت الدراسات أن بإمكانه تقليص فرص عودة المرض بنحو ٤٧٪، كما يقلص مخاطر الوفاة بنحو ٢٦٪. غير أن بعض السيدات تكون لديهن مقاومة للعقار، بينما عانى البعض الآخر من أعراض جانبية خطيرة.

وقد ركزت الدراسة التي تضمنت سيدات من ٢٧ دولة فيما إذا كان التحول إلى عقار إيكسميستين قد يفيد هؤلاء المرضى أم لا.

يذكر أن عقار إيكسميستين مسموح به في المملكة المتحدة غير أنه يقتصر على السيدات اللائي يعانين من مراحل متقدمة من سرطان الثدي ولن تجدي معهن الجراحة.

وقد تم إعطاء النساء المشاركات في الدراسة عقار تاموكسيفين لنحو عامين أو ثلاثة أعوام.

وقام العلماء بتقسيم السيدات المشاركات في الدراسة إلى مجموعتين، الأولى استمرت في أخذ عقار تاموكسيفين أما الأخرى فتم إعطاؤها عقار إيكسميستين.

وتوصل الأطباء إلى أن نسبة عودة المرض كانت أقل عند النساء اللائي تم إعطاؤهن عقار

مسعد أحمد شتيوي

- ❖ من مواليد محافظة الدقهلية . مصر ١٩٥١م.
- ❖ حاصل على بكالوريوس العلوم الزراعية من كلية الزراعة جامعة أسيوط ١٩٧٢م، والمجستير من الكلية نفسها عام ١٩٨٠م.
- ❖ سافر في بعثة للدراسة في الولايات المتحدة يناير ١٩٨٣م، وحصل على دكتوراه الفلسفة في علوم الحيوان من جامعة ولاية نيومكسيكو الأمريكية عام ١٩٨٨م.
- ❖ شارك في أعمال الترجمة للموسوعة العربية العالمية.
- ❖ كتب الكثير من المقالات العلمية في المجالات المصرية والعربية المرموقة.

إبراهيم بن عبدالرحمن الهدلق

- ❖ من مواليد مدينة شقراء . السعودية ١٣٧٩هـ.
- ❖ حاصل على بكالوريوس التربية في الآداب من كلية التربية جامعة الملك سعود ١٤٠٣-١٤٠٤هـ.
- ❖ ماجستير من الكلية نفسها في الإدارة عام ١٤١٢هـ.
- ❖ التحق بالعمل بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية عام ١٤٠٤هـ.
- ❖ له عدد من المقالات المنشورة في المجالات السعودية.

عبدالعزیز حامد أبو زنادة

- ❖ ولد بجدة في عام ١٩٤٥م.
- ❖ حصل على درجة البكالوريوس في الأحياء من جامعة الرياض عام ١٩٦٣م.
- ❖ حصل على درجة الماجستير في الأمراض النباتية والأحياء الدقيقة من جامعة مينسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية.
- ❖ حصل على درجة الدكتوراه في التركيب الدقيقة للمرضات النباتية من جامعة درم ببريطانيا في عام ١٩٧١م
- ❖ له الكثير من الأبحاث المنشورة في مختلف المجالات العلمية العالمية والمحلية كما شارك في تأليف وترجمة عدد من الكتب والمراجع.
- ❖ أستاذ مساعد ورئيس قسم علم النبات . بكلية العلوم . جامعة الرياض .. ورئيس الجمعية السعودية لعلم الحياة.
- ❖ الأمين العام للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها .

خالص جليبي

- ❖ من مواليد مدينة القامشلي، سورية عام ١٩٤٥م.
- ❖ تخرج في كلية الطب، جامعة دمشق عام ١٩٧١م، وتخرج في كلية الشريعة، جامعة دمشق عام ١٩٧٤م، وحصل على الزمالة الألمانية (تخصص جراحة) من ألمانيا الغربية عام ١٩٨٢م.
- ❖ يعمل حالياً رئيساً لوحدة جراحة الأوعية الدموية في مستشفى الملك فهد التخصصي بالقصيم.
- ❖ من مؤلفاته: «الطب محراب للإيمان» (جزءان)، «ظاهرة المحنة»، «في النقد الذاتي»، «الإيدز: الطاعون الجديد»، «عندما بزغت الشمس مرتين: قصة السلاح النووي»، «أين يقف العلم اليوم؟» ثلاث مقالات: أبحاث في العلم والسلام.
- ❖ له الكثير من المقالات المنشورة في الصحف والمجلات العربية.


عبدالرحمن الحبيب

- ❖ دكتوراه فيسيولوجيا وبيئة المحاصيل الحقلية عام ١٩٩٩م جامعة رونج . بريطانيا.
- ❖ كاتب صحفي وباحث علمي ورئيس قسم التربة والري بالمركز الوطني لأبحاث الزراعة.
- ❖ يقدم استشارات وتوصيات زراعية ويشارك في المؤتمرات والندوات العلمية والزراعية الدولية والإقليمية.
- ❖ له الكثير من الأبحاث العلمية المحكمة وأصدر عدة نشرات إرشادية في المجال الزراعي.
- ❖ عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلم الحياة.
- ❖ عضو اللجنة العلمية في الجمعية السعودية للعلوم الزراعية.

عبدالله نعمان الحاج

- ❖ ماجستير في الهندسة النووية.
- ❖ دكتوراه في الفيزياء الطبية . جامعة سيري . بريطانيا عام ١٩٩٦م.
- ❖ رئيس قسم الفيزياء الصحية بمركز الأبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي.
- ❖ له بحوث منشورة في دوريات علمية في مجال الإشعاع والقياسات الإشعاعية.

(سابك) تقدم حاضراً ما يمكن أن يقدمه أي منتج ناجح للكيماويات مستقبلاً



عندما تأسست (سابك) عام ١٣٩٦هـ (١٩٧٦م) لنفوذ المسيرة الصناعية السعودية إلى عصر ما بعد النفط . كان البعض لا يتصور أن تخرز صناعاتها هذا المستوى المتقدم الذي جعلها محل الإعجاب والتقدير حول العالم .
يتضمن إنتاج (سابك) تشكيلة واسعة من المواد الكيماوية الأساسية ، والوسطية اللازمة للحياة العصرية .
تشمل الكيماويات الأساسية الألفينيات والمركبات العطرية والأكسجينية ومثيل ثالثي بوتيل الإيثر وغيرها . أما الكيماويات الوسطية فتشمل على سبيل المثال : جلايكول الإثيلين ، وثنائي كلوريد الإثيلين ، وغيرها .
ويتبع (سابك) أكبر مجمع مفرّد لإنتاج الميثانول في العالم ، وآخر من أكبر المجمعات العالمية لإنتاج مثيل ثالثي بوتيل الإيثر .
لا شك أن تعامل الزيوت مع مورد واحد لتشكيلة واسعة من المنتجات يهيئ له (ميزة اقتصادية) مهمة . إضافة إلى ذلك فإن قرب مراكز التوزيع العائدة لنا ، المنتشرة حول العالم ، يخفف عن زبائننا كثيراً من أعباء تخزين المنتجات . علاوة على أن هيكلنا التنظيمي الجديد يحقق لنا الاستجابة الأسرع والأكثر فعالية لتطورات وتغيرات الأسواق ، وتلمس حاجات زبائننا .
إن تخطيطنا الدروس للمستقبل يُسرّع خطانا ويكثفها على طريق التحسين الدائب لمنتجاتنا وخدماتنا ، ويعزز قدراتنا التنافسية في المستقبل . تماماً كما الحاضر .

قوة العطاء

الشركة السعودية للصناعات الأساسية
صندوق بريد ٥١٠١
الرياض ١١٤٢٢
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٩٦٦(٠١) ٢٢٥٨٠٠٠
فاكس: ٩٦٦(٠١) ٢٢٥٩٠٠٠
www.sabik.com